

Neue Beobachtung und Ausmessung
des
Sternhaufens 38h Persei
am
Münchener grossen Refractor.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
bei der
hohen philosophischen Facultät der Universität München
vorgelegt von
Karl Oertel.

MÜNCHEN
Druck der Akademischen Buchdruckerei von F. Straub
1890.

Neue Beobachtung und Ausmessung
des
Sternhaufens 38 h Persei
am
Münchener grossen Refractor.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
bei der
hohen philosophischen Facultät der Universität München
vorgelegt von
Karl Oertel.

MÜNCHEN
Druck der Akademischen Buchdruckerei von F. Straub
1890.

Neue Beobachtung und Ausmessung des Sternhaufens 38h Persei am Münchener grossen Refractor.

Auf Wunsch des Herrn Professor Dr. Seeliger übernahm ich gegen Ende des Jahres 1886 die Aufgabe, die Ergebnisse der von Lamont in den Jahren 1836 bis 1841 am Münchener Refractor ausgeführten Ausmessungen des Sternhaufens im Degengriffe des Perseus (Herschel Nr. 207) auszugleichen und mit den von Herrn Professor Krüger am gleichen Object angestellten Beobachtungen zu vergleichen. Bei der Ausführung dieser Arbeit kam ich jedoch sehr bald zu der Ueberzeugung, dass eine Ausgleichung der Lamont'schen Beobachtungen und mithin eine zweckentsprechende Vergleichung derselben an ihrer Anordnung scheitern musste, indem Lamont fast ausschliesslich Positionswinkel beobachtete und auch diese Messungen nicht so untereinander verband, dass aus ihnen mit Hilfe einer Basis auch nur einigermassen brauchbare Positionen der einzelnen Sterne hätten abgeleitet werden können.

Angesichts dieses negativen Resultates forderte mich nun Herr Professor Seeliger auf, den genannten Sternhaufen einer neuen Beobachtung zu unterziehen und so das für eine Vergleichung mit Lamont's Beobachtungen sowohl, als auch mit denen des Herrn Professor Krüger nöthige Material zu beschaffen. Herr Professor Seeliger stellte mir hierzu bereitwilligst den 10 $\frac{1}{2}$ zölligen Fraunhofer'schen Refractor der hiesigen Sternwarte zur Verfügung und ich benützte die hier sich bietende Gelegenheit, ihm dafür sowohl, als auch für die vielen freundlichen Winke und Rathschläge, deren ich mich bei Ausführung der Beobachtungen und Rechnungen seinerseits zu erfreuen hatte, meinen aufrichtigen Dank auszusprechen.

Ausführung der Beobachtungen.

Nach einigen Vorbereitungen konnte ich im Januar 1887 mit den eigentlichen Beobachtungen beginnen. Ich beabsichtigte zuerst, ausser directen Declinations- und Rectascensionsdifferenzen auch noch Positionswinkel und Distanzen zu messen. Allein die häufigen Unterbrechungen, welche durch schlechtes Wetter, sowie dadurch herbeigeführt wurden, dass ich alljährlich in den Sommer- und Herbstmonaten durch Gradmessungsarbeiten von hier ferngehalten bin, zwangen mich bald, die Absicht, auch Polarcoordinaten zu messen, fallen zu lassen. Eine längere Unterbrechung entstand noch dadurch, dass Anfangs December 1887 das Ocular des Instrumentes behufs Untersuchung der Schraube abgenommen und erst gegen Ende Januar 1888 wieder eingesetzt wurde. Dann muss noch bemerkt werden, dass der beobachtete Sternhaufen vom October an in den besten Abendstunden culminirte und, da er hierbei nur 8 $\frac{1}{2}$ ° vom Zenit abstand, auf die Dauer von wenigstens 3 Stunden nicht beobachtet werden konnte. Endlich musste ich manchen Abend, an dem es erst später klar wurde, unbenützt lassen, weil meine Wohnung in der Stadt, etwa 4 Kilometer von der Sternwarte entfernt, sich befand. Aus allen diesen Gründen konnten die Beobachtungen erst im März 1889 zum Abschluss gebracht werden.

Das Instrument, welches zur Ausführung der Beobachtungen diente, war, wie schon bemerkt, der $10\frac{1}{2}$ zöllige Fraunhofer'sche Refractor der hiesigen Sternwarte. Ich darf als bekannt voraussetzen, dass derselbe im Jahre 1883 neu montirt und mit einem neuen Repsold'schen Ocular versehen wurde; im Uebrigen enthalte ich mich einer näheren Beschreibung dieses Instrumentes, weil eine solche von Seite des Herrn Professor Seeliger erfolgen wird. Aus dem gleichen Grunde übergehe ich die Untersuchung der Ocularmikrometerschraube bezüglich ihrer periodischen und fortschreitenden Fehler. Was den Winkelwerth einer Umdrehung dieser Schraube anlangt, so habe ich denselben aus vielfachen Messungen des aus Meridianbeobachtungen sehr genau bekannten Declinationsabstandes der Krüger'schen Sterne Nr. 5 und Nr. 12 des in Rede stehenden Sternhaufens, sowie aus solchen in den Plejaden, immer unter Berücksichtigung der Temperatur und der Ocularstellung, abgeleitet. Alle diese Untersuchungen wird Herr Professor Seeliger seinerzeit im Zusammenhang mit anderen, auf das gleiche Instrument sich beziehenden veröffentlichen, ich begnüge mich deshalb hier damit, ihre Ergebnisse anzuführen. Es fand sich:

1) Die fortschreitenden Ungleichheiten der Schraube des Ocularmikrometers sind sehr klein; sie verschwinden nahezu ganz, wenn man (was stets geschah) die Messungen so anordnet, dass die Mitte der ganzen Schraube nahezu dem Coincidenzpunkt des festen und des beweglichen Fadens entspricht und dass ferner bei den Messungen die Schraubengänge rechts und links dieser Mitte gleich oft zur Verwendung kommen.

2) Die periodischen Ungleichheiten dieser Schraube lassen sich vollständig genügend durch den Ausdruck darstellen

$$p(u) = + 0^{\text{rev}}.00166 \sin(u + 99^{\circ}.7) \quad (1)$$

3) Der Winkelwerth einer Schraubenumdrehung ist unabhängig von den bei Messungen etwa vorkommenden unrichtigen Stellungen des Oculars und es ist für alle Temperaturen zwischen -10° und $+20^{\circ}$ (R)

$$1 \text{ rev.} = 24^{\circ}.8182 \pm 0^{\circ}.0035$$

Sämmtliche Beobachtungen wurden mit dem Ocular Nr. IV ausgeführt, welches 360fache Vergrößerung gewährt. Die Einstellung des Oculars auf deutliche Bilder erfolgte mindestens jeden Abend einmal, nach Bedarf im Laufe eines Abends auch öfter. Ebenso wurde an jedem Abend wenigstens einmal, vor Beginn der Messungen, der Nullpunkt des Positionskreises bestimmt, bezw. controlirt, ausserdem am Anfang und Ende jeder Messungsreihe behufs Bestimmung des Einflusses der Refraction der Stand des Barometers und des inneren und äusseren Thermometers abgelesen.

Alle Messungen geschahen möglichst in der Mitte des Gesichtsfeldes. Das Areal, auf welches sich dieselben erstreckten, ist im allgemeinen dasjenige, welches die Krüger'schen Beobachtungen umfassen, nur die beiden Krüger'schen Sterne Nr. 32 und 33 wurden, als gar zu weit vom Centrum des Sternhaufens abstehend, weggelassen. Herr Professor Krüger hat im Allgemeinen nur die helleren, in diesem Areal vorkommenden Sterne, im Ganzen 43, beobachtet; ich habe hauptsächlich wegen der Vergleichung mit Lamont alle Sterne mitgenommen, welche ich noch bei schwach beleuchtetem Gesichtsfeld beobachten konnte. Dadurch ist die Zahl derselben auf 126 gestiegen.

Bei der oben angegebenen Vergrößerung beträgt das Gesichtsfeld des hiesigen Refractors gegen 4 Minuten, es konnten daher diejenigen Sterne, deren Declinationsabstand vom Nullpunkt diesen Betrag überschreitet, nicht mehr direkt an den letzteren angeschlossen werden und es mussten die Messungen der Coordinaten dieser weiter entfernten Sterne von Zwischenpunkten aus geschehen. Zur grösseren Sicherheit wurden jedoch nicht nur diese Zwischenpunkte, sondern, insbesondere bei der Messung der Declinationsdifferenzen, überhaupt alle Sterne nach Thunlichkeit mit einander verbunden.

Declinationsdifferenzen.

Die Messungen wurden so angeordnet, dass jede Differenz wenigstens einmal, sonst gleich oft in beiden Lagen der Schraube gemessen wurde. Im Uebrigen wurde weniger auf häufige Wiederholung der Messung ein- und derselben Differenz, als auf möglichst zahlreiche Anschlüsse eines Sternes an die ihm benachbarten gesehen.

Der Coincidenzpunkt der Schraube, i. e. des festen Mittelfadens mit dem beweglichen, wurde schon von Beginn der Messungen an im Laufe eines jeden Abends wenigstens zweimal bestimmt, nämlich vor Beginn und nach Schluss der Beobachtungen in der nämlichen Lage des Fernrohrs, welche dasselbe bei den Beobachtungen jeweils innehatte. Jede Bestimmung bestand aus einer Serie von 5 bis 6 Doppeleinstellungen der beiden Fäden mit Lichtlinie links und rechts. Es zeigte sich sehr bald, dass die Vorsicht, den Coincidenzpunkt vor Beginn und nach Schluss der Beobachtungen und bei jeweils unveränderter Stellung des Fernrohrs zu bestimmen, eine sehr wohl angebrachte war. In der Regel wurde nämlich, besonders anfangs, im Lauf eines Abends nur bei einer Lage der Schraube gemessen, der orientirte Positionskreis also nicht gedreht. Erst im November 1887 wurde an einem Abend in beiden (entgegengesetzten) Lagen der Schraube gemessen und dementsprechend auch der Coincidenzpunkt für jede Lage zweimal bestimmt, wobei sich überraschender Weise für beide Lagen erheblich verschiedene Werthe ergaben.¹⁾ Spezielle Untersuchungen zeigten sehr bald, dass die Lage des Coincidenzpunktes der Schraube bei feststehendem Positionskreis abhängig ist von der Lage des Fernrohrs oder bei ruhendem Fernrohr direct vom Positionswinkel. Es dürfte von Interesse sein, die Resultate der hauptsächlichsten diesbezüglichen Versuchsmessungen hier mitzuthemen. Ich bemerke nur noch, dass dieselben bei Tag, also ohne künstliche Beleuchtung und bei horizontal gestelltem Fernrohr ausgeführt wurden. Der im nachfolgenden jeder Stellung des Positionskreises entsprechende Coincidenzwert ist das jedesmalige Mittel aus 10 Paar Einstellungen des beweglichen Mittelfadens auf den festen.

I. Versuchsreihe.

1887, Nov. 19.

Fernrohr links.

Positions- Winkel	Schraube	Coincidenz	
		Beobachtet	Berechnet
		R	R
47°	Unten	15.7354	15.7383
17	—	7423	7420
347	—	7490	7462
317	Links	7509	7499
287	—	7529	7520
257	—	7522	7518
227	Oben	7485	7497
197	—	7432	7460
167	—	7398	7418
137	Rechts	7384	7381
107	—	7383	7360
77	—	7363	7362
47	Unten	7371	7383

II. Versuchsreihe. (Forts.)

Positions- Winkel	Schraube	Coincidenz	
		Beobachtet	Berechnet
		R	R
285°	—	15.7527	15.7527
270	—	7537	7530
255	—	7535	7529
240	—	7521	7523
225	Oben	7502	7511
210	—	7495	7494
195	—	7460	7475
180	—	7444	7454
165	—	7430	7433
150	—	7420	7412
135	Rechts	7408	7395
120	—	7395	7381
105	—	7386	7371
90	—	7374	7368

II. Versuchsreihe.

1887, Nov. 28.

Fernrohr links.

Positions- Winkel	Schraube	Coincidenz	
		Beobachtet	Berechnet
		R	R
90°	—	15.7371	15.7368
75	—	7358	7369
60	—	7373	7375
45	Unten	7378	7387
30	—	7392	7404
15	—	7414	7423
0	—	7441	7444
345	—	7478	7465
330	—	7494	7486
315	Links	7512	7503
300	—	7520	7517

III. Versuchsreihe.

1887, Nov. 29.

Fernrohr rechts.

Positions- Winkel	Schraube	Coincidenz	
		Beobachtet	Berechnet
		R	R
255°	—	15.7535	15.7525
240	—	7516	7509
225	Oben	7475	7489
210	—	7452	7466
195	—	7424	7441
180	—	7406	7416
165	—	7389	7393
150	—	7377	7374
135	Rechts	7380	7359
120	—	7362	7351
105	—	7362	7349

1) Die gleichen Erfahrungen der Herren Valentiner und Peter waren mir damals noch nicht bekannt, die letzteren überhaupt noch nicht veröffentlicht.

III. Versuchsreihe. (Forts.)

Positions- Winkel	Schraube	Coincidenz	
		Beobachtet	Berechnet
		^R	^R
90 ⁰	—	15.7354	15.7353
75	—	7374	7363
60	—	7379	7379
45	Unten	7379	7399
30	—	7395	7422
15	—	7432	7452
0	—	7471	7472
345	—	7515	7495
330	—	7531	7514
315	Links	7523	7529
300	—	7535	7537
285	—	7545	7539
270	—	7539	7535
255	—	7535	7525

IV. Versuchsreihe.

1888, Febr. 14.

Fernrohr rechts.

Positions- Winkel	Schraube	Coincidenz	
		Beobachtet	Berechnet
		^R	^R
137 ⁰	Rechts	15.7601	15.7591
107	—	7585	7572
77	—	7570	7568
47	Unten	7575	7578
17	—	7590	7598
347	—	7628	7626
317	Links	7651	7653
287	—	7673	7672
257	—	7686	7676
227	Oben	7675	7666
197	—	7637	7646
167	—	7596	7618
137	Rechts	7599	7591

Diese Beobachtungen wurden unter der Form

$$F(p) = x + y \sin p + z \cos p$$

wo p der Positionswinkel ist, ausgeglichen und für die einzelnen Beobachtungsreihen ergaben sich hienach folgende Ausdrücke (alles in Schraubenumdrehungswerten ausgedrückt):

$$\left. \begin{aligned} \text{I. } F(p) &= 15,7440 (\pm 0,0006) - [0,0082 (\pm 0,0008)] \sin p + [0,0005 (\pm 0,0008)] \cos p; (\mu_1 = \pm 0,0019) \\ \text{II. } F(p) &= 15,7449 (\pm 0,0002) - [0,0081 (\pm 0,0003)] \sin p - [0,0005 (\pm 0,0003)] \cos p; (\mu_1 = \pm 0,0010) \\ \text{III. } F(p) &= 15,7444 (\pm 0,0003) - [0,0091 (\pm 0,0004)] \sin p + [0,0028 (\pm 0,0004)] \cos p; (\mu_1 = \pm 0,0014) \\ \text{IV. } F(p) &= 15,7622 (\pm 0,0003) - [0,0054 (\pm 0,0004)] \sin p - [0,0008 (\pm 0,0004)] \cos p; (\mu_1 = \pm 0,0011) \end{aligned} \right\} (2)$$

Nach diesen Ausdrücken wurden die in den letzten Spalten der obigen Tabellen enthaltenen berechneten Werthe der Coincidenz ermittelt; die vorstehenden Werthe von μ_1 bezeichnen für jede Versuchsreihe den mittleren Fehler einer beobachteten Coincidenz (welche also nach dem Obigen dem Mittel aus 10 Paar einzelnen Einstellungen entspricht).

Die Uebereinstimmung der ersten drei Beobachtungsreihen könnte kaum besser sein; die Abweichungen der letzten Reihe finden ihre Erklärung in dem Umstand, dass in der Zwischenzeit der Ocularstutzen abgenommen und der ganze Mikrometerapparat zerlegt wurde, wodurch auch eine Verschiebung des Coincidenzpunktes selbst eintrat. Ebenso ist die Uebereinstimmung zwischen den beobachteten und den berechneten Coincidenzwerten durchwegs eine gute und es geht sonach aus diesen Untersuchungen eine Veränderlichkeit des Coincidenzpunktes mit der Stellung des Positionskreises mit grosser Sicherheit hervor. Allerdings muss bemerkt werden, dass bei früheren, durch längere Zeit fortgesetzten Beobachtungen des Herrn Professor Seeliger am gleichen Instrumente, bei welchen ebenfalls regelmässig der Coincidenzpunkt der Schraube im Laufe eines jeden Abends für zwei entgegengesetzte Lagen derselben bestimmt wurde, derartige Unterschiede nur sehr schwach angedeutet sind. Es scheinen sonach selbst so vollkommene Apparate, wie die Repsold'schen Ocularmikrometer, mit der Zeit Veränderungen zu unterliegen; jedenfalls wird man gut thun, bei allen Refractormessungen den Coincidenzpunkt der Schraube für die jeweilige Lage des Positionskreises, in welcher beobachtet wurde, zu bestimmen.

Bei der Messung der Declinationsdifferenzen wurden in der Regel 5 Einstellungen nacheinander gemacht, indem der vorausgehende Stern mit Hilfe der feinen Declinationsbewegung des Fernrohrs stets von Neuem auf den festen, der nachfolgende Stern mit Hilfe des Mikrometers auf

den beweglichen Faden gestellt wurde; bei sehr guter Luft wurden nur vier, bei sehr schlechter dagegen 6—7 solche Einstellungen ausgeführt. Uebrigens wurde in allen Fällen dem Mittel aufeinander folgender derartiger Einstellungen gleiches Gewicht beigelegt und es ergab dieses Mittel im Zusammenhalt mit dem nötigenfalls durch Interpolation berechneten Coincidenzpunkt einen Mittelwert für die Declinationsdifferenz des betreffenden Sternpaares, welcher zunächst nach Massgabe der beiden Trommelablesungen (Einstellung auf den festen Faden und Einstellung auf den Stern) wegen der periodischen Schraubenungleichheiten zu verbessern war. Die Beträge dieser Verbesserung wurden einer nach Gl. (1), S. 3 berechneten Tafel entnommen.

Rectascensionsdifferenzen.

Die Messung der Rectascensionsdifferenzen erfolgte wie die der Declinationsdifferenzen bei ruhendem Fernrohr, indem mit Hilfe eines Fuess'schen Chronographen die Antritte der Sterne an 3 festen Fäden registriert wurden. Behufs Elimination dieser Fadenabstände wurden die Durchgänge an den zwei Seitenfäden nicht auf den Mittelfaden reducirt, sondern die Differenzen dieser Durchgänge für jeden einzelnen Faden direct berechnet. Der Registrirapparat war anfänglich im Beobachtungsraum aufgestellt, als aber in Folge der Kälte das Triebwerk desselben bedenkliche Störungen erlitt, liess Herr Professor Seeliger auf mein Ersuchen denselben im Rechenzimmer der K. Sternwarte aufstellen und behufs Ueberwachung seines ungestörten Fortganges eine telephonische Verbindung desselben mit dem Beobachtungsraum herstellen. Zur Abkürzung der Beobachtungszeit wurden häufig die Durchgänge ganzer Gruppen von Sternen, welche nahezu auf dem gleichen Parallel sich bewegten, registriert, freilich wurde hiedurch bei den oft sehr rasch aufeinanderfolgenden Sternen die Streifenablesung ganz ausserordentlich erschwert.

Reduction der Beobachtungen.

Die gemessenen scheinbaren Rectascensions- und Declinationsdifferenzen waren zunächst wegen der Refraction zu verbessern. Unter Beibehaltung der Bessel'schen Bezeichnungen¹⁾ waren diese Verbesserungen zu berechnen aus folgenden Gleichungen:

$$\Delta\alpha = \frac{\alpha(\delta' - \delta)}{\sin^2(N + \delta)} \cdot \frac{\cot n \cos(N + 2\delta)}{\cos^2 \delta}$$

$$\Delta\delta = \frac{\alpha(\delta' - \delta)}{\sin^2(N + \delta)}$$

Hierin ist bekanntlich $\alpha = \alpha'' \cdot \beta^{A''} \cdot \gamma^{\lambda''}$; β ist der beobachtete Barometerstand, γ die Lufttemperatur. Setzt man

$$\frac{\alpha''}{\sin^2(N + \delta)} = q_\delta \text{ und } \frac{24,8 \alpha''}{15 \sin^2(N - \delta)} \cdot \frac{\cot n \cos(N + 2\delta)}{\cos^2 \delta} = q_\alpha$$

so findet man die Verbesserungen wegen Refraction aus folgenden Gleichungen:

$$\left. \begin{aligned} \log(\Delta\alpha)^{\text{sec}} &= \log q_\alpha + \log(\delta' - \delta)^{\text{rev}} + A'' \log \beta + \lambda'' \lg \gamma \\ \log(\Delta\delta)^{\text{rev}} &= \log q_\delta + \log(\delta' - \delta)^{\text{rev}} + A'' \log \beta + \lambda'' \lg \gamma \end{aligned} \right\} (3)$$

Die Werthe von $\log q_\alpha$ und $\log q_\delta$ habe ich für alle Stundenwinkel berechnet und erhielt somit zur Berechnung der Refractionen die auf der folgenden Seite abgedruckte Tafel, zu der nur noch zu bemerken ist, dass A'' im vorliegenden Fall durchaus = 1 zu setzen ist und dass aus ihr $\Delta\alpha$ in Zeitsekunden, $\Delta\delta$ in Schraubenrevolutionen erhalten wird, wenn $(\delta' - \delta)$ in Schraubenrevolutionen eingesetzt wird.

Die für die Berechnung von $\log q_\alpha$ und $\log q_\delta$ nöthigen Werthe von $N \cot n$ habe ich der Sammlung von Hilfstafeln für die Münchener Sternwarte, die Werthe von $\log \beta$ und $\log \gamma$ den Albrecht'schen Hilfstafeln entnommen. Da wegen der Refraction alle Differenzen zu klein gemessen werden, so ist das Vorzeichen der obigen Correctionen mit dem der zugehörigen Coordinatendifferenz stets identisch.

¹⁾ Astronomische Untersuchungen I, p. 198.

t	$\log \varrho_\alpha$	$\log \varrho_\delta$	λ	t	t	$\log \varrho_\alpha$	$\log \varrho_\delta$	λ	t		
^h 0	^m 0			^h 24	^m 0	^h 6	^m 0		^h 18	^m 0	
	— ∞	6.4553	0	1.000	24 0	6.8863	192	6.5996	232	1.007	18 0
10	5.6155	6.4553	2	1.000	23 50	6.8671	242	6.6228	249	1.008	17 50
20	5.9161	6.4551	3	1.000	40	6.8429	295	6.6477	266	1.008	40
30	6.0917	6.4548	4	1.000	30	6.8134	366	6.6743	285	1.009	30
40	6.2158	6.4544	6	1.000	20	6.7768	443	6.7028	301	1.010	20
50	6.3116	6.4538	6	1.000	10	6.7325	562	6.7329	316	1.011	10
	780										
1 0	6.3896	6.4532	8	1.000	23 0	6.6763	723	6.7645	330	1.012	17 0
10	6.4550	6.4524	8	1.000	22 50	6.6040	947	6.7975	342	1.013	16 50
20	6.5113	6.4516	8	1.000	40	6.5093	1333	6.8317	355	1.014	40
30	6.5604	6.4508	9	1.001	30	6.3760	2140	6.8672	362	1.015	30
40	6.6038	6.4499	9	1.001	20	6.1620	4907	6.9034	371	1.016	20
50	6.6426	6.4490	8	1.001	10	5.6713	—	6.9405	377	1.017	10
	349										
2 0	6.6775	6.4482	8	1.001	22 0	5.7628	4589	6.9782	382	1.019	16 0
10	6.7090	6.4474	8	1.001	21 50	6.2217	2261	7.0164	382	1.020	15 50
20	6.7377	6.4466	6	1.002	40	6.4478	1497	7.0546	383	1.022	40
30	6.7637	6.4460	4	1.002	30	6.5975	1140	7.0929	383	1.023	30
40	6.7876	6.4456	3	1.002	20	6.7115	890	7.1312	379	1.025	20
50	6.8091	6.4453	0	1.002	10	6.8005	729	7.1691	375	1.026	10
	196										
3 0	6.8287	6.4453	5	1.002	21 0	6.8734	607	7.2066	368	1.027	15 0
10	6.8466	6.4458	9	1.002	20 50	6.9341	499	7.2434	360	1.029	14 50
20	6.8629	6.4467	14	1.003	40	6.9840	407	7.2794	351	1.031	40
30	6.8773	6.4481	20	1.003	30	7.0247	325	7.3145	338	1.033	30
40	6.8903	6.4501	26	1.003	20	7.0572	250	7.3483	324	1.035	20
50	6.9015	6.4527	35	1.003	10	7.0822	173	7.3807	309	1.036	10
	100										
4 0	6.9115	6.4562	44	1.003	20 0	7.0995	97	7.4116	292	1.038	14 0
10	6.9197	6.4606	54	1.004	19 50	7.1092	18	4408	276	1.039	13 50
20	6.9264	6.4660	66	1.004	40	7.1110	69	4684	251	1.041	40
30	6.9316	6.4726	78	1.004	30	7.1041	166	4935	233	1.042	30
40	6.9351	6.4804	90	1.004	20	7.0875	272	5168	207	1.043	20
50	6.9367	6.4894	107	1.004	10	7.0603	407	5375	184	1.044	10
	01										
5 0	6.9366	6.5001	121	1.004	19 0	7.0196	568	7.5559	158	1.045	13 0
10	6.9343	6.5122	138	1.005	18 50	6.9628	782	5717	133	1.046	12 50
20	6.9301	6.5260	156	1.005	40	6.8846	1103	5850	103	1.047	40
30	6.9233	6.5416	174	1.006	30	6.7743	1659	5953	074	1.047	30
40	6.9141	6.5590	194	1.006	20	6.6084	2947	6027	046	1.048	20
50	6.9018	6.5784	212	1.006	10	6.3137	— ∞	6073	014	1.048	10
6 0	6.8863	6.5996		1.007	18 0	— ∞		6087		1.048	12 0

Ferner waren die gemessenen Differenzen zu verbessern wegen Präcession, Nutation und Aberration und zwar waren sie zunächst von der Epoche ihrer Beobachtung auf den Jahresanfang und dann noch auf das Aequinoctium 1890,0 zu reduciren.

Die Reduction auf den Jahresanfang ergab sich aus folgenden Formeln, in welchen A , B , C , D die bekannten Ausdrücke nach Bessel sind:

$$\left. \begin{aligned}
 \Delta\alpha &= -A[n\sin^2\alpha\sec^2\delta(\delta' - \delta) + n\operatorname{tg}\delta\cos\alpha(\alpha' - \alpha)] - B[\cos\alpha\sec^2\delta(\delta' - \delta) - \sin\alpha\operatorname{tg}\delta(\alpha' - \alpha)] \\
 &\quad + C[\sin\alpha\sec\delta(\alpha' - \alpha) - \cos\alpha\operatorname{tg}\delta\sec\delta(\delta' - \delta)] - D[\cos\alpha\sec\delta(\alpha' - \alpha) + \sin\alpha\operatorname{tg}\delta\sec\delta(\delta' - \delta)] \\
 \Delta\delta &= +An\sin\alpha(\alpha' - \alpha) + B\cos\alpha(\alpha' - \alpha) + C[\cos\alpha\sin\delta(\alpha' - \alpha) + (\operatorname{tg}\varepsilon\sin\delta + \sin\alpha\cos\delta)(\delta' - \delta)] \\
 &\quad + D[\sin\alpha\sin\delta(\alpha' - \alpha) - \cos\alpha\cos\delta(\delta' - \delta)]
 \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

und die Reduction auf das Aequinoctium 1890,0 aus den beiden Gleichungen

$$\left. \begin{aligned} \Delta\alpha &= n\tau [\sin\alpha \sec^2\delta (\delta' - \delta) + \cos\alpha \operatorname{tg}\delta (\alpha' - \alpha)] \\ \Delta\delta &= -n\tau (\alpha' - \alpha) \sin\alpha \end{aligned} \right\} (5)$$

in welchen τ die Zeit zwischen dem Anfang des Beobachtungsjahres und 1890,0 bedeutet.

Setzt man in den obigen Gleichungen (4) für α und δ die Positionen des Nullpunktes des Sternhaufens für die mittlere Epoche der Beobachtungen und für n und ε deren Werthe für die gleiche Epoche (n nach Struve) ein, so nehmen dieselben folgende einfache Form an

$$\left. \begin{aligned} (\Delta\alpha)^{\sec} &= \frac{(\alpha' - \alpha)^{\sec}}{100} \left\{ -[8,0935] A + [6,6006] B + [6,6789] C - [6,8696] D \right\} \\ &\quad - \frac{(\delta' - \delta)^{\sec}}{10} \left\{ +[7,4601] A + [6,3487] B + [6,2704] C + [6,0796] D \right\} \\ (\Delta\delta)^{\sec} &= \frac{(\alpha' - \alpha)^{\sec}}{100} \left\{ +[7,5020] A + [6,3906] B + [6,3123] C + [6,1215] D \right\} \\ &\quad + \frac{(\delta' - \delta)^{\sec}}{10} \left\{ [5,5053] C - [5,3506] D \right\} \end{aligned} \right\} (6)$$

wobei die in eckige Klammern eingeschlossenen Zahlen Logarithmen bedeuten.

Bezeichnet man die in runde Klammern eingeschlossenen vier Ausdrücke der Reihe nach mit M , N , M' , N' , so wird die Reduction auf den Jahresanfang erhalten aus

$$(\Delta\alpha)^{\sec} = M \frac{(\alpha' - \alpha)^{\sec}}{100} + N \frac{(\delta' - \delta)^{\sec}}{10}$$

$$(\Delta\delta)^{\sec} = M' \frac{(\alpha' - \alpha)^{\sec}}{100} + N' \frac{(\delta' - \delta)^{\sec}}{100}$$

Die Werthe von M , N , M' , N' wurden mit dem Argument Datum in Tafeln gebracht, welche nachstehend für die Zeiträume, innerhalb deren wirklich beobachtet wurde, folgen. Die Werthe von $\log A$, $\log B$, $\log C$, $\log D$ wurden dem Berliner Jahrbuch entnommen.

Reduction der Rectascensionsdifferenzen.

Datum	M	N	Datum	M	N
1888			1888		
Februar 19	-0.0118 15	+0.0009 7	November 4	-0.0082 33	-0.0065 0
— 29	-0.0103 19	+0.0016 5	— 14	-0.0115 31	-0.0065 2
März 10	-0.0084 23	+0.0021 5	— 24	-0.0146 28	-0.0063 3
— 20	-0.0061 25	+0.0026 3	December 4	-0.0174 26	-0.0060 4
— 30	-0.0036 27	+0.0029 2	— 14	-0.0200 22	-0.0056 5
April 9	-0.0009 27	+0.0031 1	— 24	-0.0222	-0.0051
— 19	+0.0018 28	+0.0032 1	1889		
— 29	+0.0046 26	+0.0031 3	Januar 30	-0.0134 4	+0.0003 7
Mai 9	+0.0072 24	+0.0028 3	Februar 9	-0.0130 9	+0.0010 7
— 19	+0.0096 21	+0.0025 4	— 19	-0.0121 14	+0.0017 7
— 29	+0.0117	+0.0021	März 1	-0.0107 19	+0.0024 5
			— 11	-0.0088 22	+0.0029 4
			— 21	-0.0066	+0.0033

Reduction der Declinationsdifferenzen.

Datum		M'	N'	Datum		M'	N'
1887				1888			
Januar	0	+ 0.00359	71	Februar	19	- 0.00104	70
—	10	+ 0.00288	78	—	29	- 0.00174	60
—	20	+ 0.00210	79	März	10	- 0.00234	49
—	30	+ 0.00131	79	—	20	- 0.00283	36
Februar	9	+ 0.00052	76	—	30	- 0.00319	21
—	19	- 0.00024	69	April	9	- 0.00340	5
März	1	- 0.00093	61	—	19	- 0.00345	9
—	11	- 0.00154	48	—	29	- 0.00336	9
—	21	- 0.00202	36	October	5	+ 0.00659	35
—	31	- 0.00238	20	—	15	+ 0.00694	20
April	10	- 0.00258	07	—	25	+ 0.00714	5
—	20	- 0.00265	10	November	4	+ 0.00719	5
—	30	- 0.00255	—	—	14	+ 0.00714	17
October	6	+ 0.00749	30	—	24	+ 0.00697	33
—	16	+ 0.00779	18	December	4	+ 0.00664	49
—	26	+ 0.00797	07	—	14	+ 0.00615	56
November	5	+ 0.00804	08	—	24	+ 0.00559	56
—	15	+ 0.00796	18	1889			
—	25	+ 0.00778	35	Februar	13	- 0.00143	—
December	5	+ 0.00743	—				

Die Reduction auf 1890.0 endlich ergab sich nach den oben angeführten Formeln (5), wenn in dieselben die zugehörigen Zahlenwerthe eingesetzt werden, für die Beobachtungen des Jahres

$$\begin{aligned}
 & \text{1887} & \text{1888} \\
 & \dots\dots\dots & (\Delta\alpha)^{\text{sec}} = + 0.0248 \frac{(\alpha' - \alpha)^{\text{sec}}}{100} + 0.0058 \frac{(\delta' - \delta)^{\text{rev}}}{10} \\
 & (\Delta\delta)^{\text{rev}} = - 0.0095 \frac{(\alpha' - \alpha)^{\text{sec}}}{100} & (\Delta\delta)^{\text{rev}} = - 0.0064 \frac{(\alpha' - \alpha)^{\text{sec}}}{100} \\
 & & \text{1889} \\
 & & (\Delta\alpha)^{\text{sec}} = + 0.0124 \frac{(\alpha' - \alpha)^{\text{sec}}}{100} + 0.0029 \frac{(\delta' - \delta)^{\text{rev}}}{10} \\
 & & (\Delta\delta)^{\text{rev}} = - 0.0032 \frac{(\alpha' - \alpha)^{\text{sec}}}{100}
 \end{aligned}$$

Uebersicht über die Witterungsverhältnisse, Stellung des Oculars und Lage der Schraube während der Messungen.

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Uebersicht über die meteorologischen Aufzeichnungen, die Lage der Schraube, die Stellung des Oculars (welche am Index einer mit dem Ocularauszug verbundenen Millimeterscala abgelesen werden konnte), endlich über den Zustand der Bilder und der Luft während der Messungen. Letzterer wurde im Allgemeinen nach der auch sonst üblichen Scala mit den Stufen I bis IV zu schätzen versucht. Die angegebenen mittleren Zeiten (München) gelten für die Barometer- und Thermometerablesungen; t ist die Temperatur der äusseren Luft, T jene des Quecksilbers im Barometer, beide in Centigraden. Die Temperatur des Beobachtungsraumes, welche gleichfalls aufgezeichnet wurde, ist hier, weil nicht von Belang, fortgelassen worden.

Datum	Mittl. Zeit	Barom.	T	t	Ocular	Schraube	Bemerkungen.
1887		Fernrohr rechts.					
Januar 8	^h 8.1 11.3	^{mm} 702.6 701.5	^o — 3.8 — 5.3	^o — 10.4 — 11.8	2.8	Rechts	☉ Luft II—III, dunstig, hie und da dünne Streifwolken.
— 22	7.7 11.6	726.0 725.4	+ 1.3 + 0.2	+ 2.4 — 0.2	4.0	rechts	Luft II, später I—II.
— 25	8.0 12.0	725.2 725.9	— 1.0 — 1.7	— 3.8 — 3.6	3.9	links	Luft I, nach 9 ^h II.
— 26	7.5 12.0	728.4 728.0	+ 0.5 — 1.0	— 3.0 — 5.7	4.0	rechts	Luft I.
— 27	7.5 12.2	727.1 725.9	— 2.6 — 2.2	— 5.4 — 8.0	3.6	links	Luft II, gegen den Schluss etwas windig und neblig.
— 28	7.5 12.0	728.7 728.4	— 2.2 — 2.1	— 4.4 — 6.1	3.5	links	Luft II, am Schluss eher III; Bilder sehr schwach und unruhig.
— 31	7.5 12.0	722.8 721.7	— 4.0 — 3.3	— 6.2 — 6.8	3.6	links	Luft II, nach 10 ^h III; Bilder sehr verwaschen, am Horizont bis auf etwa 10° Höhe dichter Nebel.
Februar 1	8.8 12.0	719.7 719.9	— 1.7 — 2.0	— 4.5 — 5.5	3.5	rechts	Luft III, um 11 ^{1/2} ^h wegen ganz schlechter Luft Schluss.
— 4	7.5 12.0	730.9 729.9	+ 2.4 + 1.0	+ 0.2 — 1.9	4.0	rechts	Luft I—II, nach 10 ^h III; am Schluss sehr windig, Bilder sehr unruhig, stark wallend und verwaschen.
— 5	7.0 12.0	728.8 728.3	+ 2.0 + 0.3	— 1.7 — 2.8	4.0	rechts	☉ Luft II, zeitweise etwas unruhig.
— 7	7.1 10.8	728.1 728.3	— 1.4 — 1.8	— 5.0 — 7.2	3.5	rechts	☉ Luft II, etwas windig; um 10 ^h Wolken, deshalb Schluss.
— 8	7.5 11.7	727.3 726.2	— 2.2 — 3.0	— 6.5 — 8.3	3.3	rechts links	☉ Luft II, nach 9 ^h Wolken.
— 11	7.5 12.0	721.1 721.3	— 0.9 — 2.0	— 3.6 — 6.2	3.3	links	Luft II, von 10 ^h ab III, sehr unruhig; gegen 12 ^h von SE starkes Gewölk.
— 12	7.5 10.3	719.5 719.9	— 1.0 — 1.5	— 2.9 — 4.0	3.8	links	Luft II, später III. Um 10 ^h starker Nebel.
— 17	7.3 12.3	720.9 719.6	— 6.0 — 7.7	— 11.5 — 15.7	3.0	links	Luft II, später I; sehr ruhig und klar, aber sehr kalt.
— 24	6.3 11.8	723.2 723.0	+ 4.0 + 1.6	+ 2.1 — 1.7	4.7 3.8	links	Luft I—II, von 9 ^h ab Luft III und diffuse, unruhige Bilder.
— 25	5.7 8.0	722.0 722.2	+ 6.3 + 5.0	+ 6.6 + 4.8	4.2 4.4	rechts	Luft II, um 7 ^h Wolken, um 8 ^h ganz bezogen.
— 28	5.8 12.0	729.6 729.3	+ 3.1 + 0.5	+ 1.1 — 2.6	4.4	rechts	Luft II
März 4	5.8 7.0 9.2 11.5	724.8 — 724.0 723.1	+ 6.3 — + 4.4 + 2.9	+ 5.5 — + 2.8 + 0.2	5.3 4.8 4.0	rechts	Luft II. ☉ Luft I—II. Von 10 ^h ab Luft III, später Himmel schwach bezogen.
— 19	8.0 11.8	719.1 719.1	— 1.7 — 2.8	— 8.7 — 10.5	3.1	rechts	Luft III, um 11 ^h II, am Schluss unruhig.
April 4	8.5 10.5	711.5 710.2	+ 8.0 + 6.1	+ 5.9 + 3.6	3.7	rechts	☉ Luft III, unruhig; besonders gegen den Schluss diffuse Bilder.
— 5	6.7 9.8	704.3 704.0	+ 12.2 + 10.0	+ 9.2 + 8.3	5.1	rechts	☉ Starker Wind, Luft III; um 9 ^{1/2} ^h ganz bewölkt.
— 6	7.3 9.7	703.1 703.5	+ 12.3 + 10.4	+ 11.0 + 7.7	4.4	links	☉ Luft III, heftiger SE Wind, nach 9 ^h ganz überzogen.

Datum	Mittl. Zeit	Barom.	T	t	Ocular	Schraube	Bemerkungen.
1887							
April 20	^h 7.3 10.5	^{mm} 716.2 716.1	[°] + 9.6 + 8.3	[°] + 12.0 + 7.3	4.0	links	Luft III, diffuse Bilder, am Schluss sehr unruhig.
— 21	7.5 11.0	712.9 712.5	+ 10.5 + 8.0	+ 9.8 + 4.5	4.0	links	Luft II—III, am Schluss sehr unruhig.
— 22	8.0* 9.8	708.1 709.5	0.0 + 11.3	+ 12.3 + 9.4	5.0 4.3	links	Luft II, erst nach 8 ^h klar; windig, nach 9 ^h Luft unter III.
— 29	8.0*	713.9	0.0	+ 14.0	4.5	links	Luft III, Bilder diffus und stark wallend; um 8 ^{3/4} ^h total bewölkt.
Fernrohr links.							
October 13	8.0* 10.5	709.0 710.2	0.0 + 6.9	+ 2.8 + 0.6	3.2	rechts	Luft II, später schlechter, am Schluss III; unbequeme Stellung.
— 23	6.0 10.0	722.3 720.9	+ 6.6 + 4.2	+ 3.0 — 0.7	3.4 4.0	rechts	Luft II, sehr gut; am Schluss I. Wegen sehr steiler Lage des Fernrohrs höchst unbequeme Stellung.
— 26	5.5 7.8 10.5	726.9 — 725.3	+ 2.8 — + 0.8	— 2.3 — 3.8 — 4.8	2.7 2.7	rechts	Luft III, diffuse, unruhige Bilder; von 7 ^h ab etwas bessere Luft (II), aber windig.
— 27	4.8 6.5	717.0 716.8	+ 5.0 + 3.5	+ 0.2 — 0.8	3.1 3.1	links	☉ Luft III; um 6 ^h 30 ^m ganz bezogen.
— 28	5.0 10.0	713.4 713.9	+ 4.9 + 1.9	+ 2.2 — 0.9	3.3 3.3	links	☉ Luft II—III.
November 13	5.5 8.2	715.1 713.9	+ 3.4 + 2.3	0.0 — 1.3	3.3	links	Luft II, Bilder ruhig, aber schlecht.
— 16	5.0 7.7	721.7 721.5	+ 0.2 — 1.0	— 6.5 — 9.8	2.4	links rechts	Luft III—IV, von 6 ^h ab II—III, gegen den Schluss wieder III—IV.
— 17	5.0 8.3	715.6 713.8	0.0 — 1.5	— 5.5 — 8.0	2.2 2.2	rechts	Luft III—IV, nach 7 ^h besser: II—III.
— 19	6.0	702.5	+ 1.7	0.0	3.1	rechts	Luft IV, diffuse Bilder. Um 7 ^h Schluss wegen zu schlechter Luft.
— 26	5.3 8.6	718.3 715.5	+ 4.8 + 3.5	+ 3.5 + 0.7	4.0 4.0	rechts	Luft II—III.
— 28	6.0 8.3	719.2 718.6	+ 4.1 + 3.1	+ 2.3 + 0.6	4.0	rechts	☉ Luft II, Himmel milchig. Am Schluss Luft I—II, sehr unbequeme Stellung.
— 29	6.0 7.4	713.8 713.7	+ 4.2 + 3.5	+ 2.8 + 1.0	3.5	links	☉ Luft III, feine Nebelwolken; Bilder diffus und wallend. Um 7 ^h ganz bezogen.
December 2	5.5 8.0	727.9 727.6	+ 1.6 + 0.7	— 2.0 — 5.0	3.7	links	Luft I, ausgezeichnete Bilder; um 7 ^h ☉ und schwacher Nebel.
1888							
Fernrohr rechts.							
Februar 19	8.0*	699.7	0.0	— 3.6	3.5	rechts	Luft III, heftiger NE-Wind, um 8 ^h 30 ^m ganz bezogen.
— 24	6.0 8.0*	706.9 707.3	— 1.2 0.0	— 6.5 — 8.8	2.8	rechts	Luft IV, Bilder ganz schlecht, um 7 ^{1/2} ^h vollständig bedeckt.
März 1	6.5 7.5 11.0	716.8 716.6 715.8	— 0.3 — 0.8 — 2.3	— 4.4 — 5.0 — 7.2	3.9	rechts	Luft I—II. Im Taster kein Strom mehr, daher Schluss.
— 7	8.0*	720.0	0.0	+ 1.3	3.4	links	Luft IV; heftiger W-Wind, um 7 ^{1/2} ^h ganz bedeckt.
— 8	6.5 8.0* 11.0	718.5 717.7 718.0	+ 4.6 0.0 + 2.5	+ 4.7 + 3.1 + 4.5	4.1	links	Luft II, nach 9 ^h III, 10 ^h IV. Um 11 ^h Schluss wegen ganz schlechter Luft und starkem NW-Wind. Taster hat eine zeitlang versagt.

Datum	Mittl. Zeit	Barom.	T	t	Ocular	Schraube	Bemerkungen.
1888							
März 15	^h 8.0* 10.3	^{mm} 700.8 700.7	^o 0.0 + 4.3	^o + 3.3 + 1.8	4.0	links	Alle Beob. durch Wolken, z. Th. mit Fadenbeleuchtung, d. Taster versagte öfters.
— 16	6.8 8.0* 10.0	701.9 701.0 701.5	+ 6.7 0.0 + 4.7	+ 5.5 + 4.4 + 2.5	3.8	rechts	Luft II " IV, um 9 ^h wieder etwas besser. " IV, ganz schlecht, daher Schluss.
— 20	6.5 8.0* 9.8 11.3	714.1 714.2 — 714.8	+ 1.5 0.0 — 0.0	— 0.5 — 2.0 — — 3.6	3.8 3.5	rechts	Luft II; Plejaden, später Perseus. Luft III—IV. Ganz überzogen.
— 21	6.3 8.0* 11.5	714.0 713.5 713.7	+ 3.5 0.0 + 0.9	+ 2.1 + 0.6 — 1.5	3.9	rechts	Luft II; Plejaden, später Perseus; um 9 ^h II—III; Bilder sehr schwach. Mehrfach Störungen im Taster und Uhrcontact.
— 23	6.3 8.0* 9.5 12.0	706.0 705.7 — 705.8	+ 4.4 0.0 — + 1.0	+ 3.0 + 0.5 — — 1.6	4.1 3.8	links	Plejaden, später Perseus. Luft II, etwas windig.
April 16	7.0 12.4	716.1 716.2	+ 12.1 + 8.4	+ 11.5 + 5.4	5.1	links	Luft II, Störungen im Taster; gegen den Schluss sehr schwache Bilder.
— 24	8.0*	711.9	0.0	+ 12.4	5.1	links	☉ nur ganz kurze Zeit aufgezo-
— 28	8.0* 11.4	718.9 720.1	0.0 + 6.7	+ 7.0 + 5.8	4.4	links	Luft IV, erst nach 9 ^h klar, windig, vielfach durch Wolken. Am Schluss ganz überzogen.
— 29	8.0* 11.5	715.1 716.3	0.0 + 10.3	+ 12.2 + 9.1	5.6	links	Luft III—IV; wieder erst nach 9 ^h klar, windig; am Schluss Luft ganz schlecht, schwach bewölkt.
Mai 23	8.0*	720.1	0.0	+ 10.6	5.7	links	☉ erst nach 9 ^h auf kurze Zeit klar, Luft IV, Contact im Taster sehr träg.
October 16	6.7 9.3	723.9 723.9	+ 7.0 + 6.3	+ 4.2 + 2.4	3.5	rechts	Luft II—III, am Schluss I.
— 19	6.8 9.8	724.3 725.0	+ 4.7 + 3.8	— 1.0 — 2.6	3.4	links	☉ Luft III.
November 10	5.0 8.0*	717.7 718.8	+ 1.2 0.0	— 2.5 — 4.8	3.3	rechts	Sehr windig, Bilder scharf, aber wegen des vibrirenden Rohres unruhig; Störungen im Tasterschluss.
— 11	5.0 8.0*	719.1 718.5	+ 1.6 0.0	— 2.5 — 5.0	3.2	rechts	Luft II, später I, um 8 ^h 50 ^m blieb in Folge der Kälte das Uhrwerk des Chronographen stehen, daher Schluss.
— 13	5.5 7.0	713.1 712.8	+ 0.6 + 0.1	— 1.9 — 2.9	3.2	links	Luft II, am Schluss Wolken von NW.
— 14	6.0 8.0*	726.6 727.0	+ 1.4 0.0	— 0.4 — 2.1	3.2 4.0	rechts	☉ Luft II—III, am Schluss starker Nebel.
— 26	4.8 8.0	716.1 716.6	+ 8.7 + 7.1	+ 10.8 + 8.2	4.2	rechts	Luft IV, windig, Bilder unruhig und sehr verwaschen, später etwas besser.
— 27	5.0 8.2*	711.4 710.4	+ 8.7 0.0	+ 5.5 + 4.0	4.0	links	Luft III, Bilder schwach, aber ruhig. " II, unbequeme Stellung.
December 14	5.0 7.0	724.3 724.1	— 1.5 — 2.4	— 5.8 — 7.3	3.2	rechts	Luft II, das Uhrwerk des Chronographen blieb wieder stehen.
* — 21	4.5 7.0	707.1 706.2	+ 1.3 — 0.5	— 2.6 — 5.7	3.3	links	Luft III, dunstig; später besser.
1889							
Januar 29	11.0	716.9	— 1.5	— 2.3	3.5	links	Luft IV; erst gegen 10 ^h klar, um 11 ^h wieder bedeckt

Datum	Mittl. Zeit	Barom.	T	t	Ocular	Schraube	Bemerkungen
1889							
Februar 13	^h 6.0 7.0 8.0* 10.0	^{mm} — — 719.8 719.1	^o — — 0.0 —6.1	^o — — —13.8 —15.0	2.7	rechts links	Luft II.
März 11	6.5 8.0*	— 704.0	— 0.0	— + 2.7	4.0	links	Luft II, häufig durch Wolken beobachtet, um 7 ^h ganz bezogen.
— 18	8.0*	712.3	0.0	— 3.0	3.4	links	☉ Luft III, Himmel milchig.

Anmerkung: Die Baro- und Thermometerablesungen, bei denen die zugehörige Zeit mit einem * versehen ist, wurden dem meteorologischen Journal der Sternwarte entnommen; die Barometerstände sind in diesem Fall bereits auf 0,° reducirt, daher hier stets $T=0$.

Im Ganzen sind sonach auf die Messung aller Rectascensions- und Declinationsdifferenzen 69 Abende verwendet worden.

Was die Bezifferung der Sterne anlangt, so versuchte ich Anfangs, derjenigen Lamont's zu folgen. Als aber die Anzahl der Sterne grösser wurde und auch solche vorkamen, die bei Lamont fehlen, musste ich hierauf verzichten und die Sterne einfach nach der chronologischen Reihenfolge ihrer erstmaligen Beobachtung beziffern.

Die nachfolgenden beiden Tabellen enthalten die beobachteten und auf das mittlere Aequinoctium 1890.0 reducirten Rectascensions- und Declinationsdifferenzen und zwar gibt

Columnne 1: Die Bezeichnung der beobachteten Differenz und zwar in dem Sinne, dass der absolute Ort des zuerst genannten Sternes erhalten wird, wenn die gemessene Differenz mit ihrem Vorzeichen zum absoluten Ort des zweitgenannten Sternes addirt wird;

Columnne 2: Das Datum.

Columnne 3: Den Stundenwinkel der Beobachtung; bei den Declinationsdifferenzen geht noch die Angabe über die Lage der Mikrometerschraube voraus;

Columnne 4: Die gemessene, scheinbare Differenz;

Columnne 5: Bei den AR-Differenzen die Anzahl der Fadenantritte der beiden verglichenen Sterne, bei den Decl.-Differenzen die Anzahl der einzelnen Einstellungen der Schraube;

Columnne 6: Die Summe der Verbesserungen der beobachteten Differenzen wegen Refraction, Präcession, Nutation und Aberration, bei den Decl.-Differenzen noch jene wegen der periodischen Schraubenfehler; stets in Einheiten der letzten Decimalstelle.

Columnne 7: Die auf 1890.0 reducirten Differenzen.

Columnne 8: Die Mittelwerthe der letzteren. Bei den AR-Differenzen sind diese Mittel nach Massgabe der Anzahl der Fadenantritte aus den einzelnen Abendmitteln berechnet, weil diese Anzahl häufig sehr verschieden war, bei den Declinationsdifferenzen dagegen, wo fast alle Abendmittel auf einer gleichen Anzahl von Einstellungen beruhen, wurde aus den einzelnen Abendmitteln schlechthin das Mittel genommen.

Columnne 9: Die Summe aller Fadenantritte, bzw. Einzelneinstellungen;

Columnne 10: Die aus diesen Summen (durch Division mit 5) berechneten, bei der Ausgleichung der Beobachtungen benützten Gewichte der in Columnne 8 enthaltenen Mittelwerthe.

Rectascensionsdifferenzen.

Beobachtete Differenz	Datum	Stunden- winkel	$\Delta \alpha$ app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correc- tionen.	$\Delta \alpha$ 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
2—1	1888, Febr. 24	2.7	+ 1.913	6	0	+ 1.913	+ 1.960	75	15
	März 1	6.0	1.910	8	0	1.910			
	— 15	6.9	1.890	2	0	1.890			
	— 16	6.2	1.961	27	0	1.961			
	— 20	7.7	1.948	5	— 1	1.947			
	— 23	8.3	2.080	4	— 1	2.079			
	April 16	7.4	2.130	4	— 1	2.129			
	— 28	10.5	2.085	4	0	2.085			
	— 29	11.0	2.060	1	0	2.060			
	Novbr. 10	21.4	1.893	14	+ 1	1.894			
3—1	1888, März 1	6.3	+ 4.354	9	0	+ 4.354	+ 4.319	69	14
	— 16	6.2	4.293	28	0	4.293			
	— 20	7.6	4.298	5	0	4.298			
	— 23	7.7	4.347	10	— 1	4.346			
	Novbr. 10	21.4	4.331	17	+ 2	4.333			
4—1	1888, Febr. 24	2.7	+ 9.075	2	+ 2	+ 9.077	+ 9.010	98	20
	März 1	6.0	8.966	8	+ 2	8.968			
	— 16	6.7	8.995	36	+ 2	8.997			
	— 20	7.6	8.929	4	0	8.929			
	— 23	7.7	9.032	9	+ 1	9.033			
	April 16	7.9	8.945	5	+ 1	8.946			
	— 28	11.2	8.895	2	+ 3	8.898			
	Novbr. 10	21.4	9.039	20	+ 2	9.041			
	1889, Jan. 29	3.9	9.090	7	+ 1	9.091			
	Febr. 13	3.7	8.990	5	+ 1	8.991			
4—38	1888, März 16	6.7	— 13.630	5	— 5	— 13.635	— 13.468	15	3
	1889, Jan. 29	3.9	13.350	6	— 2	13.352			
	Febr. 13	3.7	13.433	4	— 2	13.435			
5—1	1888, Febr. 24	2.7	+ 4.706	7	+ 1	+ 4.707	+ 4.669	72	14
	März 1	6.0	4.698	9	+ 1	4.699			
	— 16	6.7	4.728	7	+ 1	4.729			
	— 20	7.9	4.700	5	+ 1	4.701			
	— 23	8.5	4.627	13	+ 1	4.628			
	April 16	8.7	4.573	8	+ 1	4.574			
	— 28	10.4	4.712	6	+ 1	4.713			
	— 29	11.0	4.840	2	+ 1	4.841			
	Novbr. 10	21.4	4.638	15	+ 1	4.639			
6—1	1888, Febr. 24	2.7	+ 5.899	7	0	+ 5.899	+ 5.974	72	14
	März 1	6.0	5.939	9	+ 1	5.940			
	— 16	6.7	6.006	8	+ 1	6.007			
	— 20	7.9	6.050	7	+ 1	6.051			
	— 23	8.7	6.021	12	+ 1	6.022			
	April 16	8.7	5.987	8	+ 1	5.988			
	— 28	9.6	6.240	1	+ 2	6.242			
	— 29	11.0	5.870	1	+ 2	5.872			
	Novbr. 10	21.0	5.880	7	+ 1	5.881			
	1889, Jan. 29	3.9	5.986	5	0	5.986			
7—1	1888, März 1	6.3	+ 5.938	9	+ 1	+ 5.939	+ 5.835	83	17
	— 16	6.2	5.872	27	+ 1	5.873			
	— 20	7.6	5.770	5	0	5.770			
	— 23	7.8	5.786	12	0	5.786			
	April 28	10.6	5.888	6	+ 2	5.890			
	Novbr. 10	21.6	5.835	12	+ 2	5.837			
	1889, Jan. 29	3.9	5.694	7	+ 1	5.695			
	Febr. 13	4.0	5.752	5	0	5.752			

Beobachtete Differenz	Datum	Stunden- winkel	$\Delta \alpha$ app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correc- tionen	$\Delta \alpha$ 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
8—1	1888, März 20	7.6	+ 13.281	1	0	+ 13.281	+ 13.231	93	19
	— 23	7.7	12.968	5	+ 1	12.969			
	Novbr. 10	21.3	13.066	9	+ 3	13.069			
	— 14	20.9	13.125	13	+ 3	13.128			
	— 26	22.0	13.342	29	+ 2	13.344			
	— 27	20.7	13.239	27	+ 2	13.241			
	1889, Jan. 29	3.9	13.340	2	+ 1	13.341			
	Febr. 13	3.9	13.274	7	0	13.274			
8—38	1888, März 16	6.7	— 9.665	2	— 4	— 9.669	— 9.344	11	2
	1889, Jan. 29	3.9	9.220	2	— 3	9.223			
	Febr. 13	3.9	9.283	7	— 3	9.286			
8—41	1888, Novbr. 14	20.9	+ 29.696	13	+ 5	+ 29.701	+ 29.692	14	3
	1889, Febr. 13	4.0	29.580	1	0	29.580			
9—1	1888, März 1	6.0	— 1.329	7	0	— 1.329	— 1.300	184	37
	— 16	5.9	1.388	4	0	1.388			
	— 20	7.6	1.350	14	0	1.350			
	— 23	7.7	1.365	11	0	1.365			
	April 16	9.4	1.350	11	— 1	1.351			
	Novbr. 10	19.3	1.288	75	0	1.288			
	— 27	21.9	1.273	62	0	1.273			
	1888, Novbr. 27	22.0	+ 15.281	20	+ 1	+ 15.282			
10—1	1888, März 16	5.9	— 4.325	2	0	— 4.325	— 4.212	77	15
	— 20	7.7	4.153	16	0	4.153			
	— 23	7.7	4.281	11	0	4.281			
	Novbr. 10	19.1	4.121	19	— 2	4.123			
	— 27	21.5	4.245	21	0	4.245			
	1889, Febr. 13	3.9	4.332	8	— 1	4.333			
	1888, März 23	7.7	+ 6.119	10	+ 1	+ 6.120			
	1888, März 23	7.7	+ 12.202	9	+ 3	+ 12.205			
10—14	1888, März 23	7.7	+ 12.202	9	+ 3	+ 12.205	+ 12.252	19	4
	Novbr. 27	21.5	12.336	7	+ 1	12.337			
10—41	1889, Febr. 13	3.9	12.196	3	+ 1	12.197	+ 10.698	22	4
	1889, Febr. 13	3.9	12.196	3	+ 1	12.197			
10 ^a —1	1888, März 16	5.9	— 5.355	2	— 1	— 5.356	— 5.714	95	19
	— 20	7.8	5.706	21	— 1	5.707			
	— 23	7.8	5.740	13	— 1	5.741			
	Novbr. 10	19.1	5.659	20	— 1	5.660			
	— 27	21.5	5.736	21	— 1	5.737			
	1889, Febr. 13	3.9	5.777	18	0	5.777			
	1888, März 23	7.7	+ 4.724	9	+ 1	+ 4.725			
	1888, März 23	7.7	+ 10.654	9	+ 2	+ 10.656			
10 ^a —14	1888, März 23	7.7	+ 10.654	9	+ 2	+ 10.656	+ 10.698	22	4
	Novbr. 27	21.5	10.771	7	+ 1	10.772			
10 ^a —41	1889, Febr. 13	3.9	10.673	6	0	10.673	+ 12.225	13	3
	1889, Febr. 13	3.9	10.673	6	0	10.673			
11—1	1888, Febr. 24	2.7	— 4.376	7	— 1	— 4.377	— 4.282	100	20
	März 1	6.0	4.268	6	0	4.268			
	— 16	6.3	4.293	3	— 1	4.294			
	— 20	7.6	4.350	1	+ 1	4.349			
	April 29	11.0	3.997	3	— 1	3.998			
	Novbr. 10	19.1	4.268	34	— 2	4.270			
	— 27	22.2	4.256	40	— 2	4.258			
	1889, Febr. 13	3.7	4.542	6	0	4.542			
	1888, Novbr. 27	22.1	+ 12.269	12	+ 2	+ 12.271			
	1889, Febr. 13	3.7	11.670	1	+ 2	11.672			
11—41	1888, Novbr. 27	22.1	+ 12.269	12	+ 2	+ 12.271	+ 12.225	13	3
	1889, Febr. 13	3.7	11.670	1	+ 2	11.672			

Beobachtete Differenz	Datum	Stunden- winkel	Δa app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correc- tionen	Δa 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
12—1	1888, Febr. 24	2.7	— 5.453	6	— 1	— 5.454	— 5.536	83	17
	März 1	6.0	5.549	7	— 1	5.550			
	— 16	6.3	5.623	4	— 1	5.624			
	April 29	11.0	5.370	3	— 1	5.371			
	Novbr. 10	19.1	5.551	35	— 2	5.553			
	— 27	22.3	5.501	24	— 2	5.503			
	1889, Febr. 13	3.7	5.720	4	0	5.720			
12—41	1888, Novbr. 27	22.3	+ 11.156	8	+ 2	+ 11.158	+ 11.145	9	2
	1889, Febr. 13	3.7	11.040	1	+ 2	11.042			
2 ^a — 1	1888, Novbr. 10	20.5	— 5.815	2	— 3	— 5.818	— 5.664	16	3
	— 14	20.9	5.589	9	— 2	5.591			
	— 26	21.6	5.730	5	— 3	5.733			
12 ^a — 41	1888, Novbr. 10	20.5	+ 10.763	3	+ 3	+ 10.766	+ 10.797	18	4
	— 14	20.9	10.786	9	+ 2	10.788			
	— 26	21.6	10.823	6	+ 2	10.825			
13—1	1888, März 1	6.0	— 6.470	1	— 1	— 6.471	— 6.732	89	18
	— 16	6.2	6.780	1	— 1	6.781			
	— 20	7.8	6.757	17	— 1	6.758			
	— 23	7.8	6.779	10	— 1	6.780			
	Novbr. 10	19.1	6.736	22	— 1	6.737			
	— 27	21.7	6.687	26	— 1	6.688			
	1889, Febr. 13	4.0	6.760	12	0	6.760			
13—14	1888, März 23	7.7	+ 3.777	10	+ 1	+ 3.778	+ 3.778	10	2
13—41	1888, März 23	7.7	+ 9.787	9	+ 2	+ 9.789	+ 9.751	22	4
	Novbr. 27	21.8	9.806	10	+ 1	9.807			
	1889, Febr. 13	3.9	9.447	3	0	9.447			
14—1	1888, Febr. 24	2.7	— 10.573	7	— 1	— 10.574	— 10.522	168	34
	März 1	6.0	10.731	7	— 1	10.732			
	— 16	5.9	10.495	4	— 2	10.497			
	— 20	7.8	10.549	26	— 2	10.551			
	— 23	7.9	10.515	17	— 2	10.517			
	April 16	10.0	10.580	7	— 3	10.583			
	— 28	9.6	10.470	1	— 3	10.473			
	— 29	11.0	10.474	5	— 4	10.478			
	Novbr. 10	19.1	10.520	22	— 2	10.522			
	— 14	20.9	10.517	28	— 1	10.518			
	— 27	21.8	10.439	30	— 1	10.440			
	1889, Febr. 13	3.9	10.518	14	0	10.518			
14—14 ^a	1888, März 23	7.7	+ 2.698	6	0	+ 2.698	+ 2.698	6	1
14—14 ^b	1888, März 23	7.7	+ 3.207	7	0	+ 3.207	+ 3.207	7	1
14—22	1888, März 23	7.7	— 0.648	6	+ 1	— 0.647	— 0.647	6	1
14—38	1888, März 23	7.7	— 33.160	3	— 6	— 33.166	— 33.166	3	1
14—41	1888, März 23	7.7	+ 5.938	9	+ 2	+ 5.940	+ 6.003	67	13
	Novbr. 14	20.9	5.969	36	+ 1	5.970			
	— 27	21.9	6.107	15	+ 1	6.108			
	Dec. 21	20.9	6.150	3	0	6.150			
	1889, Febr. 13	3.9	5.932	4	+ 1	5.933			
14 ^a — 1	1888, März 1	6.0	— 13.205	6	— 2	— 13.207	— 13.164	92	18
	— 20	7.8	13.118	4	— 2	13.120			
	— 23	8.0	13.137	11	— 2	13.139			
	Novbr. 10	19.2	13.311	22	— 3	13.314			

Beobachtete Differenz	Datum	Stunden- winkel	Δa app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correc- tionen	Δa 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
14 ^a — I	1888, Novbr. 14	20.9	— 12.995	28	— 3	— 12.998			
	— 27	21.9	13.209	18	— 1	13.210			
	1889, Febr. 13	4.0	13.407	3	— 2	13.409			
14 ^a — 4I	1888, März 23	7.7	+ 3.250	9	+ 2	+ 3.261	+ 3.408	61	12
	Novbr. 14	20.9	3.461	36	+ 1	3.462			
	— 27	22.0	3.370	16	0	3.370			
14 ^b — I	1888, März 23	7.8	— 13.589	12	— 2	— 13.591	— 13.700	53	11
	Novbr. 14	20.9	13.765	28	— 3	13.768			
	— 27	22.1	13.670	11	— 2	13.672			
	1889, Febr. 13	4.0	13.560	2	0	13.560			
14 ^b — 4I	1888, März 23	7.7	+ 2.831	9	+ 2	+ 2.833	+ 2.756	56	11
	Novbr. 14	20.9	2.703	36	+ 1	2.704			
	— 27	22.0	2.863	11	+ 1	2.864			
15 — I	1888, Febr. 24	2.7	— 8.848	4	— 1	— 8.849	— 8.767	146	29
	März 1	6.0	8.764	8	— 1	8.765			
	— 16	5.9	8.883	4	— 2	8.885			
	— 20	7.7	8.752	27	0	8.752			
	— 23	8.0	8.722	5	0	8.722			
	April 16	10.0	8.758	21	— 3	8.761			
	Novbr. 10	19.1	8.768	15	— 4	8.772			
	— 27	22.1	8.713	43	— 2	8.715			
	1889, Febr. 13	4.0	8.880	19	— 1	8.881			
15 — 4I	1888, Novbr. 27	22.1	+ 7.805	16	+ 2	+ 7.807	+ 7.760	23	5
	1889, Febr. 13	4.0	7.650	7	+ 3	7.653			
15 ^a — I	1888, Novbr. 14	21.4	— 7.055	26	— 2	— 7.057	— 7.054	27	5
	— 26	21.6	6.960	1	— 3	6.963			
16 — I	1888, März 1	6.0	— 10.220	1	— 2	— 10.222	— 10.094	104	21
	— 16	5.9	9.815	2	— 1	9.816			
	— 20	7.7	10.021	28	+ 1	10.020			
	April 16	10.0	9.979	12	— 4	9.983			
	Novbr. 10	19.6	10.094	15	— 5	10.099			
	— 27	21.9	10.105	19	— 2	10.107			
	1889, Febr. 13	4.1	10.222	27	— 1	10.223			
16 — 4I	1888, Novbr. 27	21.9	+ 6.373	6	+ 2	+ 6.375	+ 6.313	26	5
	1889, Febr. 13	4.2	6.291	20	+ 4	6.295			
17 — I	1888, März 20	7.9	— 5.713	8	+ 2	— 5.711	— 5.536	81	16
	April 16	10.0	5.523	20	— 2	5.525			
	Novbr. 10	19.6	5.510	27	— 4	5.514			
	— 27	21.9	5.538	21	— 2	5.540			
	1889, Febr. 13	3.7	5.408	5	— 1	5.409			
17 — 4I	1888, Novbr. 27	21.9	+ 10.924	7	+ 2	+ 10.926	+ 10.916	8	2
	1889, Febr. 13	3.7	10.840	1	+ 4	10.844			
18 — I	1888, März 1	6.0	— 3.730	7	— 1	— 3.731	— 3.645	152	30
	— 16	5.9	3.606	5	— 1	3.607			
	— 20	7.9	3.745	14	+ 1	3.744			
	April 16	10.0	3.685	19	— 2	3.687			
	Novbr. 10	19.4	3.589	57	— 3	3.592			
	— 27	22.1	3.615	34	— 1	3.616			
	1889, Febr. 13	3.9	3.730	16	— 1	3.731			
18 — 4I	1888, Novbr. 27	22.1	+ 12.963	12	+ 2	+ 12.965	+ 12.869	17	3
	1889, Febr. 13	3.9	12.636	5	+ 3	12.639			

Beobachtete Differenz	Datum	Stunden- winkel	$\Delta \alpha$ app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correc- tionen	$\Delta \alpha$ 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
19—1	1888, Febr. 24	3.1	+ 9.205	16	+ 8	+ 9.213	+ 9.141	180	36
	März 1	6.3	9.199	9	+ 8	9.207			
	— 8	7.2	9.151	19	+ 8	9.159			
	— 15	7.5	9.146	19	+ 8	9.154			
	— 20	7.9	9.133	4	+ 6	9.139			
	— 23	8.5	9.074	30	+ 8	9.082			
	April 16	10.0	9.103	6	+ 13	9.116			
	— 24	9.2	9.158	6	+ 9	9.167			
	— 28	9.6	9.063	17	+ 12	9.075			
	— 29	11.1	9.167	34	+ 11	9.178			
	1889, Febr. 13	4.3	9.092	20	+ 6	9.098			
19—19 ^a	1888, März 8	7.4	— 2.731	8	— 3	— 2.734	— 2.581	29	6
	— 20	7.9	2.560	5	— 2	2.562			
	— 23	8.7	2.567	7	— 3	2.570			
	1889, Febr. 13	4.3	2.460	9	— 3	2.463			
19—19 ^b	1888, März 1	7.2	— 14.729	8	— 5	— 14.734	— 14.694	36	7
	— 8	7.5	14.735	2	— 5	14.740			
	— 23	8.7	14.706	13	— 7	14.713			
	1889, Febr. 13	4.3	14.640	13	— 4	14.644			
19—38	1889, Febr. 13	4.0	— 13.572	5	— 2	— 13.574	— 13.574	5	1
19—41	1888, April 29	11.5	+ 25.740	9	+ 15	+ 25.755	+ 25.681	25	5
	1889, Febr. 13	4.3	25.632	16	+ 7	25.639			
19—52	1888, März 1	7.2	+ 45.293	7	+ 4	+ 45.297	+ 45.398	63	13
	— 8	7.5	45.380	3	+ 5	45.385			
	1889, März 11	3.9	45.418	37	+ 2	45.420			
	— 18	9.4	45.388	16	+ 4	45.392			
19—57	1889, März 11	3.9	+ 25.610	11	+ 3	+ 25.613	+ 25.611	31	6
	— 18	9.4	25.605	20	+ 5	25.610			
19 ^a —19 ^b	1888, März 1	7.2	— 12.050	3	— 2	— 12.052	— 12.052	3	1
20—1	1888, März 1	6.3	+ 2.284	11	+ 4	+ 2.288	+ 2.361	115	23
	— 23	8.7	2.497	10	+ 4	2.501			
	April 16	10.0	2.310	4	+ 5	2.315			
	Novbr. 10	19.2	2.338	22	+ 2	2.340			
	— 14	21.4	2.393	29	+ 1	2.394			
	— 27	21.4	2.344	34	+ 1	2.345			
	1889, Febr. 13	4.0	2.276	5	+ 3	2.279			
20—38	1888, Novbr. 14	21.4	— 20.172	21	— 4	— 20.176	— 20.253	44	9
	— 27	22.0	20.309	18	— 3	20.312			
	1889, Febr. 13	4.0	20.360	5	— 1	20.361			
21—1	1888, März 20	7.9	+ 2.243	4	+ 2	+ 2.245	+ 2.067	131	26
	— 23	7.7	2.048	9	+ 2	2.050			
	Novbr. 10	19.2	2.018	44	+ 2	2.020			
	— 14	21.4	2.150	29	+ 1	2.151			
	— 27	21.4	2.061	41	+ 1	2.062			
	1889, Febr. 13	4.0	1.895	4	+ 3	1.898			
21—38	1888, Novbr. 14	21.4	— 20.398	22	— 4	— 20.402	— 20.535	44	9
	— 27	22.0	20.672	18	— 3	20.675			
	1889, Febr. 13	4.0	20.635	4	0	20.635			
22—1	1888, März 23	7.7	— 9.953	7	— 3	— 9.956	— 9.925	60	12
	Novbr. 10	20.5	9.971	16	— 2	9.973			
	— 14	20.7	9.956	12	— 2	9.958			
	— 26	21.6	9.982	11	— 2	9.984			
	— 27	21.5	9.776	14	— 2	9.778			

Beobachtete Differenz	Datum	Stunden- winkel	Δa app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correc- tionen	Δa 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
22—41	1888, März 23	^h 7.7	^s + 6.592	5	0	^s + 6.592	+ 6.635	98	20
	Novbr. 10	20.5	6.659	32	+ 2	6.661			
	— 14	20.7	6.582	31	+ 2	6.584			
	— 26	21.6	6.673	24	+ 2	6.675			
	— 27	21.5	6.632	6	+ 2	6.634			
22 ^a —I	1888, Novbr. 10	20.5	— 7.588	17	— 2	— 7.590	— 7.532	49	10
	— 14	20.7	7.448	11	— 2	7.450			
	— 26	21.6	7.510	12	— 2	7.512			
	— 27	21.5	7.534	7	— 2	7.536			
	1889, Febr. 13	4.0	7.590	2	— 1	7.591			
22 ^a —41	1888, Novbr. 10	20.5	+ 9.084	36	+ 2	+ 9.086	+ 9.104	93	19
	— 14	20.7	9.083	32	+ 2	9.085			
	— 26	21.6	9.170	22	+ 2	9.172			
	— 27	21.5	8.990	2	+ 2	8.992			
	1889, Febr. 13	4.0	9.030	1	0	9.030			
23—I	1888, Febr. 24	2.7	— 14.805	4	— 4	— 14.809	— 14.802	64	13
	März 1	6.0	14.733	8	— 6	14.739			
	— 16	5.9	14.817	3	— 5	14.822			
	— 20	7.6	14.685	4	— 5	14.690			
	— 23	8.5	14.979	11	— 6	14.985			
	Novbr. 10	19.3	14.710	1	— 4	14.714			
	— 14	20.9	14.719	14	— 3	14.722			
	— 27	22.0	14.807	18	— 2	14.809			
	1889, Febr. 13	4.3	14.740	1	— 3	14.743			
23—41	1888, März 20	7.9	+ 1.710	7	— 1	+ 1.709	+ 1.777	51	10
	— 23	7.8	1.762	8	— 1	1.761			
	April 16	10.0	1.730	1	+ 1	1.731			
	Novbr. 14	20.9	1.831	17	+ 1	1.832			
	— 27	21.9	1.761	18	+ 1	1.762			
24—I	1888, Novbr. 10	20.5	— 11.492	12	— 5	— 11.497	— 11.422	35	7
	— 14	20.7	11.351	12	— 4	11.355			
	— 26	21.6	11.410	11	— 3	11.413			
24—41	1888, Novbr. 10	20.5	+ 5.290	33	+ 4	+ 5.294	+ 5.273	85	17
	— 14	20.7	5.215	28	+ 3	5.218			
	— 26	21.6	5.305	24	+ 3	5.308			
24 ^a —I	1888, Novbr. 10	20.5	— 14.646	16	— 4	— 14.650	— 14.568	39	8
	— 14	20.7	14.473	12	— 4	14.477			
	— 26	21.6	14.545	11	— 3	14.548			
24 ^a —41	1888, Novbr. 10	20.5	+ 1.980	37	+ 3	+ 1.983	+ 2.018	94	19
	— 14	20.7	1.983	33	+ 2	1.985			
	— 26	21.6	2.118	24	+ 2	2.120			
25—I	1888, März 23	8.7	— 14.579	11	— 11	— 14.590	— 14.592	88	18
	Novbr. 10	21.0	14.582	15	— 5	14.587			
	— 27	20.8	14.604	31	— 5	14.609			
	Dec. 21	20.9	14.546	21	— 5	14.551			
	1889, Jan. 29	3.9	14.634	10	— 6	14.640			
25—27	1888, März 16	7.3	+ 9.069	16	+ 1	+ 9.070	+ 9.067	56	11
	Novbr. 26	21.7	9.181	14	+ 1	9.182			
	Dec. 21	20.9	9.075	15	0	9.075			
	1889, Jan. 29	3.9	8.906	11	0	8.906			
25—30	1888, April 16	7.4	+ 1.388	22	+ 5	+ 1.393	+ 1.383	34	7
	1889, Febr. 13	5.2	1.358	12	+ 6	1.364			

Beobachtete Differenz	Datum	Stundenwinkel	Δa app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correctionen	Δa 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
26—1	1888, März 16	5.9	— 14.290	1	— 12	— 14.302	— 14.317	60	12
	Novbr. 10	21.6	14.324	18	— 6	14.330			
	— 27	21.1	14.263	24	— 5	14.268			
	1889, Jan. 29	3.9	14.366	17	— 7	14.373			
26—27	1888, März 16	6.9	+ 9.423	16	+ 1	+ 9.424	+ 9.391	39	8
	Novbr. 26	21.7	9.426	13	+ 2	9.428			
	1889, Jan. 29	3.9	9.290	10	+ 1	9.291			
26—30	1888, April 16	7.4	+ 2.001	9	+ 5	+ 2.006	+ 1.868	25	5
	— 28	11.2	1.772	6	+ 7	1.779			
	1889, Febr. 13	5.2	1.792	10	+ 5	1.797			
27—1	1888, Febr. 24	2.5	— 23.583	1	— 7	— 23.590	— 23.652	113	23
	März 1	6.0	23.589	7	— 8	23.597			
	— 23	8.7	23.662	19	— 12	23.674			
	April 28	9.6	23.644	19	— 16	23.660			
	Novbr. 10	21.4	23.638	28	— 6	23.644			
	— 27	20.9	23.650	39	— 5	23.655			
27—30	1888, März 8	6.1	— 7.762	18	0	— 7.762	— 7.727	103	21
	— 16	7.1	7.693	33	+ 1	7.692			
	April 16	7.4	7.739	17	+ 1	7.738			
	Novbr. 26	21.7	7.751	19	— 4	7.755			
	Dec. 21	20.9	7.737	7	3	7.740			
	1889, Febr. 13	5.2	7.698	9	— 2	7.700			
27—31	1888, März 16	6.9	— 2.397	17	+ 1	— 2.396	— 2.581	64	13
	Novbr. 26	21.7	2.585	22	— 2	2.587			
	— 27	20.7	2.678	8	— 3	2.681			
	Dec. 21	21.9	2.739	9	— 2	2.741			
	1889, Febr. 13	5.2	2.674	8	2	2.676			
27—35	1888, März 8	6.1	+ 16.803	18	+ 18	+ 16.821	+ 16.728	38	8
	Dec. 21	21.9	16.668	9	+ 5	16.673			
	1889, Febr. 13	4.8	16.609	11	+ 12	16.621			
27—41	1888, März 23	8.7	— 7.190	2	— 9	— 7.199	— 7.141	32	6
	Dec. 21	20.9	7.139	16	— 4	7.143			
	1889, Jan. 29	3.9	7.124	14	— 6	7.130			
27—45	1888, Dec. 21	20.9	+ 10.666	10	+ 5	+ 10.671	+ 10.683	21	4
	1889, Jan. 29	3.9	10.689	11	+ 4	10.693			
27—62	1888, Dec. 21	20.9	+ 106.837	23	+ 9	+ 106.846	+ 106.836	41	8
	1889, Jan. 29	3.9	106.815	18	+ 9	106.824			
27—63	1888, Dec. 21	20.9	+ 111.979	23	+ 12	+ 111.991	+ 112.005	40	8
	1889, Jan. 29	3.9	112.010	17	+ 13	112.023			
27—64	1889, Jan. 29	3.9	+ 98.837	11	+ 2	+ 98.839	+ 98.839	11	2
27—65	1888, April 28	11.2	+ 49.614	11	+ 18	+ 49.632	+ 49.718	51	10
	Dec. 21	20.9	49.691	22	+ 3	49.694			
	1889, Jan. 29	3.9	49.798	18	+ 2	49.800			
27—66	1888, Dec. 21	20.9	+ 64.257	19	+ 4	+ 64.261	+ 64.298	34	7
	1889, Jan. 29	3.9	64.341	15	+ 3	64.344			
27—69	1889, Jan. 29	3.9	+ 114.575	13	+ 1	+ 114.576	+ 114.576	13	3
28—1	1888, März 8	7.2	— 7.849	18	+ 1	— 7.848	— 7.920	64	13
	April 29	11.5	7.800	5	0	7.800			
	Novbr. 10	19.6	7.856	20	— 8	7.864			
	1889, Febr. 13	4.3	8.062	21	— 3	8.065			
28—41	1888, März 8	7.2	+ 8.600	1	+ 10	+ 8.610	+ 8.541	22	4
	1889, Febr. 13	4.3	8.529	21	+ 9	8.538			

Beobachtete Differenz	Datum	Stunden- winkel	Δa app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correc- tionen	Δa 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
28—52	1888, März 1	7.2	+ 28.280	1	+ 2	+ 28.282	+ 28.393	27	5
	— 8	7.5	28.358	13	+ 3	28.361			
	1889, Jan. 29	4.6	28.469	7	+ 2	28.471			
	März 11	3.9	28.305	4	+ 2	28.307			
	— 18	9.4	28.550	2	+ 3	28.553			
28—57	1888, März 1	7.2	+ 8.555	4	— 3	+ 8.552	+ 8.542	17	3
	1889, Jan. 29	4.6	8.479	7	+ 4	8.483			
	März 11	3.9	8.630	4	+ 2	8.632			
	— 18	9.4	8.545	2	+ 4	8.549			
29—1	1888, März 8	7.2	— 2.939	16	+ 3	— 2.936	— 3.019	86	17
	— 20	7.9	2.917	14	+ 5	2.912			
	April 29	11.5	2.956	8	+ 1	2.955			
	Novbr. 10	19.6	3.000	27	— 7	3.007			
	1889, Febr. 13	4.3	3.193	21	3	3.196			
29—41	1888, März 8	7.2	+ 13.330	1	+ 11	+ 13.341	+ 13.404	22	4
	1889, Febr. 13	4.3	13.398	21	+ 9	13.407			
29—52	1888, März 1	7.2	+ 33.100	1	+ 3	+ 33.103	+ 33.302	26	5
	— 8	7.5	33.305	14	+ 4	33.309			
	1889, Jan. 29	4.6	33.275	2	+ 3	33.278			
	März 11	3.9	33.317	9	+ 2	33.319			
29—57	1889, Jan. 29	4.6	+ 13.523	3	+ 5	+ 13.528	+ 13.498	11	2
	März 11	3.9	13.485	8	+ 2	13.487			
30—1	1888, März 16	7.1	— 15.996	21	— 15	— 16.011	— 15.928	86	17
	— 23	8.7	15.650	2	— 17	15.667			
	April 16	7.4	15.917	6	— 14	15.931			
	— 28	9.6	15.858	27	— 23	15.881			
	Mai 23	11.5	15.875	18	— 20	15.895			
	Dec. 21	20.9	15.862	5	— 8	15.870			
	1889, Febr. 13	5.2	16.043	7	— 13	16.056			
30—31	1888, März 1	6.7	+ 5.180	4	0	+ 5.180	+ 5.193	121	24
	— 8	6.5	5.207	20	0	5.207			
	— 16	6.7	5.224	14	0	5.224			
	— 20	8.7	5.067	7	0	5.067			
	— 21	7.3	5.158	9	0	5.158			
	April 16	7.4	5.108	18	+ 1	5.109			
	— 28	11.2	5.356	5	+ 2	5.358			
	Novbr. 26	21.7	5.208	9	+ 1	5.209			
	Dec. 14	21.9	5.231	20	0	5.231			
	— 21	21.9	5.213	15	0	5.213			
30—32	1888, März 8	6.4	— 12.140	28	— 4	— 12.144	— 12.211	84	17
	— 20	8.7	12.110	1	— 3	12.113			
	— 21	7.3	12.220	2	— 3	12.223			
	April 16	7.4	12.229	7	— 4	12.233			
	Novbr. 26	21.7	12.274	24	— 2	12.276			
	Dec. 21	21.9	12.220	18	— 1	12.221			
	1889, Febr. 13	5.2	12.228	4	— 1	12.229			
30—32 ^a	1888, März 8	6.2	— 9.959	11	— 4	— 9.963	— 9.947	63	13
	April 16	7.4	9.884	7	— 4	9.888			
	Novbr. 26	21.7	9.972	27	— 2	9.974			
	Dec. 21	21.9	9.862	13	— 1	9.863			
	1889, Febr. 13	5.2	10.060	5	— 3	10.063			
30—32 ^b	1888, Novbr. 26	21.7	— 15.459	28	— 3	— 15.462	— 15.433	46	9
	Dec. 21	21.9	15.384	18	— 3	15.387			
30—32 ^c	1888, Novbr. 26	21.7	— 13.540	23	— 3	— 13.543	— 13.507	40	8
	Dec. 21	21.9	13.456	17	— 3	13.459			

Beobachtete Differenz	Datum	Stunden- winkel	Δa app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correc- tionen	Δa 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
30-34	1888, März 8	6.7	+ 24.239	16	+ 16	+ 24.255	+ 24.270	61	12
	— 21	7.3	24.274	15	+ 14	24.288			
	Dec. 14	21.9	24.265	30	+ 5	24.270			
30-35	1888, März 1	6.7	+ 24.600	7	+ 9	+ 24.609	+ 24.561	73	15
	— 20	8.7	24.592	17	+ 10	24.602			
	April 16	7.4	24.522	26	+ 11	24.533			
	— 28	11.2	24.522	5	+ 15	24.537			
	Dec. 21	21.9	24.548	18	+ 3	24.551			
30-42	1888, März 16	7.1	- 58.901	7	- 18	- 58.919	- 58.985	35	7
	Novbr. 26	21.7	58.988	24	- 8	58.996			
	Dec. 21	21.9	59.033	4	- 5	59.038			
30-43	1888, März 16	7.1	- 51.258	9	- 13	- 51.271	- 51.242	34	7
	Novbr. 26	21.7	51.208	9	- 7	51.215			
	Dec. 21	21.9	51.236	16	- 4	51.240			
30-44	1888, März 8	6.2	- 37.972	13	- 9	- 37.981	- 37.947	60	12
	— 16	7.1	37.952	11	- 9	37.961			
	April 16	7.4	37.948	18	- 12	37.960			
	Novbr. 26	21.7	37.892	17	- 5	37.897			
	Dec. 21	21.9	37.940	1	- 2	37.942			
30-65	1888, April 16	7.4	+ 57.382	5	+ 13	+ 57.395	+ 57.367	49	10
	— 28	11.2	57.375	20	+ 17	57.392			
	1889, Febr. 13	4.8	57.340	24	+ 1	57.341			
30-83	1888, März 8	6.7	- 22.648	17	- 3	- 22.651	- 22.712	43	9
	— 20	8.7	22.823	4	- 2	22.825			
	— 21	7.4	22.686	11	- 1	22.687			
	1889, Febr. 13	4.8	22.788	11	- 3	22.791			
32-1	1888, Novbr. 26	22.0	- 3.623	32	- 4	- 3.627	- 3.669	56	11
	— 27	20.7	3.720	24	- 6	- 3.726			
32 ^a - 1	1888, Novbr. 26	22.0	- 5.814	33	- 4	- 5.818	- 5.878	57	11
	— 27	20.7	5.955	24	- 6	5.961			
32 ^c - 1	1888, Novbr. 26	22.0	- 2.402	31	- 3	- 2.405	- 2.427	55	11
	— 27	20.7	2.451	24	- 4	2.455			
33-34	1888, März 8	6.7	+ 15.217	15	+ 8	+ 15.225	+ 15.223	99	20
	— 21	7.4	15.263	11	+ 7	15.270			
	— 23	9.4	15.219	17	+ 9	15.228			
	April 16	8.9	15.233	9	+ 9	15.242			
	Dec. 14	21.9	15.235	29	+ 3	15.238			
	— 21	21.7	15.156	8	+ 3	15.159			
	1889, Febr. 13	4.8	15.143	10	+ 4	15.147			
33-35	1888, März 1	6.7	+ 15.683	6	+ 2	+ 15.685	+ 15.710	10	2
	— 20	8.7	16.010	1	+ 2	16.012			
	1889, Febr. 13	4.8	15.657	3	0	15.657			
33-83	1888, April 16	8.9	- 31.310	1	- 8	- 31.318	- 31.772	19	4
	Dec. 21	21.7	31.865	8	- 2	31.867			
	1889, Febr. 13	4.8	31.742	10	0	31.742			
34-36	1888, März 1	6.7	+ 3.350	2	- 1	+ 3.349	+ 3.357	148	30
	— 8	6.6	3.436	18	- 1	3.435			
	— 21	7.3	3.299	17	- 2	3.297			
	— 23	9.4	3.390	19	+ 2	3.392			
	April 16	8.9	3.305	4	0	3.305			

Beobachtete Differenz	Datum	Stunden- winkel	Δa app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correc- tionen.	Δa 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
34-36	1888, Novbr. 11	20.5	+ 3.295	21	+ 5	+ 3.300			
	— 26	21.0	3.321	25	+ 4	3.325			
	Dec. 14	21.9	3.332	30	+ 3	3.335			
	1889, Febr. 13	4.8	3.508	12	+ 3	3.511			
34-62	1888, Novbr. 11	20.5	+ 90.259	27	+ 18	+ 90.277	+ 90.296	54	11
	— 26	21.0	90.301	27	+ 13	90.314			
34-65	1888, Dec. 21	21.4	+ 33.447	3	+ 8	+ 33.455	+ 33.354	15	3
	1889, Febr. 13	4.8	33.324	12	+ 5	33.329			
34-81	1888, März 21	7.4	— 25.610	1	— 7	— 25.617			
	— 23	9.5	25.363	23	— 9	25.372			
	April 16	8.9	25.503	9	— 9	25.512			
	Novbr. 11	20.5	25.609	21	— 6	25.615	— 25.497	94	19
	— 26	21.0	25.489	25	— 3	25.492			
	Dec. 21	21.7	25.513	15	— 2	25.515			
34-82	1888, März 21	7.4	— 32.033	3	— 9	— 32.042			
	— 23	9.5	32.053	23	— 10	32.063			
	April 16	8.9	32.028	8	— 11	32.039			
	Novbr. 11	20.5	31.965	21	— 7	31.972	— 32.012	103	21
	— 26	21.0	32.045	27	— 4	32.049			
	Dec. 21	21.7	31.937	13	— 2	31.939			
	1889, Febr. 13	4.8	31.921	8	— 3	31.924			
34-83	1888, März 23	9.4	— 46.947	20	— 13	— 46.960			
	April 16	8.9	46.855	10	— 15	46.870	— 46.938	49	10
	Novbr. 26	21.0	46.946	19	— 5	46.951			
34-84	1888, März 23	9.5	— 22.734	16	— 4	— 22.738			
	April 16	8.9	22.772	11	— 6	22.778			
	Novbr. 11	20.5	22.864	14	— 4	22.868			
	— 26	21.0	22.748	16	— 3	22.751	— 22.750	75	15
	Dec. 21	21.7	22.656	12	— 2	22.658			
	1889, Febr. 13	4.8	22.638	6	0	22.638			
34-85	1888, März 21	7.4	— 59.892	10	— 11	— 59.903			
	1889, Febr. 13	4.8	59.858	12	0	59.858	— 59.878	22	4
34-91	1888, März 21	7.4	— 124.400	15	— 23	— 124.423			
	— 23	9.4	124.347	21	— 24	124.371			
	April 16	8.9	124.250	9	— 31	124.281	— 124.367	57	11
	1889, Febr. 13	4.8	124.353	12	0	124.353			
34-92	1888, März 23	9.4	— 78.755	2	— 16	— 78.771			
	1889, Febr. 13	4.8	78.600	12	— 1	78.601	— 78.625	14	3
34-94	1888, März 21	7.4	+ 12.025	2	+ 5	+ 12.030			
	— 23	9.4	11.610	9	+ 6	11.616			
	April 16	8.9	12.160	4	+ 6	12.166			
	Novbr. 11	20.5	12.067	10	+ 3	12.070	+ 12.027	55	11
	— 26	21.0	11.992	9	+ 2	11.994			
	Dec. 14	21.9	12.168	21	+ 2	12.170			
34-105	1888, März 23	9.7	— 41.583	16	— 10	— 41.593			
	Dec. 21	21.6	41.654	22	— 5	41.659	— 41.631	38	8
35-36	1888, März 1	6.7	+ 2.982	6	0	+ 2.982			
	— 8	6.2	3.100	17	0	3.100			
	— 20	8.7	3.107	10	0	3.107			
	April 16	7.4	3.143	18	— 1	3.142	+ 3.076	76	15
	— 28	11.2	3.080	3	0	3.080			
	Dec. 21	21.9	3.101	10	+ 1	3.102			
	1889, Febr. 13	4.8	2.940	12	+ 1	2.941			
35-62	1888, März 1	6.7	+ 89.968	10	+ 12	+ 89.980	+ 89.980	10	2

Beobachtete Differenz	Datum	Stundenwinkel	Δa app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correctionen	Δa 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
35—65	1888, März 8	6.2	+ 32.976	14	+ 5	+ 32.981	+ 32.908	51	10
	April 16	7.4	32.936	25	+ 4	32.940			
	1889, Febr. 13	4.8	32.755	12	+ 3	32.758			
35—83	1888, Dec. 21	21.9	— 47.184	11	— 3	— 47.187	— 47.239	20	4
	1889, Febr. 13	4.8	47.302	9	— 1	47.303			
37—I	1888, März 1	6.2	+ 18.022	13	+ 4	+ 18.026	+ 18.011	99	20
	— 20	7.7	17.898	6	+ 5	17.903			
	— 23	8.0	17.888	17	+ 4	17.892			
	April 16	10.0	18.100	1	+ 7	18.107			
	— 29	11.3	18.016	7	+ 7	18.023			
	Novbr. 14	21.4	18.040	2	+ 3	18.043			
	— 27	21.9	18.079	42	+ 2	18.081			
	1889, Jan. 29	3.9	17.953	10	+ 1	17.954			
	Febr. 13	4.0	17.870	1	+ 1	17.871			
37—38	1888, März 16	6.7	— 4.632	13	0	— 4.632	— 4.601	66	13
	Novbr. 27	22.1	4.586	42	0	4.586			
	1889, Jan. 29	3.9	4.620	10	0	4.620			
	Febr. 13	4.0	4.620	1	0	4.620			
38—I	1888, Febr. 24	3.0	+ 22.674	15	+ 4	+ 22.678	+ 22.648	146	29
	März 1	6.2	22.686	18	+ 4	22.690			
	— 8	7.2	22.572	18	+ 5	22.577			
	— 16	6.4	22.641	18	+ 5	22.646			
	— 20	7.8	22.590	11	+ 5	22.595			
	— 23	8.2	22.633	20	+ 5	22.638			
	April 16	10.0	22.667	13	+ 7	22.674			
	— 28	9.6	22.595	2	+ 7	22.602			
	— 29	11.2	22.656	28	+ 8	22.664			
	Novbr. 14	21.4	22.770	1	+ 3	22.773			
	1889, Febr. 13	3.7	22.650	2	0	22.650			
38—38 ^a	1888, April 29	11.5	— 1.520	1	— 4	— 1.524	— 1.438	42	8
	Novbr. 14	21.4	1.456	11	— 1	1.457			
	— 27	21.9	1.446	14	— 1	1.447			
	1889, Jan. 29	3.9	1.334	9	— 3	1.337			
	Febr. 13	3.7	1.504	7	— 3	1.507			
38—38 ^b	1888, März 23	8.3	— 1.497	3	— 5	— 1.502	— 1.610	45	9
	Novbr. 14	21.4	1.582	13	— 2	1.584			
	— 27	22.3	1.631	16	— 1	1.632			
	1889, Jan. 29	3.9	1.619	7	— 4	1.623			
	Febr. 13	3.7	1.642	6	— 5	1.647			
38—39	1888, März 16	6.7	+ 1.284	18	+ 5	+ 1.289	+ 1.219	78	16
	— 23	7.7	1.080	2	+ 3	1.083			
	Novbr. 14	21.4	1.205	2	+ 2	1.207			
	— 27	22.1	1.184	41	+ 1	1.185			
38—40	1889, Jan. 29	3.9	1.242	15	+ 4	1.246	— 1.410	32	6
	1888, März 8	7.2	— 0.920	1	+ 1	— 0.919			
38—41	— 16	6.7	1.429	15	0	1.429	+ 39.172	28	6
	— 23	7.7	1.430	2	+ 2	1.428			
	Novbr. 27	21.5	1.420	14	— 2	1.422			
	1888, April 29	11.5	+ 39.278	10	+ 12	+ 39.290			
38—42	1889, Jan. 29	3.9	39.111	15	+ 1	39.112	— 20.368	36	7
	Febr. 13	4.0	39.077	3	+ 1	39.078			
	1888, März 1	6.0	— 20.100	1	— 3	— 20.103			
38—42	— 16	6.7	20.384	11	— 3	20.387	— 20.368	36	7
	— 23	7.7	20.165	2	— 2	20.167			
	1889, Jan. 29	3.9	20.467	13	— 2	20.469			
	Febr. 13	4.3	20.274	9	0	20.274			

Beobachtete Differenz	Datum	Stunden- winkel	Δa app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correc- tionen	Δa 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
38-43	1888, März 1	6.0	- 12.720	1	- 2	- 12.722	- 12.782	22	4
	— 16	6.7	12.800	5	- 1	12.801			
	1889, Jan. 29	3.9	12.861	8	- 3	12.864			
	Febr. 13	4.3	12.694	8	- 3	12.697			
38-75	1888, März 16	6.7	- 47.832	18	- 7	- 47.839	- 47.918	40	8
	— 23	7.7	47.690	4	- 5	47.695			
	1889, Jan. 29	3.9	48.079	15	- 2	48.081			
	Febr. 13	4.0	47.870	3	- 2	47.872			
38 ^a - I	1888, März 23	7.7	+ 24.140	7	+ 7	+ 24.147	+ 24.101	74	15
	April 29	11.0	24.196	16	+ 12	24.208			
	Novbr. 14	21.1	24.030	19	+ 5	24.035			
	— 27	21.9	24.096	14	+ 3	24.099			
	1889, Jan. 29	3.9	24.044	11	+ 3	24.047			
	Febr. 13	3.7	24.073	7	+ 3	24.076			
38 ^b - I	1888, April 29	11.5	+ 24.585	15	+ 13	+ 24.598	+ 24.352	60	12
	Novbr. 14	21.4	24.231	18	+ 6	24.237			
	— 27	22.3	24.326	16	+ 4	24.330			
	1889, Jan. 29	3.9	24.228	5	+ 5	24.233			
	Febr. 13	3.7	24.237	6	+ 5	24.242			
39-I	1888, Febr. 24	2.7	+ 21.383	7	+ 3	+ 21.386	+ 21.500	133	27
	März 1	6.2	21.474	13	+ 3	21.477			
	— 8	7.2	21.543	11	+ 3	21.546			
	— 16	6.1	21.578	13	+ 4	21.582			
	— 20	7.8	21.551	7	+ 2	21.553			
	— 23	7.7	21.578	10	+ 2	21.580			
	April 16	10.0	21.618	5	+ 7	21.625			
	— 28	11.2	21.460	1	+ 7	21.467			
	— 29	11.1	21.516	6	+ 8	21.524			
	Novbr. 14	21.4	21.600	2	+ 5	21.605			
	— 27	22.0	21.492	43	+ 3	21.495			
	1889, Jan. 29	3.9	21.339	15	+ 1	21.340			
39-40	1888, Novbr. 26	21.7	- 2.823	19	0	- 2.823	- 2.823	19	4
40-I	1888, Febr. 24	2.7	+ 24.047	3	+ 3	+ 24.050	+ 24.058	75	15
	März 1	6.2	24.034	17	+ 4	24.038			
	— 8	7.2	24.117	9	+ 3	24.120			
	— 16	6.1	23.904	10	+ 4	23.908			
	— 20	7.8	24.052	9	+ 2	24.054			
	— 23	7.7	24.180	1	+ 3	24.183			
	April 16	10.0	24.198	10	+ 7	24.205			
	— 29	11.0	23.965	2	+ 7	23.972			
	Novbr. 27	21.5	24.051	14	+ 3	24.054			
40-44	1888, Novbr. 26	21.7	+ 2.395	20	+ 3	+ 2.398	+ 2.398	20	4
41-I	1888, Febr. 24	3.1	- 16.541	18	- 2	- 16.543	- 16.499	197	39
	März 1	6.0	16.450	8	- 2	16.452			
	— 8	7.2	16.496	19	- 3	16.499			
	— 16	5.9	16.454	5	- 3	16.457			
	— 20	7.7	16.536	13	- 3	16.539			
	— 23	8.5	16.579	31	- 3	16.582			
	April 16	10.0	16.448	6	- 4	16.452			
	— 28	9.6	16.600	1	- 5	16.605			
	— 29	11.0	16.438	16	- 5	16.443			
	Novbr. 10	19.1	16.535	16	- 2	16.537			
	— 27	21.0	16.458	42	- 2	16.460			
	Dec. 21	20.9	16.443	22	- 1	16.444			

Beobachtete Differenz	Datum	Stunden- winkel	Δa app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correc- tionen	Δa 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
41—45	1888, April 29	11.5	+ 17.784	10	+ 4	+ 17.788	+ 17.825	34	7
	Novbr. 10	19.6	17.859	9	+ 5	17.864			
	1889, Jan. 29	3.9	17.821	11	+ 1	17.822			
	Febr. 13	3.7	17.840	4	+ 1	17.841			
41—46	1888, April 29	11.5	+ 20.809	10	+ 3	+ 20.812	+ 20.925	26	5
	Novbr. 10	19.6	20.972	9	+ 6	20.978			
	1889, Jan. 29	3.9	20.785	2	+ 2	20.787			
	Febr. 13	4.0	21.109	5	+ 1	21.110			
41—47	1888, April 29	11.5	+ 22.670	10	+ 6	+ 22.676	+ 22.751	27	5
	Novbr. 10	19.6	22.774	9	+ 8	22.782			
	1889, Jan. 29	3.9	22.715	2	+ 3	22.718			
	Febr. 13	3.9	22.842	6	+ 2	22.844			
41—48	1888, Novbr. 27	21.9	+ 32.414	7	+ 5	+ 32.419	+ 32.419	21	4
	1889, Jan. 29	3.9	32.294	9	+ 3	32.297			
	Febr. 13	3.7	32.638	5	+ 2	32.640			
41—49	1888, Novbr. 27	21.9	+ 29.783	7	+ 5	+ 29.788	+ 29.821	18	4
	1889, Jan. 29	3.9	29.849	7	+ 1	29.850			
	Febr. 13	3.7	29.828	4	+ 1	29.829			
41—49 ^a	1889, Jan. 29	3.9	+ 27.741	8	+ 1	+ 27.742	+ 27.790	13	3
	Febr. 13	3.8	27.868	5	0	27.868			
41—50	1888, Novbr. 27	21.9	+ 35.551	7	+ 5	+ 35.556	+ 35.502	26	5
	1889, Jan. 29	3.9	35.383	10	+ 2	35.385			
	Febr. 13	4.0	35.587	9	+ 1	35.588			
41—52	1889, Febr. 13	3.7	+ 19.948	4	+ 4	+ 19.952	+ 19.870	20	4
	März 11	3.9	19.848	16	+ 2	19.850			
41—75	1888, März 23	7.7	— 86.950	2	— 14	— 86.964	— 87.130	27	5
	1889, Jan. 29	3.9	87.140	25	— 3	87.143			
42—1	1888, März 1	6.4	+ 43.012	9	+ 5	+ 43.017	+ 42.961	58	12
	— 16	6.6	42.901	15	+ 6	42.907			
	— 20	7.6	43.245	2	+ 5	43.250			
	April 28	11.2	43.103	3	+ 13	43.116			
	1889, Jan. 29	3.9	42.983	16	+ 2	42.985			
	Febr. 13	4.3	42.872	13	+ 1	42.873			
42—43	1888, März 8	6.2	+ 7.643	10	+ 6	+ 7.649	+ 7.657	24	5
	Dec. 21	21.9	7.661	14	+ 1	7.662			
42—44	1888, April 16	7.4	+ 20.933	14	+ 11	+ 20.944	+ 20.884	26	5
	Dec. 21	21.9	20.812	12	+ 3	20.815			
43—1	1888, März 1	6.4	+ 35.431	9	+ 4	+ 35.435	+ 35.403	97	19
	— 16	6.5	35.342	36	+ 4	35.346			
	— 23	7.7	35.450	1	+ 3	35.453			
	April 28	11.2	35.445	16	+ 11	35.456			
	Mai 23	11.5	35.478	17	+ 11	35.489			
	1889, Jan. 29	3.9	35.446	10	+ 3	35.449			
	Febr. 13	4.3	35.271	8	+ 2	35.273			
43—44	1888, März 8	6.2	+ 13.312	16	+ 5	+ 13.317	+ 13.345	36	7
	April 16	7.4	13.361	18	+ 6	13.367			
	Dec. 21	21.9	13.370	2	+ 2	13.372			
43—75	1888, März 8	6.2	— 35.023	12	— 8	— 35.031	— 35.050	15	3
	— 16	7.1	35.117	3	— 7	35.124			
44—1	1888, März 16	6.6	+ 22.046	24	0	+ 22.046	+ 22.129	53	11
	April 28	11.2	22.104	14	+ 7	22.201			
	Mai 23	11.5	22.188	15	+ 6	22.194			

Beobachtete Differenz	Datum	Stunden- winkel	Δa app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correc- tionen	Δa 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
44—83	1888, März 8 Dec. 21	^h 6.7 21.9	^s + 15.414 15.335	16 12	+ 14 + 5	+ 15.428 15.340	+ 15.389	28	6
45—I	1888, Febr. 24 März 1 — 23 April 16 — 29 Novbr. 10 Dec. 21 1889, Jan. 29	3.1 6.0 8.3 10.0 11.2 19.3 20.9 3.9	— 34.256 34.326 34.299 34.269 34.268 34.231 34.177 34.261	19 8 18 13 34 26 9 11	— 3 — 5 — 5 — 10 — 9 — 7 — 2 — 2	— 34.259 34.331 34.304 34.279 34.277 34.238 34.179 34.203	— 34.267	138	28
45—46	1888, März 20 1889, Febr. 13	7.6 3.9	+ 3.060 3.137	3 19	0 + 1	+ 3.060 3.138	+ 3.127	22	4
45—47	1888, März 20 1889, Febr. 13	7.6 3.9	+ 5.063 4.956	3 19	— 1 + 1	+ 5.062 4.957	+ 4.971	22	4
45—48	1888, März 20 1889, Jan. 29 Febr. 13	7.6 4.6 4.0	+ 15.110 14.690 14.644	1 14 7	0 + 1 + 1	+ 15.110 14.691 14.645	+ 14.696	22	4
45—49	1888, April 29 1889, Febr. 13	11.0 4.0	+ 11.900 11.989	2 9	+ 3 0	+ 11.903 11.989	+ 11.973	11	2
45—49 ^a	1889, Febr. 13	4.0	+ 9.890	14	+ 1	+ 9.891	+ 9.891	14	3
45—50	1888, April 29 1889, Febr. 13	11.0 4.0	+ 17.644 17.703	5 24	+ 5 0	+ 17.649 17.703	+ 17.694	29	5
45—52	1888, März 8 1889 Jan. 29 Febr. 13 März 11	7.5 4.6 3.7 3.9	+ 2.024 1.973 2.188 2.061	17 16 10 32	— 5 + 4 + 3 + 1	+ 2.019 1.977 2.191 2.062	+ 2.054	75	15
45—54	1889, Jan. 29 März 11	4.6 3.9	+ 13.172 13.228	6 6	+ 4 + 2	+ 13.176 13.230	+ 13.203	12	2
45—57	1889, Jan. 29 März 11	4.6 3.9	— 17.949 17.842	13 11	— 15 — 18	— 17.964 17.860	— 17.916	24	5
46—I	1888, Febr. 24 März 1 — 23 April 16 — 29 Novbr. 10 1889, Febr. 13	2.7 6.0 8.3 10.0 11.5 19.4 4.0	— 37.446 37.365 37.519 37.422 37.337 37.330 37.500	5 6 7 13 14 28 19	— 5 — 6 — 4 — 11 — 10 — 9 — 1	— 37.451 37.371 37.523 37.433 37.347 37.339 37.501	— 37.409	92	18
47—I	1888, Febr. 24 März 1 — 23 April 16 — 29 Novbr. 10 1889, Febr. 13	2.7 6.0 8.3 10.0 11.4 19.4 4.0	— 39.296 39.130 39.223 39.247 39.178 39.155 39.313	5 8 15 7 18 28 19	— 5 — 6 — 5 — 11 — 11 — 10 — 2	— 39.301 39.136 39.228 39.258 39.189 39.165 39.315	— 39.218	100	20
48—I	1888, Febr. 24 März 1 — 23 April 16 — 29 Novbr. 10 — 27	2.7 6.0 8.3 10.0 11.0 19.3 21.9	— 48.930 48.903 48.942 48.817 48.917 48.880 48.837	5 8 17 6 19 1 21	— 6 — 7 — 6 — 14 — 15 — 12 — 7	— 48.936 48.910 48.948 48.831 48.932 48.892 48.844	— 48.906	94	19

Beobachtete Differenz	Datum	Stundenwinkel	Δa app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correctionen	Δa 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
48—1	1889, Jan. 29	^h 3.9	^s — 48.901	12	— 3	^s — 48.904			
	Febr. 13	4.0	48.988	5	— 1	48.989			
48—50	1888, März 8	7.5	+ 2.805	4	+ 2	+ 2.807	+ 3.010	39	8
	1889, Jan. 29	4.6	3.070	15	+ 2	3.072			
	Febr. 13	3.8	3.003	20	+ 2	3.005			
48—52	1888, März 8	7.5	— 12.677	20	— 8	— 12.685	— 12.709	56	11
	1889, Jan. 29	4.6	12.739	16	— 6	12.745			
	— Febr. 13	3.7	12.712	12	— 6	12.718			
	— März 11	3.9	12.678	8	— 8	12.686			
48—54	1888, März 8	7.5	— 1.740	17	— 6	— 1.746	— 1.744	37	7
	1889, Jan. 29	4.6	1.698	5	— 6	1.704			
	Febr. 13	3.7	1.835	3	— 6	1.841			
	März 11	3.9	1.728	12	— 7	1.735			
49—I	1888, März 1	6.0	— 46.395	8	— 6	— 46.401	— 46.373	69	14
	— 23	8.3	46.349	15	— 7	46.356			
	April 16	10.0	46.318	4	— 13	46.331			
	Novbr. 10	19.3	46.390	1	— 9	46.399			
	— 27	21.9	46.309	18	— 6	46.315			
	1889, Jan. 29	3.9	46.559	9	— 1	46.560			
	Febr. 13	3.8	46.342	14	0	46.342			
49—49 ^a	1888, Novbr. 27	21.9	— 2.056	9	— 1	— 2.057	— 2.076	13	3
	1889, Jan. 29	4.6	2.118	4	— 1	2.119			
49 ^a — I	1888, Novbr. 27	21.9	— 44.145	9	— 5	— 44.150	— 44.285	33	7
	1889, Jan. 29	3.9	44.361	7	— 1	44.362			
	Febr. 13	3.9	44.324	17	0	44.324			
50—I	1888, März 1	6.0	— 51.874	7	— 8	— 51.882	— 51.990	94	19
	— 23	8.3	51.950	18	— 8	51.958			
	April 16	10.0	51.835	11	— 14	51.849			
	— 29	11.0	51.870	2	— 16	51.886			
	Novbr. 27	21.9	51.982	21	— 7	51.989			
	1889, Jan. 29	3.9	52.057	10	— 2	52.059			
	Febr. 13	3.8	52.086	25	— 1	52.087			
51—52	1888, März 1	7.2	+ 0.326	5	0	+ 0.326	+ 0.391	26	5
	1889, Febr. 13	3.3	0.350	2	0	0.350			
	März 11	3.9	0.413	19	0	0.413			
51—53	1888, April 29	10.2	— 4.107	35	— 2	— 4.109	— 4.121	55	11
	1889, Febr. 13	3.3	4.165	2	— 3	4.168			
	März 11	3.9	4.136	18	— 3	4.139			
52—I	1888, April 29	10.7	— 36.210	24	— 14	— 36.224	— 36.301	60	12
	1889, Febr. 13	3.7	36.468	12	— 4	36.472			
	März 11	3.9	36.289	24	— 3	36.292			
52—53	1888, März 1	7.2	— 4.415	11	— 1	— 4.416	— 4.587	122	24
	— 8	7.5	4.684	14	— 1	4.685			
	— 21	8.3	4.603	21	— 1	4.604			
	April 16	9.7	4.445	14	— 1	4.446			
	— 29	10.9	4.627	33	— 2	4.629			
	1889, Jan. 29	4.6	4.658	17	0	4.658			
	Febr. 13	3.3	4.430	2	0	4.430			
	März 11	3.9	4.567	10	0	4.567			
52—54	1888, März 1	7.1	+ 11.044	5	+ 2	+ 11.046			
	— 21	8.5	10.851	28	+ 2	10.853			

Beobachtete Differenz	Datum	Stunden- winkel	Δa app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correc- tionen	Δa 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
52-54	April 16	^h 9.7	^s + 10.953	11	+ 3	^s + 10.956	+ 10.943	105	21
	— 29	10.9	11.085	12	+ 3	11.088			
	Novbr. 11	21.5	10.935	23	+ 2	10.937			
	— 26	20.5	10.872	5	+ 1	10.873			
	1889, Febr. 13	3.3	11.003	11	0	11.003			
	März 11	3.9	10.938	10	0	10.938			
52-55	1888, März 1	7.1	— 5.624	9	— 4	— 5.628	— 5.815	98	20
	April 16	9.7	5.640	11	— 9	5.649			
	— 29	11.0	5.917	3	— 8	5.925			
	Novbr. 11	21.5	5.901	46	— 3	5.904			
	— 26	20.5	5.783	18	— 3	5.786			
	1889, Febr. 13	3.3	5.778	11	— 4	5.782			
52-55 ^a	1888, Novbr. 11	21.5	— 5.726	35	— 5	— 5.731	— 5.665	59	12
	— 26	20.5	5.606	17	— 2	5.608			
	1889, Febr. 13	3.3	5.472	7	— 3	5.475			
52-56	1888, März 1	7.1	+ 8.620	2	0	+ 8.620	+ 8.743	105	21
	— 21	8.7	8.757	29	0	8.757			
	April 16	9.7	8.835	13	+ 3	8.838			
	— 29	11.0	8.860	1	+ 4	8.864			
	Novbr. 11	21.5	8.719	46	+ 4	8.723			
	— 26	20.5	8.695	14	+ 4	8.699			
52-57	1888, März 1	7.2	— 19.666	8	— 8	— 19.674	— 19.757	58	12
	— 21	8.2	19.831	23	— 9	19.840			
	April 16	9.7	19.591	15	— 15	19.606			
	— 29	10.7	19.828	12	— 16	19.844			
52-58	1888, März 21	8.9	— 17.497	11	— 10	— 17.507	— 17.488	21	4
	1889, März 11	3.9	17.363	6	— 8	17.371			
	— 18	9.4	17.603	4	— 9	17.612			
52-59	1888, März 1	7.2	— 20.670	1	— 4	— 20.674	— 20.684	29	6
	— 8	7.5	20.669	13	— 5	20.674			
	1889, Jan. 29	4.6	20.776	7	— 2	20.778			
	März 11	3.9	20.577	6	— 2	20.579			
	— 18	9.4	20.730	2	— 3	20.733			
52-60	1888, März 1	7.2	— 25.480	1	— 3	— 25.483	— 25.412	37	7
	— 8	7.5	25.372	17	— 4	25.376			
	1889, Jan. 29	4.6	25.490	8	0	25.490			
	März 11	3.9	25.412	9	— 1	25.413			
	— 18	9.4	25.365	2	— 1	25.366			
52-61	1888, März 1	7.1	+ 17.360	1	+ 1	+ 17.361	+ 17.350	66	13
	— 21	8.9	17.437	7	+ 3	17.440			
	April 16	9.7	17.330	6	+ 6	17.336			
	Novbr. 11	21.5	17.351	41	+ 5	17.356			
	— 26	20.5	17.272	11	+ 4	17.276			
52-70	1888, März 1	7.1	+ 48.243	13	+ 8	+ 48.251	+ 48.266	57	11
	— 21	8.0	48.342	12	+ 10	48.352			
	April 29	10.7	48.233	15	+ 16	48.249			
	Novbr. 26	20.5	48.227	17	+ 6	48.233			
52-71	1888, März 21	8.9	— 19.223	13	— 21	— 19.244	— 19.205	31	6
	1889, Febr. 13	3.3	19.162	18	— 14	19.176			
52-72	1888, März 21	8.9	— 69.745	2	— 27	— 69.772	— 69.613	32	6
	April 16	9.7	69.430	4	— 37	69.467			
	— 29	10.7	69.630	11	— 40	69.670			
	1889, Jan. 29	4.6	69.576	15	— 12	69.588			
52-74	1888, April 16	9.7	— 86.103	3	— 57	— 86.160	— 86.199	28	6
	— 29	10.7	86.127	10	— 61	86.188			
	1889, Jan. 29	4.6	86.195	15	— 20	86.215			

Beobachtete Differenz	Datum	Stunden- winkel	$\Delta \alpha$ app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correc- tionen	$\Delta \alpha$ 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
52—80	1888, März 21	8.9	— 48.450	4	— 18	— 48.468	— 48.547	29	6
	April 16	9.7	48.347	3	— 26	48.373			
	— 29	10.7	48.498	10	— 28	48.526			
	1889, Jan. 29	4.6	48.626	12	— 8	48.634			
52—96	1888, Novbr. 11	21.5	+ 0.525	42	+ 4	+ 0.529	+ 0.514	58	12
	— 26	20.5	0.472	16	+ 4	0.476			
52—97	1888, Novbr. 11	21.6	— 4.362	48	— 5	— 4.367	— 4.373	64	13
	— 26	20.5	4.383	16	— 9	4.392			
52—98	1888, Novbr. 11	21.5	+ 12.978	45	+ 5	+ 12.983	+ 12.971	61	12
	— 26	20.5	12.931	16	+ 5	12.936			
53—54	1888, April 29	10.2	+ 15.422	25	+ 5	+ 15.427	+ 15.463	53	11
	1889, Febr. 13	3.3	15.474	11	0	15.474			
	März 11	3.9	15.502	15	+ 1	15.503			
	— 18	9.4	15.560	2	+ 1	15.561			
53—55	1888, April 29	10.2	— 1.205	19	— 7	— 1.212	— 1.243	35	7
	1889, Jan. 29	4.6	1.230	5	— 3	1.233			
	Febr. 13	3.3	1.299	11	— 3	1.302			
53—55 ^a	1888, April 29	10.2	— 1.023	18	— 6	— 1.029	— 1.011	25	5
	1889, Febr. 13	3.3	0.961	7	— 3	0.964			
53—56	1888, April 29	10.2	+ 13.236	24	+ 6	+ 13.242	+ 13.210	27	5
	1889, März 18	9.4	12.953	3	+ 2	12.955			
53—57	1889, Jan. 29	4.6	— 15.261	17	— 6	— 15.267	— 15.320	50	10
	März 11	3.9	15.230	16	— 6	15.236			
	— 18	9.4	15.444	17	— 8	15.452			
53—61	1888, April 29	10.2	+ 21.797	3	+ 7	+ 21.804	+ 21.804	3	1
53—96	1888, April 29	10.2	+ 5.119	18	+ 3	+ 5.122	+ 5.122	18	4
54—56	1888, Novbr. 11	21.5	— 2.200	8	— 2	— 2.202	— 2.202	8	2
54—61	1888, März 21	8.0	+ 6.473	13	— 1	+ 6.472	+ 6.441	41	8
	April 29	10.2	6.423	28	+ 3	6.426			
54—96	1888, April 29	10.2	— 10.393	3	— 9	— 10.402	— 10.402	3	1
54—98	1888, April 29	10.2	+ 2.133	31	+ 3	+ 2.136	+ 2.136	31	6
54—98 ^a	1888, April 29	10.2	+ 4.538	24	+ 4	+ 4.542	+ 4.542	24	5
55—56	1888, Novbr. 11	21.6	+ 14.496	5	+ 3	+ 14.499	+ 14.499	5	1
55 ^a —56	1888, Novbr. 11	21.6	+ 14.198	4	+ 3	+ 14.201	+ 14.201	4	1
56—61	1888, Novbr. 11	21.6	+ 8.620	10	+ 1	+ 8.621	+ 8.607	11	2
	1889, März 18	9.4	8.470	1	+ 2	8.472			
56—96	1888, Novbr. 11	21.6	— 8.026	7	— 2	— 8.028	— 8.028	7	1
56—97	1888, Novbr. 11	21.6	— 12.879	8	— 3	— 12.882	— 12.882	8	2
56—98	1888, Novbr. 11	21.6	+ 4.306	10	+ 2	+ 4.308	+ 4.308	10	2

Beobachtete Differenz	Datum	Stundenwinkel	Δa app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correctionen	Δa 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
57—58	1888, März 1	7.2	+ 2.128	6	0	+ 2.128	+ 2.255	54	11
	— 21	8.3	2.247	21	0	2.247			
	April 16	9.7	2.133	10	0	2.133			
	— 29	10.7	2.333	7	+ 1	2.334			
	1889, März 11	3.9	2.307	6	+ 4	2.311			
	— 18	9.4	2.565	4	0	2.565			
57—59	1888, März 1	7.2	— 0.940	5	+ 1	— 0.939	— 0.986	46	9
	— 21	8.0	1.023	17	+ 3	1.020			
	April 16	9.7	1.107	9	— 2	1.109			
	1889, Jan. 29	4.6	0.934	7	— 2	0.936			
	März 11	3.9	0.890	6	0	0.890			
	— 18	9.4	0.725	2	— 2	0.727			
57—60	1888, März 1	7.2	— 5.716	7	+ 1	— 5.715	— 5.711	42	8
	— 21	8.0	5.807	13	+ 3	5.804			
	April 16	9.7	5.743	4	— 3	5.746			
	1889, Jan. 29	4.6	5.584	7	— 2	5.586			
	März 11	3.9	5.734	9	— 1	5.735			
	— 18	9.4	5.360	2	— 2	5.362			
57—72	1888, März 21	8.0	— 49.966	16	— 13	— 49.979	— 49.911	39	8
	April 16	9.7	49.953	13	— 23	49.976			
	1889, Jan. 29	4.6	49.712	10	— 6	49.718			
57—74	1888, April 16	9.7	— 66.448	10	— 41	— 66.489	— 66.423	20	4
	1889, Jan. 29	4.6	66.343	10	— 14	66.357			
57—80	1888, März 21	8.0	— 28.802	12	— 7	— 28.809	— 28.841	41	8
	April 16	9.7	28.842	15	— 11	28.853			
	1889, Jan. 29	4.6	28.853	14	— 2	28.855			
58—71	1888, März 21	8.9	— 1.769	14	— 10	— 1.779	— 1.674	24	5
	1889, Febr. 13	3.3	1.518	10	— 8	1.526			
62—1	1888, April 28	11.2	— 130.396	14	— 61	— 130.457	— 130.426	68	14
	Dec. 21	20.9	130.431	27	— 14	130.445			
	1889, Jan. 29	3.9	130.376	27	— 15	130.391			
62—63	1888, März 1	6.7	+ 5.014	9	+ 6	+ 5.020	+ 5.094	61	12
	— 20	8.5	5.068	24	+ 6	5.074			
	April 16	7.4	5.129	28	+ 6	5.135			
62—64	1888, März 8	6.1	— 8.041	13	— 12	— 8.053	— 8.159	65	13
	April 16	7.4	8.071	16	— 10	8.081			
	Novbr. 11	20.9	8.195	24	— 6	8.201			
	— 26	21.0	8.288	12	— 5	8.293			
62—65	1888, März 1	6.7	— 57.130	2	— 15	— 57.145	— 57.193	67	13
	April 16	7.4	57.129	29	— 22	57.151			
	— 28	11.2	57.192	12	— 27	57.219			
	Novbr. 11	20.9	57.223	24	— 12	57.235			
62—66	1888, März 1	6.7	— 42.640	4	— 12	— 42.652	— 42.643	41	8
	— 8	6.1	42.640	14	— 15	42.655			
	Novbr. 11	20.9	42.626	23	— 9	42.635			
62—67	1888, März 1	6.7	— 46.844	5	— 14	— 46.858	— 46.838	11	2
	1889, Jan. 29	3.9	46.815	6	— 7	46.822			
62—68	1888, April 16	7.4	— 5.330	4	— 14	— 5.344	— 5.344	4	1
62—69	1888, März 8	6.1	+ 7.491	7	0	+ 7.491	+ 7.520	45	9
	April 16	7.4	7.535	2	— 2	7.533			
	Novbr. 11	20.9	7.512	23	+ 7	7.519			
	— 26	21.0	7.530	13	+ 5	7.535			

Beobachtete Differenz	Datum	Stunden- winkel	Δa app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correc- tionen	Δa 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
62—99	1888, Novbr. 26	21.0	— 52.593	3	— 7	— 52.600	— 52.594	4	1
	1889, Jan. 29	3.9	52.570	1	— 5	52.575			
62—100	1888, März 1	6.7	— 44.788	6	— 6	— 44.794	— 44.699	65	13
	Novbr. 11	20.7	44.686	35	— 6	44.692			
	— 26	21.0	44.681	24	— 4	44.685			
62—101	1888, März 1	6.7	— 46.987	3	— 6	— 46.993	— 46.890	55	11
	Novbr. 11	20.5	46.860	27	— 9	46.869			
	— 26	21.0	46.896	25	— 5	46.901			
62—102	1888, Novbr. 11	20.5	— 34.417	26	— 7	— 34.424	— 34.441	52	10
	— 26	21.0	34.452	26	— 5	34.457			
62—103	1888, Novbr. 11	20.5	— 40.809	24	— 9	— 40.818	— 40.841	47	9
	— 26	21.0	40.857	23	— 7	40.864			
62—104	1888, März 1	6.7	+ 18.561	9	+ 7	+ 18.568	+ 18.685	48	10
	— 8	6.1	18.632	5	+ 8	18.640			
	— 20	8.5	18.664	5	+ 7	18.671			
	April 16	7.4	18.732	29	+ 8	18.731			
63—1	1888, Dec. 21	20.9	— 135.593	27	— 16	— 135.609	— 135.617	53	11
	1889, Jan. 29	3.9	135.606	26	— 20	135.626			
64—1	1888, April 28	11.2	— 122.206	14	— 47	— 122.253	— 122.379	64	13
	Novbr. 10	21.4	122.397	27	— 21	122.418			
	Dec. 21	20.9	122.470	2	— 8	122.478			
	1889, Jan. 29	3.9	122.396	21	— 8	122.404			
64—65	1888, April 28	11.2	+ 49.057	12	+ 15	+ 49.072	+ 49.056	43	9
	Dec. 14	21.7	49.056	19	+ 2	49.058			
	— 21	21.3	49.034	12	+ 3	49.037			
64—68	1888, Dec. 14	21.7	+ 2.649	14	+ 2	+ 2.651	+ 2.649	25	5
	— 21	21.3	2.643	11	+ 3	2.646			
64—106	1888, März 8	7.2	— 20.058	5	— 4	— 20.062	— 20.072	80	16
	April 16	9.7	20.030	5	— 6	20.036			
	Novbr. 11	20.9	20.097	9	— 3	20.100			
	Dec. 14	21.7	20.118	32	— 1	20.119			
	— 21	21.3	20.055	20	— 1	20.056			
	1889, Jan. 29	3.9	19.936	9	0	19.936			
64—107	1888, Novbr. 11	20.9	— 25.085	2	— 5	— 25.090	— 25.110	70	14
	Dec. 14	21.7	25.096	31	— 2	25.098			
	— 21	21.3	25.106	21	— 2	25.108			
	1889, Jan. 29	3.9	25.137	16	— 2	25.139			
65—1	1888, März 1	6.0	— 73.530	1	— 20	— 73.550	— 73.388	90	18
	April 28	11.2	73.393	4	— 14	73.407			
	Novbr. 10	21.4	73.381	31	— 14	73.395			
	Dec. 21	20.9	73.297	26	— 8	73.305			
	1889, Jan. 29	3.9	73.442	28	— 8	73.450			
65—66	1888, März 1	6.0	+ 14.430	1	+ 3	+ 14.433	+ 14.521	126	25
	— 8	6.1	14.471	15	+ 4	14.475			
	— 20	8.2	14.559	16	+ 3	14.562			
	April 16	7.4	14.476	28	+ 4	14.480			
	— 28	11.2	14.556	23	+ 6	14.562			
	Dec. 14	21.7	14.517	22	+ 1	14.518			
	— 21	21.3	14.537	21	+ 1	14.538			
65—67	1888, März 1	6.0	+ 10.420	1	+ 2	+ 10.422	+ 10.345	59	12
	April 16	7.4	10.360	2	+ 2	10.362			
	Novbr. 10	21.4	10.376	29	+ 2	10.378			

Beobachtete Differenz	Datum	Stundenwinkel	Δa app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correctionen	Δa 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
65—67	1888, Novbr. 11	20.9	+ 10.323	3	+ 2	+ 10.325			
	Dec. 14	21.7	10.337	3	+ 1	10.338			
	1889, Jan. 29	3.9	10.298	21	0	10.298			
65—67 ^a	1888, März 1	6.0	+ 6.840	1	+ 1	+ 6.841			
	April 16	7.4	6.485	2	+ 1	6.486			
	Novbr. 10	21.4	6.652	28	+ 2	6.654	+ 6.593	67	13
	— 11	20.9	6.670	8	+ 2	6.672			
	Dec. 14	21.7	6.630	5	+ 1	6.631			
	1889, Jan. 29	3.9	6.482	23	0	6.482			
65—68	1888, April 28	11.2	+ 51.749	14	+ 15	+ 51.764			
	Dec. 14	21.7	51.713	15	+ 5	51.718	+ 51.719	43	9
	— 21	21.3	51.671	14	+ 4	51.675			
65—69	1888, Dec. 14	21.7	+ 64.725	17	+ 4	+ 64.729			
	— 21	21.3	64.784	10	+ 3	64.787	+ 64.750	27	5
65—95	1888, März 1	6.0	— 6.870	1	— 9	— 6.879			
	April 16	7.4	6.844	21	— 9	6.853	— 6.874	39	8
	Novbr. 11	20.9	6.890	8	— 10	6.900			
	Dec. 14	21.7	6.897	9	— 3	6.900			
65—99	1888, Novbr. 10	21.4	+ 4.683	21	+ 2	+ 4.685			
	— 11	20.9	4.589	21	+ 2	4.591			
	Dec. 14	21.7	4.528	21	+ 1	4.529	+ 4.581	82	16
	1889, Jan. 29	3.9	4.508	19	+ 2	4.510			
66—1	1888, April 28	11.2	— 87.875	19	— 39	— 87.914			
	Novbr. 10	21.4	87.923	32	— 17	87.940	— 87.939	101	20
	Dec. 21	20.9	87.838	24	— 8	87.846			
	1889, Jan. 29	3.3	87.996	26	— 9	88.005			
66—67	1888, März 8	6.1	— 4.114	14	— 3	— 4.117			
	April 16	7.4	4.175	24	— 2	4.177			
	— 28	11.2	4.200	2	— 3	4.203			
	Novbr. 10	21.4	3.920	1	— 2	3.922	— 4.157	86	17
	— 11	20.9	4.231	19	— 2	4.233			
	Dec. 14	21.7	4.108	26	— 1	4.109			
66—67 ^a	1888, März 8	6.1	— 7.970	1	— 6	— 7.976			
	April 16	7.4	7.970	20	— 5	7.975	— 7.980	57	11
	Novbr. 11	20.9	8.042	18	— 3	8.045			
	Dec. 14	21.7	7.919	18	— 2	7.921			
68—1	1888, April 28	11.2	— 125.045	14	— 39	— 125.084			
	Novbr. 10	21.4	125.017	27	— 19	125.036	— 125.064	51	10
	1889, Jan. 29	3.3	125.112	10	— 3	125.115			
68—69	1888, Dec. 14	21.7	+ 13.031	16	+ 3	+ 13.034			
	— 21	21.3	13.095	13	+ 3	13.098	+ 13.063	29	6
69—1	1888, Novbr. 10	21.4	— 138.085	27	— 23	— 138.108			
	1889, Jan. 29	3.9	138.180	22	— 7	138.187	— 138.143	49	10
70—1	1888, März 23	8.3	— 84.586	18	— 5	— 84.591			
	April 29	11.0	84.487	18	— 28	84.515	— 84.581	51	10
	1889, Febr. 13	3.7	84.647	15	— 2	84.649			
71—72	1888, März 21	8.9	— 50.458	13	— 9	— 50.467			
	1889, Febr. 13	3.3	50.418	18	— 1	50.419	— 50.439	31	6
71—73	1888, März 21	8.4	+ 7.531	25	+ 1	+ 7.532			
	April 29	11.8	7.533	24	+ 1	7.534	+ 7.533	49	10

Beobachtete Differenz	Datum	Stunden- winkel	$\Delta \alpha$ app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correc- tionen	$\Delta \alpha$ 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
71—74	1888, März 21	8.8	— 66.876	9	— 20	— 66.896	— 66.964	27	5
	1889, Febr. 13	3.3	66.992	18	— 6	66.998			
71—78	1888, März 21	8.4	+ 5.858	16	+ 2	+ 5.860	+ 5.814	40	8
	April 29	11.8	5.782	24	+ 2	5.784			
71—79	1888, März 21	8.4	+ 13.827	24	0	+ 13.827	+ 13.835	48	10
	April 29	11.8	13.842	24	0	13.842			
71—80	1888, März 21	8.9	— 29.263	11	— 4	— 29.267	— 29.317	29	6
	1889, Febr. 13	3.3	29.346	18	— 2	28.348			
75—1	1888, März 16	6.2	+ 70.479	29	+ 12	+ 70.491	+ 70.481	62	12
	1889, Jan. 29	3.9	70.473	27	+ 3	70.476			
	Febr. 13	4.0	70.452	6	+ 1	70.453			
75—76	1888, März 8	6.7	+ 3.661	12	0	+ 3.661	+ 3.646	70	14
	— 16	7.0	3.677	25	0	3.677			
	— 23	7.7	3.572	5	— 1	3.571			
	1889, Jan. 29	3.9	3.613	27	+ 1	3.614			
	Febr. 13	4.0	3.940	1	+ 1	3.941			
75—77	1888, März 16	6.5	+ 9.628	21	+ 1	+ 9.629	+ 9.671	47	9
	— 23	7.7	9.690	4	0	9.690			
	1889, Jan. 29	3.9	9.687	21	+ 2	9.689			
	Febr. 13	4.0	10.080	1	+ 1	10.081			
81—83	1888, April 16	8.9	— 21.208	5	— 6	— 21.214	— 21.352	20	4
	Dec. 21	21.7	21.397	15	— 1	21.398			
82—83	1888, April 16	8.9	— 15.026	5	— 4	— 15.030	— 15.037	32	6
	Dec. 21	21.7	15.067	15	— 1	15.068			
	1889, Febr. 13	4.8	15.002	12	0	15.002			
83—84	1888, April 16	8.9	+ 23.948	4	+ 12	+ 23.960	+ 24.142	22	4
	Dec. 21	21.7	24.175	12	+ 3	24.178			
	1889, Febr. 13	4.8	24.158	6	+ 4	24.192			
83—85	1888, März 8	6.7	— 13.073	15	— 2	— 13.075	— 13.037	63	13
	— 23	9.4	13.066	20	— 3	13.069			
	April 16	8.9	13.060	9	— 3	13.063			
	1889, Febr. 13	4.8	12.959	19	— 2	12.961			
83—88	1888, März 8	6.7	— 36.477	6	— 7	— 36.484	— 36.333	63	13
	— 21	7.4	36.361	9	— 6	36.367			
	— 23	9.4	36.296	15	— 7	36.303			
	April 16	8.9	36.293	15	— 9	36.302			
	1889, Febr. 13	4.8	36.318	18	0	36.318			
83—90	1888, März 23	9.4	— 33.767	3	— 6	— 33.773	— 33.835	7	1
	1889, Febr. 13	4.8	33.883	4	+ 1	33.882			
83—91	1888, März 8	6.7	— 77.668	6	— 14	— 77.682	— 77.514	35	7
	April 16	8.9	77.514	5	— 9	77.523			
	1889, Febr. 13	4.8	77.469	24	— 1	77.470			
83—92	1888, März 21	7.4	— 31.736	7	— 1	— 31.737	— 31.754	57	11
	— 23	9.4	31.759	15	— 7	31.766			
	April 16	8.9	31.854	11	— 6	31.860			
	1889, Febr. 13	4.8	31.700	24	— 3	31.703			
83—105	1888, März 23	9.7	+ 5.319	16	+ 20	+ 5.339	+ 5.316	38	8
	Dec. 21	21.6	5.293	22	+ 6	5.299			

Beobachtete Differenz	Datum	Stunden- winkel	Δa app.	Anzahl der Fäden	Summe der Correc- tionen	Δa 1890.0	Mittel	Summe der Fäden	Gewicht
85—86	1888, März 8	6.7	— 1.614	5	— 2	— 1.616	— 1.706	58	12
	— 21	7.4	1.672	11	— 1	1.673			
	— 23	9.4	1.601	16	— 2	1.603			
	April 16	8.9	1.770	7	— 3	1.773			
	1889, Febr. 13	4.8	1.808	19	— 2	1.810			
85—89	1888, März 23	9.4	— 21.060	3	— 4	— 21.064	— 21.096	7	1
	1889, Febr. 13	4.8	21.120	4	0	21.120			
87—88	1888, März 21	7.4	+ 11.190	2	+ 1	+ 11.191	+ 11.093	21	4
	— 23	9.4	11.198	6	+ 2	11.200			
	April 16	8.9	10.954	5	+ 3	10.957			
	1889, Febr. 13	4.8	11.074	8	0	11.074			
88—89	1888, März 8	6.7	+ 2.412	5	+ 3	+ 2.415	+ 2.324	27	5
	— 21	7.4	2.330	2	+ 3	2.333			
	— 23	9.4	2.320	7	+ 4	2.324			
	1889, Febr. 13	4.8	2.285	13	+ 3	2.288			
88—90	1888, März 21	7.4	+ 2.357	3	0	+ 2.357	+ 2.347	30	6
	— 23	9.4	2.322	6	+ 1	2.323			
	April 16	8.9	2.300	9	+ 1	2.301			
	1889, Febr. 13	4.8	2.389	12	+ 1	2.390			
91—93	1888, März 21	7.4	— 5.082	13	— 4	— 5.086	— 5.164	81	16
	— 23	9.4	5.026	19	— 5	5.031			
	April 16	8.9	5.430	9	— 4	5.434			
	1889, Jan. 29	3.9	5.110	6	— 3	5.113			
	Febr. 13	4.5	5.203	34	— 3	5.206			
95—I	1888, April 16	10.0	— 66.253	4	— 21	— 66.274	— 66.528	23	5
	Novbr. 10	21.6	66.523	9	— 11	66.534			
	1889, Jan. 29	3.3	66.623	10	— 2	66.625			

Declinationsdifferenzen.

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
2-1	1887, Jan. 22	r	^h 3 ^m 57	^{rev} - 1.3678	6	- 12	^{rev} - 1.3690	^{rev} - 1.3611	21	4
	— 22	r	4 35	1.3587	5	- 13	1.3600			
	— 25	l	4 45	1.3540	5	- 18	1.3558			
	— 25	l	5 59	1.3578	5	- 19	1.3597			
2-4	1887, Jan. 25	l	5 50	- 0.4154	5	- 4	- 0.4158	- 0.4158	10	2
	Febr. 5	r	4 16	0.4149	5	- 8	0.4157			
2-5	1887, Jan. 22	r	4 40	- 1.3161	5	- 12	- 1.3173	- 1.3202	21	4
	— 25	l	5 22	1.3230	6	- 16	1.3246			
	Febr. 5	r	4 2	1.3089	5	- 19	1.3108			
	— 24	l	2 58	1.3271	5	- 10	1.3281			
2-6	1887, Jan. 25	l	5 42	- 0.6746	6	+ 16	- 0.6730	- 0.6675	11	2
	Febr. 24	r	5 16	0.6631	5	+ 12	0.6619			
2-7	1887, Jan. 22	r	4 30	- 0.1699	5	- 14	- 0.1713	- 0.1700	21	4
	— 25	l	5 54	0.1716	6	- 19	0.1735			
	Febr. 5	r	4 23	0.1649	5	- 12	0.1661			
	— 24	l	3 3	0.1682	5	- 9	0.1691			
3-1	1887, Jan. 22	r	4 14	- 1.4243	5	- 8	- 1.4251	- 1.4252	12	2
	— 25	l	4 48	1.4238	7	- 15	1.4253			
3-5'	1887, Jan. 25	l	5 17	- 1.3879	7	- 14	- 1.3893	- 1.3871	13	3
	Febr. 5	r	3 44	1.3829	6	- 19	1.3848			
3-6	1887, Jan. 25	l	5 37	- 0.7294	5	+ 17	- 0.7277	- 0.7262	10	2
	Febr. 5	r	3 50	0.7259	5	+ 13	0.7246			
4-1	1887, Jan. 22	r	3 53	- 0.9369	5	- 2	- 0.9371	- 0.9369	11	2
	— 25	l	4 41	0.9366	6	- 2	0.9368			
4-5	1887, Jan. 22	r	4 45	- 0.8929	5	+ 6	- 0.8923	- 0.8948	10	2
	— 25	l	5 11	0.8978	5	+ 5	0.8973			
4-6	1887, Jan. 22	r	4 22	- 0.2655	5	- 16	- 0.2671	- 0.2560	17	3
	— 25	l	5 27	0.2440	6	- 20	0.2460			
	Febr. 5	r	3 56	0.2533	6	- 17	0.2550			
4-7	1887, Jan. 22	r	4 26	+ 0.2647	5	+ 19	+ 0.2666	+ 0.2586	20	4
	— 25	l	5 46	0.2538	5	+ 16	0.2554			
	Febr. 5	r	4 9	0.2507	5	+ 17	0.2524			
	— 24	l	2 53	0.2589	5	+ 11	0.2600			
5-1	1887, Jan. 22	r	4 10	- 0.0503	5	- 8	- 0.0511	- 0.0500	10	2
	— 25	l	4 54	0.0482	5	- 7	0.0489			
5-6	1887, Jan. 22	r	4 18	+ 0.6593	5	- 15	+ 0.6578	+ 0.6546	11	2
	— 25	l	5 1	0.6525	6	- 11	0.6514			
5-7	1887, Jan. 22	r	4 50	+ 1.1488	6	+ 16	+ 1.1504	+ 1.1514	12	2
	— 25	l	5 6	1.1505	6	+ 18	1.1523			
5-8	1888, März 8	l	4 20	+ 1.4285	5	+ 34	+ 1.4319	+ 1.4519	14	3
	Oct. 16	r	19 0	1.4651	5	+ 25	1.4676			
	— 19	l	19 55	1.4575	4	- 12	1.4563			
6-1	1887, Jan. 22	r	3 44	- 0.6901	5	+ 12	- 0.6889	- 0.6867	22	4
	— 25	l	4 33	0.6813	6	+ 8	0.6805			
	— 28	l	6 0	0.6955	5	+ 4	0.6951			
	Febr. 5	r	3 26	0.6836	6	+ 12	0.6824			

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
			^{h m}	^{rev}			^{rev}	^{rev}		
6—7	1887, Jan. 22	r	4 55	+ 0.5019	5	— 4	+ 0.5015	+ 0.5053	11	2
	— 25	l	5 33	0.5090	6	+ 1	0.5091			
6—8	1887, Dec. 2	r	21 8	+ 0.7969	5	— 13	+ 0.7956	+ 0.7891	7	2
	1888, März 21	l	7 1	0.7755	2	+ 6	0.7761			
6—19	1887, Febr. 25	r	2 7	— 5.6130	6	— 2	— 5.6132			
	März 4	r	2 40	5.6099	5	— 3	5.6102			
	April 5	l	8 10	5.6286	5	— 34	5.6320	— 5.6207	28	6
	— 6	l	6 47	5.6202	5	— 5	5.6207			
	— 20	l	9 45	5.6172	7	— 102	5.6274			
6—20	1887, März 4	r	6 31	— 2.9888	5	— 14	— 2.9902	— 2.9867	10	2
	Novbr. 17	l	19 58	2.9824	5	— 8	2.9832			
6—21	1887, Oct. 23	l	20 29	— 2.4814	6	— 15	— 2.4829	— 2.4837	14	3
	— 28	r	19 27	2.4838	8	— 6	2.4844			
6—25	1887, Jan. 26	r	4 30	+ 4.9201	5	— 13	+ 4.9188	+ 4.9177	11	2
	— 27	l	4 42	4.9181	6	— 14	4.9167			
6—27	1887, Febr. 24	r	7 40	+ 4.4197	5	+ 15	+ 4.4212			
	April 21	l	7 30	4.4224	5	— 3	4.4221	+ 4.4238	20	4
	— 22	l	7 45	4.4335	5	0	4.4335			
	Oct. 27	r	18 4	4.4158	5	+ 27	4.4185			
6—30	1887, Febr. 24	r	7 32	+ 9.2556	5	+ 60	+ 9.2616			
	April 20	l	8 2	9.2699	4	+ 68	9.2767	+ 9.2697	24	5
	— 21	l	7 42	9.2654	9	+ 56	9.2710			
	Oct. 27	r	18 9	9.2631	6	+ 53	9.2684			
6—37	1887, Jan. 28	l	5 16	— 1.6448	5	+ 23	— 1.6425	— 1.6412	12	2
	Febr. 5	r	2 35	1.6415	7	+ 15	1.6400			
6—38	1887, Jan. 28	l	5 10	— 1.1716	6	— 2	— 1.1718			
	Febr. 5	r	2 29	1.1837	5	— 4	1.1841	— 1.1774	26	5
	März 4	r	2 45	1.1680	6	0	1.1680			
	April 6	l	8 0	1.1812	9	— 3	1.1815			
6—39	1887, Jan. 28	l	5 22	+ 2.2625	5	+ 39	+ 2.2664	+ 2.2618	12	2
	Febr. 5	r	2 41	2.2541	7	+ 31	2.2572			
6—40	1887, Jan. 28	l	5 28	+ 1.7573	5	+ 5	+ 1.7578	+ 1.7619	11	2
	Febr. 5	r	2 47	1.7659	6	0	1.7659			
6—41	1887, Jan. 28	l	2 28	— 0.5869	6	— 17	— 0.5886			
	Febr. 4	r	3 55	0.5854	5	— 8	0.5862	— 0.5866	22	4
	April 6	l	7 49	0.5771	6	— 30	0.5801			
	Oct. 27	r	17 50	0.5926	5	+ 9	0.5917			
6—42	1887, Jan. 28	l	5 40	+ 2.6996	6	+ 26	+ 2.7022	+ 2.7015	12	2
	Febr. 5	r	3 0	2.6989	6	+ 19	2.7008			
6—43	1887, Jan. 28	l	5 45	+ 5.4839	5	+ 49	+ 5.4888	+ 5.4892	11	2
	Febr. 5	r	3 7	5.4863	6	+ 33	5.4896			
6—44	1887, Jan. 28	l	5 50	+ 7.5166	5	+ 41	+ 7.5207			
	Febr. 5	r	3 14	7.5026	6	+ 23	7.5049	+ 7.5171	23	5
	April 6	l	7 55	7.5068	7	+ 85	7.5153			
	Oct. 27	r	17 58	7.5250	5	+ 26	6.5276			
6—45	1887, Febr. 28	r	2 46	— 2.7935	6	— 29	— 2.7964			
	April 6	l	7 35	2.7900	5	— 54	2.7954	— 2.7989	21	4
	— 20	l	7 51	2.7954	5	— 58	2.8012			
	Oct. 27	r	17 41	2.8024	5	— 1	2.8025			
6—52	1887, Oct. 28	r	17 43	— 11.1414	5	— 69	— 11.1483			
	Novbr. 13	r	21 7	11.1226	5	— 39	11.1265			
	— 16	r	19 22	11.1300	5	— 52	11.1352	— 11.1366	24	5
	— 16	l	21 26	11.1259	4	— 51	11.1310			
	— 17	l	19 6	11.1366	5	— 56	11.1422			

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta\delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta\delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
7—1	1887, Jan. 22 — 25	r l	^h 3 48 ^m 4 37	^{rev} — 1.2029 1.1952	5 5	— 20 — 24	^{rev} — 1.2049 1.1976	^{rev} — 1.2013	10	2
8—1	1887, Dec. 2 1888, März 8	r l	21 15 4 28	— 1.4897 1.4914	5 4	— 4 — 34	— 1.4901 1.4948	— 1.4924	9	2
9—1	1887, Jan. 26 — 27	r l	2 30 2 47	+ 0.5181 0.5309	5 6	— 5 + 5	+ 0.5176 0.5314	+ 0.5245	11	2
9—11	1887, März 19 Oct. 23	r l	6 25 18 37	— 0.9411 0.9294	4 5	0 + 3	— 0.9411 0.9291	— 0.9351	9	2
9—19	1887, Jan. 26 — 27	r l	5 12 5 14	— 4.4135 4.4020	5 5	— 17 — 8	— 4.4152 4.4028	— 4.4090	10	2
9—41	1887, Febr. 25 1888, März 8	r l	3 57 3 59	+ 0.6317 0.6361	5 6	— 20 — 38	+ 0.6297 0.6323	+ 0.6310	11	2
10—1	1887, Jan. 26 — 27	r l	3 18 3 37	+ 0.5900 0.5790	6 5	— 9 + 3	+ 0.5891 0.5793	+ 0.5842	11	2
10—10 ^a	1888, Oct. 16 — 19	r l	19 12 20 6	+ 0.4403 0.4575	5 5	— 9 + 24	+ 0.4394 0.4599	+ 0.4497	10	2
10—11	1888, Oct. 16 — 19	r l	19 16 20 14	— 0.8471 0.8710	5 6	+ 12 + 4	— 0.8459 0.8706	— 0.8583	11	2
10—12	1888, Oct. 16 — 19	r l	19 20 20 20	— 0.7943 0.7897	5 6	+ 6 + 19	— 0.7937 0.7878	— 0.7908	11	2
10—41	1887, Febr. 25 1888, März 8	r l	4 2 4 3	+ 0.6915 0.6926	7 4	+ 12 — 35	+ 0.6927 0.6891	+ 0.6909	11	2
10 ^a —1	1887, Jan. 26 — 27	r l	3 29 3 47	+ 0.1403 0.1301	5 5	+ 15 + 17	+ 0.1418 0.1318	+ 0.1368	10	2
10 ^a —13	1887, Dec. 2 1888, März 8	r l	20 20 4 13	— 0.2576 0.2294	3 4	— 15 — 24	— 0.2591 0.2318	— 0.2454	7	2
10 ^a —41	1887, Febr. 25 Novbr. 16 — 28	r r l	4 6 19 47 21 37	+ 0.2471 0.2446 0.2486	5 5 5	+ 9 + 18 + 14	+ 0.2480 0.2464 0.2500	+ 0.2481	15	3
11—1	1887, Jan. 26 — 27	r l	2 39 2 57	+ 1.4547 1.4684	5 5	+ 5 + 15	+ 1.4552 1.4699	+ 1.4626	10	2
11—18	1887, März 19 Oct. 13	r l	6 28 21 18	— 0.7420 0.7493	5 5	+ 10 + 17	— 0.7410 0.7476	— 0.7443	10	2
11—19	1887, Jan. 26 — 27	r l	5 18 5 19	— 3.4691 3.4500	5 5	— 8 + 2	— 3.4699 3.4498	— 3.4599	10	2
11—20	1887, März 4 Oct. 23	r l	6 5 20 9	— 0.8288 0.8319	5 6	+ 18 + 15	— 0.8270 0.8304	— 0.8287	11	2
11—21	1887, März 4 Oct. 23	r l	6 10 20 15	— 0.3304 0.3246	5 6	— 13 — 12	— 0.3317 0.3258	— 0.3287	11	2
11—41	1887, Febr. 25 1888, März 8	r l	3 27 3 43	+ 1.5644 1.5663	6 6	— 11 — 31	+ 1.5633 1.5632	+ 1.5633	12	2
12—1	1887, Jan. 26 — 27	r l	2 34 2 52	+ 1.3695 1.3904	5 6	+ 14 + 23	+ 1.3709 1.3927	+ 1.3818	11	2

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta\delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta\delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
12—12 ^a	1887, Dec. 2 1888, März 21	<i>r</i> <i>l</i>	^{h m} 20 42 6 54	^{rev} — 0.3451 0.3437	5 6	— 18 + 3	^{rev} — 0.3469 0.3434	^{rev} — 0.3451	11	2
12—13	1888, Oct. 16 — 19	<i>r</i> <i>l</i>	19 24 20 24	+ 0.9765 0.9801	5 5	+ 1 + 2	+ 0.9766 0.9803	+ 0.9785	10	2
12—14	1887, März 19 Oct. 13	<i>r</i> <i>l</i>	6 48 21 24	+ 0.8200 0.8303	6 6	— 15 — 15	+ 0.8185 0.8288	+ 0.8237	12	2
12—15	1887, März 19 Oct. 13	<i>r</i> <i>l</i>	6 43 21 34	— 0.9603 0.9623	5 5	— 4 0	— 0.9607 0.9623	— 0.9615	10	2
12—19	1887, Jan. 26 — 27	<i>r</i> <i>l</i>	5 24 5 24	— 3.5515 3.5541	5 5	+ 3 + 14	— 3.5512 3.5527	— 3.5520	10	2
12—41	1887, Febr. 25 1888, März 8	<i>r</i> <i>l</i>	3 22 3 39	+ 1.4787 1.4811	6 6	0 — 24	+ 1.4787 1.4787	+ 1.4787	12	2
12 ^a — 1	1888, Oct. 16 — 19	<i>r</i> <i>l</i>	19 8 20 0	+ 1.7299 1.7121	5 5	0 — 20	+ 1.7299 1.7101	+ 1.7200	10	2
12 ^a — 41	1887, Dec. 2 1888, März 21	<i>r</i> <i>l</i>	20 46 6 59	+ 1.8087 1.8197	5 5	— 11 — 19	+ 1.8076 1.8178	+ 1.8127	10	2
13—1	1887, Jan. 26 — 27 Novbr. 16	<i>r</i> <i>l</i> <i>r</i>	3 23 3 42 19 37	+ 0.3840 0.3808 0.3894	5 5 5	+ 15 + 22 + 7	+ 0.3855 0.3830 0.3901	+ 0.3862	15	3
13—14	1888, Oct. 16 — 19	<i>r</i> <i>l</i>	19 28 20 28	— 0.1715 0.1659	5 5	— 18 — 7	— 0.1733 0.1666	— 0.1700	10	2
13—41	1887, Febr. 25 1888, März 8	<i>r</i> <i>l</i>	4 12 4 8	+ 0.4911 0.5061	4 5	— 2 — 27	+ 0.4909 0.5034	+ 0.4972	9	2
14—1	1887, Jan. 26 — 27	<i>r</i> <i>l</i>	3 36 3 52	+ 0.5367 0.5433	6 5	+ 1 + 12	+ 0.5368 0.5445	+ 0.5406	11	2
14—14 ^a	1887, Dec. 2 1888, Novbr. 11	<i>l</i> <i>r</i>	20 38 18 45	— 0.4165 0.4105	5 6	— 6 — 23	— 0.4171 0.4128	— 0.4149	11	2
14—15	1888, Oct. 16 — 19	<i>r</i> <i>l</i>	19 32 20 32	— 1.7797 1.7873	5 5	+ 15 0	— 1.7782 1.7873	— 1.7828	10	2
14—19	1887, Jan. 26 — 27	<i>r</i> <i>l</i>	5 52 5 50	— 4.3780 4.3969	6 5	— 14 — 12	— 4.3794 4.3971	— 4.3882	11	2
14—41	1887, Febr. 25 1888, März 8	<i>r</i> <i>l</i>	3 17 3 36	+ 0.6492 0.6536	6 6	— 14 — 30	+ 0.6478 0.6506	+ 0.6492	12	2
14—45	1888, Oct. 16 — 19	<i>r</i> <i>l</i>	19 35 20 36	— 1.5759 1.5639	5 6	— 14 + 20	— 1.5773 1.5619	— 1.5696	11	2
14 ^a — 1	1887, Jan. 26 — 27	<i>r</i> <i>l</i>	3 42 3 57	+ 0.9612 0.9526	4 5	+ 9 + 8	+ 0.9621 0.9534	+ 0.9577	9	2
14 ^a — 14 ^b	1887, Dec. 2 1888, Novbr. 11	<i>l</i> <i>r</i>	20 25 18 40	— 0.3559 0.3390	5 5	— 17 — 1	— 0.3576 0.3391	— 0.3484	10	2
14 ^a — 41	1887, Febr. 25 Dec. 2 1888, März 21	<i>r</i> <i>r</i> <i>l</i>	3 32 20 30 6 44	+ 1.0675 1.0649 1.0497	5 5 6	+ 6 + 8 + 4	+ 1.0681 1.0657 1.0501	+ 1.0613	16	3
14 ^b — 41	1887, Dec. 2 1888, März 21	<i>r</i> <i>l</i>	20 34 6 49	+ 1.3985 1.4120	5 6	+ 17 — 8	+ 1.4002 1.4112	+ 1.4057	11	2

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
14 ^c —4I	1887, Dec. 2 1888, Novbr. 11	<i>l</i> <i>r</i>	^{h m} 20 53 18 35	^{rev} + 1.2269 1.2018	5 5	+ 20 + 11	^{rev} + 1.2289 1.2029	^{rev} + 1.2159	10	2
15—I	1887, Jan. 26 — 27	<i>r</i> <i>l</i>	2 48 3 7	+ 2.3333 2.3371	5 5	+ 23 + 30	+ 2.3356 2.3401	+ 2.3379	10	2
15—15 ^a	1887, Dec. 2	<i>r</i>	21 20	— 0.2667	6	— 20	— 0.2687	— 0.2687	6	1
15—16	1887, März 19 Oct. 23 1888, Oct. 16 — 19	<i>r</i> <i>l</i> <i>r</i> <i>l</i>	6 38 18 43 19 38 20 39	— 0.9297 0.9188 0.9273 0.9151	4 7 5 5	+ 2 + 5 + 2 + 6	— 0.9295 0.9183 0.9271 0.9145	— 0.9223	21	4
15—17	1888, Oct. 16 — 19	<i>r</i> <i>l</i>	19 44 20 42	— 0.8123 0.8215	5 5	+ 16 + 4	— 0.8107 0.8211	— 0.8159	10	2
15—19	1887, Jan. 26 — 27	<i>r</i> <i>l</i>	5 46 5 45	— 2.5861 2.5963	6 6	+ 9 + 21	— 2.5852 2.5942	— 2.5897	12	2
15—4I	1887, Febr. 25 1888, März 8	<i>r</i> <i>l</i>	3 37 3 46	+ 2.4452 2.4444	5 4	+ 9 — 16	+ 2.4461 2.4428	+ 2.4445	9	2
15 ^a —4I	1887, Dec. 2	<i>r</i>	21 25	+ 2.7017	5	— 8	+ 2.7009	+ 2.7009	5	1
16—I	1887, Jan. 26 — 27	<i>r</i> <i>l</i>	3 7 3 27	+ 3.2481 3.2525	5 5	+ 29 + 34	+ 3.2510 3.2559	+ 3.2535	10	2
16—18	1887, März 19 Oct. 23	<i>r</i> <i>l</i>	6 35 18 48	+ 1.0594 1.0550	5 5	+ 17 + 10	+ 1.0611 1.0560	+ 1.0586	10	2
16—19	1887, Jan. 26 — 27	<i>r</i> <i>l</i>	5 35 5 34	— 1.6673 1.6713	5 5	+ 20 + 29	— 1.6653 1.6684	— 1.6669	10	2
16—28	1887, März 19 Oct. 23	<i>r</i> <i>l</i>	6 58 18 58	— 3.2938 3.3126	4 5	— 33 — 24	— 3.2971 3.3150	— 3.3061	9	2
16—4I	1887, Febr. 25 1888, März 8	<i>r</i> <i>l</i>	3 42 3 49	+ 3.3625 3.3644	5 4	+ 18 — 5	+ 3.3643 3.3639	+ 3.3641	9	2
17—I	1887, Jan. 26 — 27	<i>r</i> <i>l</i>	3 12 3 32	+ 3.1595 3.1668	5 6	+ 22 + 26	+ 3.1617 3.1694	+ 3.1656	11	2
17—18	1887, März 19 Oct. 23	<i>r</i> <i>l</i>	6 32 18 53	+ 0.9742 0.9586	4 6	+ 2 — 1	+ 0.9744 0.9585	+ 0.9665	10	2
17—19	1887, Jan. 26 — 27	<i>r</i> <i>l</i>	5 40 5 40	— 1.7585 1.7660	6 6	+ 20 + 24	— 1.7565 1.7636	— 1.7601	12	2
17—29	1887, März 19 Oct. 23	<i>r</i> <i>l</i>	7 3 19 3	— 3.0905 3.1002	5 5	— 25 — 20	— 3.0930 3.1022	— 3.0976	10	2
17—4I	1887, Febr. 25 1888, März 8	<i>r</i> <i>l</i>	3 48 3 53	+ 3.2670 3.2639	10 5	+ 14 — 1	+ 3.2684 (2) 3.2638	+ 3.2669	15	3
18—I	1887, Jan. 26 — 27	<i>r</i> <i>l</i>	2 44 3 2	+ 2.1937 2.2132	6 5	+ 20 + 25	+ 2.1957 2.2157	+ 2.2057	11	2
18—19	1887, Jan. 26 — 27 Febr. 24	<i>r</i> <i>l</i> <i>l</i>	5 30 5 29 3 8	— 2.7135 2.7332 2.7225	5 4 5	— 10 + 22 + 27	— 2.7145 2.7310 2.7198	— 2.7218	14	3
18—4I	1887, Febr. 25 1888, März 8	<i>r</i> <i>l</i>	3 52 3 55	+ 2.3178 2.3261	6 4	+ 10 — 10	+ 2.3188 2.3251	+ 2.3220	10	2

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
19-1	1887, Jan. 8	r	h m 1 49	^{rev} + 4.9360	10	- 1	^{rev} + 4.9359 (2)	^{rev} + 4.9283	91	18
	— 22	r	2 36	4.9304	5	+ 9	4.9313			
	— 22	r	5 0	4.9327	10	- 2	4.9325 (2)			
	— 25	l	3 15	4.9325	6	+ 9	4.9334			
	— 25	l	6 3	4.9302	6	+ 2	4.9304			
	— 26	r	3 2	4.9297	5	- 5	4.9292			
	— 26	r	5 6	4.9348	5	- 2	4.9346			
	— 27	l	3 22	4.9221	5	- 6	4.9215			
	— 27	l	5 9	4.9261	5	- 3	4.9258			
	Febr. 17	l	7 9	4.9175	6	+ 11	4.9186			
	1888, März 1	r	3 42	4.9247	6	- 2	4.9245			
	Novbr. 13	l	19 49	4.9157	5	+ 7	4.9164			
	— 14	r	20 2	4.9278	7	+ 11	4.9289			
	— 26	r	19 41	4.9330	5	+ 4	4.9334			
	— 27	l	19 53	4.9151	5	+ 5	4.9156			
19-19 ^a	1887, Jan. 27	l	6 10	- 2.0134	5	- 6	- 2.0140	- 2.0235	27	5
	Febr. 4	r	3 15	2.0176	5	- 3	2.0179			
	— 5	r	3 32	2.0267	6	- 4	2.0271			
	— 11	l	4 52	2.0287	6	- 5	2.0292			
	— 17	l	3 14	2.0287	5	- 4	2.0291			
19-19 ^b	1887, Febr. 5	r	3 38	- 3.0857	6	- 3	- 3.0860	- 3.0827	21	4
	— 11	l	5 2	3.0787	5	- 2	3.0789			
	— 17	l	3 20	3.0809	5	0	3.0809			
	— 24	r	5 24	3.0848	5	- 2	3.0850			
19-20	1887, Jan. 26	r	5 0	+ 2.6306	6	- 7	+ 2.6299	+ 2.6314	22	4
	— 27	l	5 4	2.6284	6	- 16	2.6268			
	März 4	r	6 27	2.6246	5	- 5	2.6241			
	Novbr. 17	l	19 47	2.6458	5	- 9	2.6449			
19-21	1887, Oct. 23	l	20 25	+ 3.1351	6	+ 20	+ 3.1371	+ 3.1475	11	2
	— 28	r	19 20	3.1556	5	+ 23	3.1579			
19-28	1887, Jan. 26	r	6 4	- 1.6291	4	- 2	- 1.6293	- 1.6210	9	2
	— 27	l	6 5	1.6113	5	- 14	1.6127			
19-29	1887, Jan. 26	r	6 10	- 1.3317	5	- 25	- 1.3342	- 1.3337	11	2
	— 27	l	6 0	1.3300	6	- 33	1.3333			
19-37	1887, Oct. 28	r	22 7	+ 3.9856	5	+ 13	+ 3.9869	+ 3.9854	10	2
	Novbr. 17	l	20 16	3.9828	5	+ 11	3.9839			
19-38	1887, Febr. 11	l	5 7	+ 4.4499	5	+ 36	+ 4.4535	+ 4.4540	26	5
	— 17	l	3 40	4.4469	5	+ 34	4.4503			
	März 4	r	2 50	4.4458	4	+ 22	4.4480			
	April 6	l	7 0	4.4514	6	+ 48	4.4562			
	Oct. 28	r	17 57	4.4599	6	+ 20	4.4619			
19-38 ^a	1887, Febr. 17	l	3 34	+ 2.0662	4	+ 25	+ 2.0687	+ 2.0796	9	2
	Novbr. 16	r	20 7	2.0888	5	+ 16	2.0904			
19-38 ^b	1887, Febr. 17	l	3 27	+ 0.7761	5	+ 2	+ 0.7763	+ 0.7783	10	2
	Novbr. 16	r	20 17	0.7818	5	- 15	0.7803			
19-41	1887, Jan. 26	r	5 58	+ 5.0331	5	0	+ 5.0331	+ 5.0371	24	5
	— 27	l	5 55	5.0423	6	0	5.0423			
	April 6	l	7 22	5.0463	7	- 4	5.0467			
	Oct. 28	r	18 27	5.0246	6	- 15	5.0261			
19-45	1887, Febr. 25	r	2 55	+ 2.8283	6	- 51	+ 2.8232	+ 2.8222	22	4
	April 6	l	7 10	2.8267	5	- 54	2.8213			
	— 21	l	9 23	2.8300	6	- 16	2.8284			
	Oct. 28	r	18 7	2.8166	5	- 8	2.8158			

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
19—52	1887, Jan. 8 — 22 — 22 — 25 — 31 — 31 Febr. 1 — 4 — 17 Novbr. 13 — 14 — 26 — 27	r r r l l l r r l l r r l	h m 2 27 2 46 5 4 4 9 4 5 5 55 5 7 3 30 7 16 19 53 20 7 19 46 19 58	rev — 5.5157 5.5093 5.5067 5.5135 5.5098 5.5091 5.5071 5.5042 5.5153 5.5177 5.5022 5.5036 5.5087	6 6 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5	— 35 — 17 — 41 — 52 — 54 — 60 — 46 — 45 — 81 — 32 + 11 + 14 — 31	rev — 5.5192 5.5110 5.5108 5.5187 5.5152 5.5151 5.5117 5.5087 5.5234 5.5209 5.5011 5.5022 5.5118	— 5.5131	69	14
19—53	1888, März 1	r	3 53	— 5.9092	7	— 38	— 5.9130	— 5.9130	7	1
19—57	1887, Febr. 28 April 21 Oct. 13 — 28	r l l r	2 34 9 13 20 11 18 2	— 10.2126 10.1945 10.1943 10.2168	5 6 5 5	— 62 — 220 — 53 — 60	— 10.2188 10.2165 10.1996 10.2228	— 10.2144	21	4
19—60	1887, Jan. 21 Febr. 4	l r	6 10 3 45	— 5.0280 5.0200	6 5	— 36 — 29	— 5.0316 5.0229	— 5.0273	11	2
19 ^a — 19 ^b	1887, Novbr. 13 — 28	r l	20 10 21 50	— 1.0521 1.0565	5 6	— 6 — 6	— 1.0527 1.0571	— 1.0549	11	2
19 ^b — 38 ^b	1887, Oct. 26 Novbr. 16	l r	22 10 19 57	+ 3.8576 3.8530	5 5	— 1 — 4	+ 3.8575 3.8526	+ 3.8551	10	2
20—1	1887, Jan. 26 — 27	r l	2 53 3 12	+ 2.2881 2.2813	5 6	+ 22 + 16	+ 2.2903 2.2829	+ 2.2866	11	2
20—21	1887, März 4 Oct. 23	r l	6 22 19 52	+ 0.4914 0.5112	5 5	+ 9 — 4	+ 0.4923 0.5108	+ 0.5016	10	2
20—37	1887, Oct. 28 Novbr. 17	r l	19 40 20 4	+ 1.3530 1.3452	5 7	+ 16 + 23	+ 1.3546 1.3475	+ 1.3510	12	2
20—38	1887, März 4 Novbr. 17	r l	6 35 19 52	+ 1.8168 1.8184	5 5	+ 12 — 6	+ 1.8180 1.8178	+ 1.8179	10	2
20—41	1887, März 4 Oct. 23	r l	6 14 20 2	+ 2.3948 2.3984	5 6	+ 3 + 11	+ 2.3951 2.3995	+ 2.3973	11	2
21—1	1887, Jan. 26 — 27 Oct. 23	r l l	2 58 3 17 20 20	+ 1.7905 1.7978 1.8044	5 5 5	— 12 — 16 — 11	+ 1.7893 1.7962 1.8033	+ 1.7963	15	3
21—37	1887, Oct. 28 Novbr. 17	r l	19 33 20 10	+ 0.8497 0.8236	6 5	— 10 — 9	+ 0.8487 0.8227	+ 0.8357	11	2
21—38	1887, Oct. 23 Novbr. 13	l r	20 34 20 0	+ 1.3144 1.3169	5 5	+ 25 + 18	+ 1.3169 1.3187	+ 1.3178	10	2
21—41	1887, März 4 Oct. 23	r l	6 18 19 57	+ 1.8984 1.8946	5 5	— 22 — 8	+ 1.8962 1.8938	+ 1.8950	10	2
22—1	1887, Jan. 26 — 27	r l	4 12 4 22	— 1.0943 1.1007	4 6	— 5 — 3	— 1.0948 1.1010	— 1.0979	10	2
22—41	1887, Febr. 4 — 11 — 17 Oct. 28	r l l r	4 5 5 46 3 0 21 50	— 0.9942 0.9877 0.9965 0.9682	6 5 6 4	— 7 — 9 — 8 — 2	— 0.9949 0.9886 0.9973 0.9684	— 0.9873	21	4

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
			^h ^m	^{rev}			^{rev}	^{rev}		
22 ^a — I	1887, Jan. 27	<i>l</i>	4 27	— 1.0249	3	+ 2	— 1.0247	— 1.0308	13	3
	Febr. 24	<i>l</i>	2 43	1.0358	5	+ 1	1.0357			
	Dec. 2	<i>r</i>	21 0	1.0317	5	— 4	1.0321			
22 ^a — 4 I	1887, Febr. 4	<i>r</i>	4 15	— 0.9457	3	— 6	— 0.9463 ($\frac{1}{2}$)	— 0.9154	14	3
	— 17	<i>l</i>	3 7	0.9014	6	— 2	0.9016			
	— 24	<i>r</i>	5 8	0.9134	5	— 2	0.9136			
23 — I	1887, Jan. 26	<i>r</i>	4 6	— 2.0225	5	+ 4	— 2.0221	— 2.0166	10	2
	— 27	<i>l</i>	4 17	2.0117	5	+ 6	2.0111			
23 — 27	1887, März 4	<i>r</i>	6 53	+ 3.0864	5	+ 15	+ 3.0879	+ 3.0920	11	2
	Oct. 23	<i>l</i>	20 48	3.0944	6	+ 17	3.0961			
23 — 4 I	1887, Jan. 28	<i>l</i>	2 34	— 1.9158	6	+ 2	— 1.9156	— 1.9209	11	2
	Febr. 4	<i>r</i>	4 0	1.9264	5	+ 1	1.9263			
24 — I	1887, Jan. 26	<i>r</i>	4 18	— 3.3702	5	— 16	— 3.3718	— 3.3679	10	2
	— 27	<i>l</i>	4 32	3.3633	5	— 7	3.3640			
24 — 25	1887, Oct. 28	<i>r</i>	21 17	+ 2.2468	5	+ 25	+ 2.2493	+ 2.2536	12	2
	Novbr. 28	<i>l</i>	21 55	2.2558	7	+ 21	2.2579			
24 — 27	1887, März 4	<i>r</i>	7 0	+ 1.7422	5	— 17	+ 1.7405	+ 1.7375	20	4
	Oct. 23	<i>l</i>	20 52	1.7440	5	— 16	1.7424			
	— 28	<i>r</i>	21 6	1.7338	5	— 11	1.7327			
	Novbr. 17	<i>l</i>	20 21	1.7360	5	— 16	1.7344			
24 — 4 I	1887, Jan. 28	<i>r</i>	2 40	— 3.2609	5	— 29	— 3.2638	— 3.2576	10	2
	Febr. 4	<i>l</i>	4 10	3.2488	5	— 25	3.2513			
24 ^a — 25	1887, Oct. 28	<i>r</i>	21 22	+ 2.3352	5	+ 24	+ 2.3376	+ 2.3343	9	2
	Novbr. 17	<i>l</i>	20 31	2.3291	4	+ 19	2.3310			
24 ^a — 27	1887, Oct. 28	<i>r</i>	21 12	+ 1.8318	5	— 10	+ 1.8308	+ 1.8239	9	2
	Novbr. 17	<i>l</i>	20 26	1.8183	4	— 13	1.8170			
24 ^a — 4 I	1887, Febr. 4	<i>r</i>	4 45	— 3.1448	5	— 21	— 3.1469	— 3.1531	10	2
	— 11	<i>l</i>	5 39	3.1565	5	— 27	3.1592			
25 — I	1888, Oct. 16	<i>r</i>	20 38	— 5.6081	5	— 49	— 5.6130	— 5.6116	15	3
	Novbr. 10	<i>r</i>	18 7	5.6101	5	— 41	5.6142			
	— 13	<i>l</i>	19 23	5.6033	5	— 44	5.6077			
25 — 26	1887, Jan. 26	<i>r</i>	4 40	+ 0.6729	5	— 17	+ 0.6712	+ 0.6713	20	4
	— 27	<i>l</i>	4 52	0.6703	5	— 8	0.6695			
	Febr. 4	<i>r</i>	6 15	0.6732	5	— 17	0.6715			
	— 11	<i>l</i>	5 32	0.6737	5	— 8	0.6729			
25 — 27	1887, März 4	<i>r</i>	6 41	— 0.5013	8	— 7	— 0.5020	— 0.5001	22	4
	April 22	<i>l</i>	9 15	0.5047	8	— 24	0.5071			
	Oct. 23	<i>l</i>	20 39	0.4904	6	— 8	0.4912			
25 — 30	1887, Jan. 28	<i>l</i>	4 45	+ 4.3471	6	+ 19	+ 4.3490	+ 4.3481	11	2
	Febr. 4	<i>r</i>	6 0	4.3440	5	+ 31	4.3471			
25 — 4 I	1887, Jan. 28	<i>l</i>	2 50	— 5.5074	5	— 19	— 5.5093	— 5.5057	10	2
	Febr. 4	<i>r</i>	4 25	5.5012	5	— 8	5.5020			
26 — I	1887, Jan. 26	<i>r</i>	4 35	— 6.2841	5	— 22	— 6.2863	— 6.2859	11	2
	— 27	<i>l</i>	4 47	6.2839	6	— 16	6.2855			

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
26—27	1887, März 4 April 22 Oct. 23	r l l	^{h m} 6 47 9 20 20 43	^{rev} — 1.1742 1.1840 1.1674	5 4 5	— 28 — 48 — 21	^{rev} — 1.1770 1.1888 1.1695	^{rev} — 1.1784	14	3
26—30	1887, März 4 Oct. 23	r l	7 27 20 57	+ 3.6535 3.6862	6 5	+ 12 — 8	+ 3.6547 3.6854	+ 3.6700	11	2
26—41	1887, Jan. 28 Febr. 4	l r	2 55 4 30	— 6.1744 6.1706	6 5	— 31 — 28	— 6.1775 6.1734	— 6.1755	11	2
27—1	1887, Jan. 8 — 22 — 25 — 26 — 27 Febr. 17 1888, März 1 Novbr. 13 — 14 — 26 — 27	r r l r l l r l r r l	3 28 2 28 3 7 4 24 4 37 7 3 3 37 19 45 19 57 19 33 19 48	— 5.1110 5.1131 5.1020 5.1091 5.1045 5.1031 5.1087 5.1023 5.1151 5.1314 5.1071	5 5 6 6 5 6 6 7 7 5 5	— 8 — 5 — 1 — 4 — 3 — 15 — 1 — 22 — 29 — 23 — 20	— 5.1118 5.1136 5.1021 5.1095 5.1048 5.1046 5.1088 5.1045 5.1180 5.1337 5.1091	— 5.1110	63	13
27—30	1887, Jan. 8 — 22 — 25 — 28 — 28 Febr. 4 — 4 — 17 — 17 1888, März 1 — 7 Novbr. 13 — 14 — 26 — 27 Dec. 14	r r l l l r r l l r l r r l r	3 42 2 19 2 54 3 12 4 52 4 40 6 5 5 12 6 56 3 31 3 47 19 41 19 52 19 25 19 43 20 39	+ 4.8488 4.8551 4.8409 4.8427 4.8472 4.8410 4.8462 4.8409 4.8397 4.8464 4.8422 4.8463 4.8419 4.8390 4.8387 4.8401	7 5 7 5 6 5 5 5 5 7 6 6 6 5 5 5	+ 1 + 1 + 5 + 4 + 5 + 2 + 7 + 8 + 20 + 3 + 21 + 7 — 3 — 8 + 6 0	+ 4.8489 4.8552 4.8414 4.8431 4.8477 4.8412 4.8469 4.8417 4.8417 4.8467 4.8443 4.8470 4.8416 4.8382 4.8393 4.8401	+ 4.8441	90	18
27—31	1887, Jan. 28 — 28 Febr. 4 — 17 April 4	l l r l r	3 0 3 6 4 35 5 4 7 39	+ 4.0936 4.0847 4.0858 4.0857 4.0985	4 5 6 6 6	+ 8 + 19 + 18 + 22 + 40	+ 4.0944 4.0866 4.0876 4.0879 4.1025	+ 4.0918	27	5
27—32	1887, Jan. 28 Febr. 4	l r	3 20 4 50	+ 3.7977 3.7894	5 5	+ 11 + 8	+ 3.7988 3.7902	+ 3.7945	10	2
27—32 ^a	1887, Jan. 28 Febr. 4	l r	3 27 4 55	+ 3.1349 3.1448	5 5	+ 34 + 34	+ 3.1383 3.1482	+ 3.1433	10	2
27—32 ^b	1887, Jan. 28 Oct. 28	l r	3 34 21 42	+ 1.5920 1.5906	4 5	+ 26 — 4	+ 1.5946 1.5902	+ 1.5924	9	2
27—32 ^c	1888, Novbr. 11 1889, Febr. 13	r l	18 50 2 34	+ 1.5204 1.5345	5 4	+ 17 — 11	+ 1.5221 1.5334	+ 1.5277	9	2
27—35	1887, Febr. 7 — 24 April 20 Oct. 28 1888, März 16	r r l l r	3 57 5 32 9 30 18 42 4 36	+ 8.9774 8.9733 8.9655 8.9730 8.9890	5 5 7 5 6	+ 2 + 5 + 150 + 25 + 3	+ 8.9776 8.9738 8.9805 8.9755 8.9893	+ 8.9793	28	6
27—36	1887, Febr. 7 — 24	r l	3 49 3 22	+ 7.3056 7.3044	6 6	+ 17 + 6	+ 7.3073 7.3050	+ 7.3062	12	2

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta\delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta\delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
			^h ^m	^{rev}			^{rev}			
27-41	1887, Jan. 28	l	2 45	- 5.0031	5	- 8	- 5.0039	^{rev} - 5.0073	22	4
	— 28	l	4 58	5.0077	6	- 7	5.0084			
	Febr. 4	r	4 20	5.0066	5	- 6	5.0072			
	— 4	r	6 10	5.0085	6	- 12	5.0097			
27-44	1887, Febr. 4	r	5 2	+ 3.0978	5	+ 55	+ 3.1033	+ 3.1029	25	5
	— 5	r	4 37	3.1031	5	+ 55	3.1086			
	— 11	l	5 24	3.0870	4	+ 59	3.0929			
	— 11	l	6 24	3.0986	11	+ 63	3.1049 (2)			
27-45	1887, Febr. 25	r	2 48	- 7.2133	6	- 40	- 7.2173	- 7.2142	41	8
	— 28	r	2 22	7.2003	5	- 39	7.2042			
	April 21	l	8 3	7.2055	5	- 69	7.2124			
	— 22	l	7 54	7.2173	5	- 90	7.2263			
	1888, März 7	l	4 0	7.2075	9	- 40	7.2115 (2)			
	— 16	r	4 42	7.2125	5	- 33	7.2158			
	Dec. 14	r	20 43	7.2115	6	- 27	7.2142			
27-65	1887, Febr. 5	r	6 32	+ 1.6924	7	- 48	+ 1.6876	+ 1.6915	22	4
	— 12	l	5 22	1.6999	5	- 60	1.6939			
	— 17	l	4 18	1.7067	5	- 62	1.7005			
	April 4	r	7 46	1.6899	5	- 58	1.6841			
27-68	1887, Febr. 7	r	3 9	- 3.8896	5	- 85	- 3.8981	- 3.8858	10	2
	— 17	l	4 56	3.8639	5	- 96	3.8735			
28-1	1887, Jan. 26	r	3 48	+ 6.5545	5	+ 9	+ 6.5554	+ 6.5611	10	2
	— 27	l	4 2	6.5646	5	+ 21	6.5667			
28-29	1887, März 19	r	6 53	+ 0.3246	5	+ 19	+ 0.3265	+ 0.3200	10	2
	Oct. 23	l	19 9	0.3114	5	+ 20	0.3134			
28-41	1887, März 19	r	8 14	+ 6.6553	5	+ 51	+ 6.6604	+ 6.6574	10	2
	Oct. 23	l	19 21	6.6538	5	+ 5	6.6543			
28-45	1887, April 5	r	7 41	+ 4.4656	6	+ 9	+ 4.4665	+ 4.4563	11	2
	Novbr. 17	l	19 30	4.4450	5	+ 11	4.4461			
28-52	1887, Jan. 31	l	5 50	- 3.8685	5	- 25	- 3.8710	- 3.8723	10	2
	Febr. 4	r	3 20	3.8716	5	- 19	3.8735			
28-59	1887, März 19	r	7 9	- 4.9140	5	- 28	- 4.9168	- 4.9055	10	2
	Oct. 23	l	19 15	4.8934	5	- 8	4.8942			
29-1	1887, Jan. 26	r	3 54	+ 6.2511	5	+ 28	+ 6.2539	+ 6.2614	10	2
	— 27	l	4 7	6.2653	5	+ 36	6.2689			
29-41	1887, März 19	r	8 19	+ 6.3548	5	+ 70	+ 6.3618	+ 6.3644	10	2
	Oct. 23	l	19 27	6.3640	5	+ 29	6.3669			
29-45	1887, April 5	r	7 31	+ 4.1727	6	+ 6	+ 4.1733	+ 4.1612	11	2
	Novbr. 17	l	19 22	4.1470	5	+ 20	4.1490			
29-52	1887, Jan. 31	l	5 45	- 4.1645	5	- 57	- 4.1702	- 4.1758	10	2
	Febr. 4	r	3 25	4.1762	5	- 51	4.1813			
29-60	1887, Jan. 31	l	6 5	- 3.7026	7	- 7	- 3.7033	- 3.6950	12	2
	Febr. 4	r	3 40	3.6872	5	+ 5	3.6867			
30-1	1887, Febr. 24	r	7 25	- 9.9433	5	- 42	- 9.9475	- 9.9534	19	4
	April 5	l	8 17	9.9476	4	- 74	- 9.9550			
	— 20	l	7 57	9.9519	5	- 61	- 9.9580			
	Oct. 27	r	18 14	9.9498	5	- 31	- 9.9529			

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
30-31	1887, Febr. 17	l	h m 5 20	rev - 0.7631	5	+	7	rev - 0.7624	25	5
	— 28	r	7 45	0.7719	10	+	9	0.7710 (2)		
	März 4	r	7 6	0.7723	5	—	10	0.7733		
	Oct. 26	l	18 9	0.7482	5	+	12	0.7470		
30-32	1887, März 4	r	7 13	- 1.0472	5	+	2	- 1.0470	16	3
	Oct. 23	l	21 3	1.0576	5	—	7	1.0583		
	— 28	r	21 0	1.0470	6	—	5	1.0475		
30-32 ^a	1887, März 4	r	7 20	- 1.6922	5	+	11	- 1.6911	10	2
	Oct. 23	l	21 8	1.6892	5	+	14	1.6878		
30-32 ^b	1887, Dec. 2	r	21 30	- 3.2457	5	—	23	- 3.2480	9	2
	1888, März 8	l	4 59	3.2489	4	+	7	3.2482		
30-33	1887, Jan. 28	l	4 9	+ 4.9341	6	—	3	+ 4.9338	11	2
	Febr. 4	r	5 30	4.9316	5	+	5	4.9321		
30-34	1887, Jan. 28	l	3 55	+ 8.3811	3	+	5	+ 8.3816	15	3
	Febr. 24	r	5 50	8.3680	5	+	19	8.3699		
	April 21	l	10 10	8.3547	7	+	199	8.3746		
30-35	1887, Jan. 8	r	3 55	+ 4.1307	7	+	7	+ 4.1314	77	15
	— 22	r	2 12	4.1324	7	+	3	4.1327		
	— 25	l	2 43	4.1320	10	+	1	4.1321 (2)		
	— 28	l	3 48	4.1322	5	+	1	4.1323		
	Febr. 4	r	5 16	4.1376	5	+	4	4.1380		
	— 17	l	6 49	4.1293	5	+	8	4.1301		
	1888, März 1	r	3 25	4.1414	6	+	1	4.1415		
	— 7	l	3 37	4.1360	7	—	15	4.1345		
	Novbr. 13	l	19 37	4.1345	5	+	20	4.1365		
	— 14	r	19 47	4.1400	5	+	28	4.1428		
	— 26	r	19 20	4.1514	5	+	23	4.1537		
	— 27	l	19 38	4.1299	5	+	19	4.1318		
	Dec. 14	r	20 34	4.1403	5	+	24	4.1427		
30-36	1887, Jan. 28	l	3 42	+ 2.4578	5	—	19	+ 2.4559	10	2
	Febr. 4	r	5 9	2.4622	5	—	8	2.4614		
30-41	1887, Febr. 24	r	7 17	- 9.8359	7	—	46	- 9.8405	24	5
	April 20	l	8 7	9.8462	6	—	77	9.8539		
	— 21	l	7 49	9.8379	6	—	63	9.8442		
	Oct. 27	r	18 19	9.8414	5	—	25	9.8439		
30-44	1887, Febr. 25	r	2 40	- 1.7591	5	+	48	- 1.7543	21	4
	April 20	l	8 12	1.7608	6	+	48	1.7560		
	— 21	l	7 56	1.7464	5	+	50	1.7414		
	Novbr. 13	r	20 30	1.7505	5	+	14	1.7491		
30-65	1887, Febr. 24	r	6 40	- 3.1553	5	—	84	- 3.1637	23	5
	April 20	l	8 20	3.1498	7	—	118	3.1616		
	— 21	l	9 34	3.1465	6	—	147	3.1612		
	Oct. 28	r	18 54	3.1516	5	—	34	3.1550		
30-83	1887, März 4	r	3 7	+ 6.0518	4	+	42	+ 6.0560	10	2
	Novbr. 19	l	20 55	6.0556	6	+	25	6.0581		
31-35	1887, Jan. 28	l	4 37	+ 4.9039	5	—	14	+ 4.9025	11	2
	Febr. 4	r	5 55	4.9102	6	—	9	4.9093		
31-36	1887, Jan. 28	l	4 29	+ 3.2235	4	+	4	+ 3.2239	9	2
	Febr. 4	r	5 50	3.2180	5	+	10	3.2190		
33-34	1887, Febr. 28	r	6 30	+ 3.4332	6	+	10	+ 3.4342	13	3
	Oct. 26	l	18 14	3.4467	7	+	15	3.4482		

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
			^h ^m	^{rev}			^{rev}			
33-35	1887, Jan. 28	l	4 16	- 0.7906	5	0	- 0.7906	^{rev} - 0.7891	23	5
	Febr. 4	r	5 37	0.7910	5	+ 2	0.7908			
	— 28	r	3 30	0.7897	8	+ 1	0.7896 (2)			
	April 22	l	8 25	0.7834	5	- 13	0.7847			
34-35	1887, Jan. 8	r	4 4	- 4.2183	6	- 28	- 4.2211	- 4.2368	90	18
	— 22	r	2 6	4.2271	6	- 23	4.2294			
	— 22	r	5 22	4.2331	5	- 25	4.2356			
	— 25	l	2 29	4.2443	7	- 28	4.2471			
	— 28	l	4 2	4.2367	6	- 28	4.2395			
	Febr. 4	r	5 23	4.2380	5	- 25	4.2405			
	— 17	l	6 42	4.2523	5	- 39	4.2562			
	1888, Febr. 19	r	4 12	4.2377	5	- 18	4.2395			
	März 1	r	3 17	4.2414	9	- 11	4.2425 (2)			
	— 7	l	3 14	4.2401	6	- 28	4.2429			
	— 16	r	4 31	4.2352	5	- 15	4.2367			
	Novbr. 13	l	19 33	4.2361	4	- 30	4.2397			
	— 14	r	19 42	4.2308	5	- 13	4.2321			
	— 26	r	19 15	4.2165	6	- 13	4.2178			
	— 27	l	19 33	4.2283	5	- 33	4.2316			
	Dec. 14	r	20 30	4.2289	5	- 17	4.2306			
34-62	1887, Febr. 5	r	5 30	- 6.2003	6	- 108	- 6.2111	- 6.2134	12	2
	— 12	l	3 21	6.2044	6	- 113	6.2157			
34-63	1887, Febr. 5	r	5 7	- 2.4257	5	- 91	- 2.4348	- 2.4337	12	2
	— 12	l	3 30	2.4221	7	- 105	2.4326			
34-81	1887, Febr. 28	r	7 7	- 2.1613	6	0	- 2.1613	- 2.1665	16	3
	März 4	r	3 12	2.1715	5	+ 7	2.1708			
	Novbr. 26	l	20 20	2.1660	5	- 14	2.1674			
34-82	1887, Novbr. 26	l	20 25	- 2.0798	5	- 8	- 2.0806	- 2.0719	10	2
	Dec. 2	r	21 37	2.0625	5	- 6	2.0631			
34-83	1887, Febr. 28	r	6 32	- 2.3046	6	+ 20	- 2.3026	- 2.3143	11	2
	April 21	l	10 27	2.3239	5	- 22	2.3261			
34-84	1887, Febr. 28	r	6 48	+ 1.3528	5	+ 39	+ 1.3567	+ 1.3524	10	2
	Novbr. 26	l	20 14	1.3456	5	+ 25	1.3481			
34-85	1887, Febr. 28	r	6 53	+ 0.5553	5	+ 53	+ 0.5606	+ 0.5598	12	2
	Novbr. 26	l	19 59	0.5579	7	+ 11	0.5590			
34-86	1887, Febr. 28	r	7 9	- 0.6441	5	- 32	- 0.6473	- 0.6465	10	2
	Novbr. 26	l	20 42	0.6482	5	+ 25	0.6457			
34-87	1887, Febr. 28	r	6 37	- 0.3271	5	+ 76	- 0.3195	- 0.3215	10	2
	Novbr. 26	l	20 36	0.3238	5	+ 4	0.3234			
34-88	1887, Febr. 28	r	6 58	- 1.1424	5	+ 65	- 1.1359	- 1.1399	12	2
	Novbr. 26	l	20 7	1.1439	7	0	1.1439			
34-89	1887, Dec. 2	r	21 45	+ 0.6111	5	+ 4	+ 0.6115	+ 0.5984	10	2
	1888, März 8	l	4 38	0.5769	5	+ 84	0.5853			
34-90	1887, Novbr. 26	l	20 30	- 1.9604	5	+ 14	- 1.9590	- 1.9630	12	2
	1888, März 1	r	4 51	1.9732	7	+ 63	1.9669			
34-91	1887, Febr. 28	r	6 43	+ 2.0168	5	+ 138	+ 2.0306	+ 2.0344	12	2
	April 21	l	10 44	2.0165	7	+ 217	2.0382			
34-94	1887, Febr. 28	r	7 21	+ 1.8295	5	- 13	+ 1.8282	+ 1.8315	10	2
	Oct. 26	l	18 18	1.8358	5	- 10	1.8348			
34-105	1888, März 1	r	4 31	+ 7.3120	5	+ 47	+ 7.3167	+ 7.3195	11	2
	— 8	l	4 45	7.3144	6	+ 79	7.3223			

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
35--36	1887, Jan. 28 Febr. 4	<i>l</i> <i>r</i>	^{h m} 4 22 5 44	^{rev} - 1.6826 1.6898	6 5	+ 4 + 11	^{rev} - 1.6822 1.6887	^{rev} - 1.6854	11	2
35--44	1887, Febr. 28 April 20 — 21 Novbr. 13	<i>r</i> <i>l</i> <i>l</i> <i>r</i>	3 18 9 39 9 54 20 40	- 5.8833 5.8705 5.8888 5.8843	6 5 4 5	+ 61 - 31 - 52 + 3	- 5.8772 5.8736 5.8940 5.8840	- 5.8822	20	5
35--62	1887, Febr. 5 — 12	<i>r</i> <i>l</i>	5 19 3 15	- 1.9688 1.9729	6 5	- 80 - 85	- 1.9768 1.9814	- 1.9791	11	2
35--63	1887, Febr. 5 — 12	<i>r</i> <i>l</i>	4 55 3 40	+ 1.8097 1.8052	6 7	- 90 - 100	+ 1.8007 1.7952	+ 1.7979	13	3
35--65	1887, Febr. 7 — 17 April 20 Oct. 28	<i>r</i> <i>l</i> <i>l</i> <i>r</i>	3 25 4 25 8 29 18 48	- 7.2805 7.2787 7.2804 7.2878	6 5 6 5	- 58 - 68 - 143 - 43	- 7.2863 7.2855 7.2947 7.2921	- 7.2897	22	4
35--66	1887, Febr. 7 — 17	<i>r</i> <i>l</i>	3 17 4 40	- 6.5320 6.5390	5 6	- 47 - 63	+ 6.5367 6.5453	- 6.5410	11	2
35--81	1887, Febr. 28 Novbr. 17	<i>r</i> <i>l</i>	3 39 21 35	+ 2.0664 2.0830	5 5	+ 36 + 19	+ 2.0700 2.0849	+ 2.0775	10	2
35--82	1887, Febr. 28 Novbr. 17 — 29	<i>r</i> <i>l</i> <i>r</i>	3 44 21 40 21 30	+ 2.1519 2.1704 2.1766	6 6 7	+ 49 + 27 + 25	+ 2.1568 2.1731 2.1791	+ 2.1697	19	4
35--83	1887, Febr. 28 April 22 Novbr. 17 — 29	<i>r</i> <i>l</i> <i>l</i> <i>r</i>	3 50 8 32 21 45 21 15	+ 1.9178 1.9189 1.9294 1.9283	5 6 5 6	+ 43 + 71 + 5 + 7	+ 1.9221 1.9261 1.9299 1.9290	+ 1.9268	22	4
35--84	1887, Febr. 28 Novbr. 19 — 26 — 29	<i>r</i> <i>l</i> <i>l</i> <i>r</i>	3 55 20 40 19 51 21 5	+ 5.5648 5.5901 5.5848 5.5879	5 5 5 6	+ 24 + 13 + 50 + 32	+ 5.5672 5.5914 5.5898 5.5911	+ 5.5848	21	4
35--85	1887, Febr. 28 Novbr. 26	<i>r</i> <i>l</i>	4 0 20 46	+ 4.7921 4.8027	5 6	+ 54 + 9	+ 4.7975 4.8036	+ 4.8006	11	2
35--86	1887, Febr. 28 Novbr. 26	<i>r</i> <i>l</i>	4 5 20 51	+ 3.5724 3.5934	5 6	+ 59 + 15	+ 3.5783 3.5949	+ 3.5866	11	2
35--87	1887, Febr. 28 Novbr. 26	<i>r</i> <i>l</i>	4 10 20 56	+ 3.9121 3.9294	4 6	+ 96 + 20	+ 3.9217 3.9314	+ 3.9266	10	2
35--88	1887, März 4 April 22 Novbr. 16	<i>r</i> <i>l</i> <i>r</i>	3 24 8 45 19 7	+ 3.0889 3.0827 3.1046	5 4 5	+ 103 + 144 + 32	+ 3.0992 3.0971 3.1078	+ 3.1014	14	3
35--91	1887, März 4 April 22	<i>r</i> <i>l</i>	3 18 8 39	+ 6.2485 6.2441	6 6	+ 158 + 246	+ 6.2643 6.2687	+ 6.2665	12	2
35--94	1887, Febr. 28 Oct. 26	<i>r</i> <i>l</i>	7 28 18 22	+ 6.0410 6.0672	5 6	+ 32 + 29	+ 6.0442 6.0701	+ 6.0572	11	2
35--103	1888, Oct. 16 — 19	<i>r</i> <i>l</i>	20 11 21 17	+ 2.2598 2.2516	6 6	+ 16 + 34	+ 2.2614 2.2550	+ 2.2582	12	2
36--65	1887, Febr. 7 — 17	<i>r</i> <i>l</i>	3 33 4 32	- 5.6032 5.5885	5 5	- 23 - 38	- 5.6055 5.5923	- 5.5989	10	2
36--66	1887, Febr. 7 — 17	<i>r</i> <i>l</i>	3 41 4 48	- 4.8584 4.8519	5 5	- 34 - 42	- 4.8618 4.8561	- 4.8590	10	2

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta\delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta\delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
			^{h m}	^{rev}			^{rev}	^{rev}		
37-1	1887, März 19 Oct. 23	<i>r</i> <i>l</i>	7 15 19 32	+ 0.9554 0.9402	4 5	- 20 - 6	+ 0.9534 0.9396	- 0.9465	9	2
37-38	1887, März 19 Oct. 23	<i>r</i> <i>l</i>	7 21 19 38	+ 0.4788 0.4756	4 5	+ 5 + 8	+ 0.4793 0.4764	+ 0.4778	9	2
37-39	1887, März 19 Oct. 23	<i>r</i> <i>l</i>	7 27 19 42	+ 3.9178 3.9031	5 6	+ 22 + 4	+ 3.9200 3.9035	+ 3.9117	11	2
37-40	1887, März 19 Oct. 23	<i>r</i> <i>l</i>	7 33 19 46	+ 3.4191 3.4102	4 5	+ 35 + 24	+ 3.4226 3.4126	+ 3.4176	9	2
38-1	1887, Jan. 28 Febr. 5 März 4 April 6	<i>l</i> <i>r</i> <i>r</i> <i>l</i>	5 4 2 23 2 56 6 35	+ 0.4846 0.4906 0.4803 0.4855	5 6 5 6	- 22 - 12 - 16 - 30	+ 0.4824 0.4894 0.4787 0.4825	+ 0.4833	22	4
38-38 ^a	1887, Febr. 5 — 11 — 24	<i>r</i> <i>l</i> <i>l</i>	4 30 5 12 2 48	- 2.3795 2.3673 2.3720	5 5 5	- 24 - 12 - 10	- 2.3819 2.3685 2.3730	- 2.3745	15	3
38-38 ^b	1887, Febr. 11 Novbr. 16	<i>l</i> <i>r</i>	5 17 20 42	- 3.6659 3.6711	5 6	+ 12 - 1	- 3.6647 3.6712	- 3.6680	11	2
38-39	1887, März 4 Oct. 13	<i>r</i> <i>l</i>	7 35 21 10	+ 3.4308 3.4355	5 5	+ 36 + 13	+ 3.4344 3.4368	+ 3.4356	10	2
38-40	1888, Oct. 16 — 19 Novbr. 13	<i>r</i> <i>l</i> <i>l</i>	20 17 19 30 19 11	+ 2.9601 2.9561 2.9411	5 5 8	+ 6 + 5 + 25	+ 2.9607 2.9566 2.9436 (1½)	+ 2.9522	18	4
38-41	1887, Febr. 25 April 21 — 22 Oct. 28 Novbr. 13	<i>r</i> <i>l</i> <i>l</i> <i>r</i> <i>r</i>	2 25 8 50 7 59 18 20 20 50	+ 0.5861 0.5927 0.5973 0.5818 0.5873	8 5 5 5 5	- 41 - 51 - 56 - 7 - 7	+ 0.5820 (1½) 0.5876 0.5917 0.5811 0.5866	+ 0.5855	28	6
38-42	1887, Febr. 8 — 8	<i>r</i> <i>l</i>	3 40 5 17	+ 3.8779 3.8769	6 5	+ 13 + 18	+ 3.8792 3.8787	+ 3.8790	11	2
38-44	1887, Febr. 28 April 21 — 22 Novbr. 13	<i>r</i> <i>l</i> <i>l</i> <i>r</i>	7 34 8 57 8 19 20 45	+ 8.6684 8.6786 8.6737 8.6755	6 6 8 5	+ 50 + 109 + 70 + 5	+ 8.6734 8.6895 8.6807 (1½) 8.6760	+ 8.6800	25	5
38-45	1887, Febr. 28 April 21 — 22 Oct. 28	<i>r</i> <i>l</i> <i>l</i> <i>r</i>	2 56 9 5 8 4 18 12	- 1.6209 1.6209 1.6197 1.6300	5 7 6 5	- 46 - 87 - 76 + 1	- 1.6255 1.6296 1.6273 1.6299	- 1.6281	23	5
38-52	1887, Oct. 28 Novbr. 13 — 16 — 16 — 17	<i>r</i> <i>r</i> <i>r</i> <i>l</i> <i>l</i>	17 48 21 14 19 27 21 26 19 14	- 9.9690 9.9482 9.9624 9.9491 9.9632	5 5 5 4 5	- 50 - 32 - 35 - 32 - 37	- 9.9740 9.9514 9.9659 9.9523 9.9669	- 9.9621	24	5
38-75	1887, Febr. 8 — 8	<i>r</i> <i>l</i>	3 25 5 5	+ 5.5611 5.5637	6 7	+ 43 + 57	+ 5.5654 5.5694	+ 5.5674	13	3
38-76	1887, Febr. 8 — 8	<i>r</i> <i>l</i>	3 30 5 11	+ 3.5866 3.5879	5 5	+ 33 + 45	+ 3.5899 3.5924	+ 3.5912	10	2
38-77	1887, Febr. 8 — 8	<i>r</i> <i>l</i>	3 35 5 22	+ 1.8529 1.8533	6 5	+ 23 + 27	+ 1.8552 1.8560	+ 1.8556	11	2
38 ^a - 38 ^b	1887, Novbr. 16 — 28	<i>r</i> <i>l</i>	20 27 21 45	- 1.3034 1.3068	5 4	- 16 - 17	- 1.3050 1.3085	- 1.3067	9	2

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
39—I	1888, Oct. 16 — 19	r l	^{h m} 18 34 19 9	— ^{rev} 2.9569 2.9703	5 6	— 6 — 6	— ^{rev} 2.9575 2.9709	— ^{rev} 2.9642	11	2
39—40	1887, März 4 Oct. 13	r l	7 41 20 21	— 0.5012 0.5099	5 5	— 7 + 4	— 0.5019 0.5095	— 0.5057	10	2
39—42	1887, März 4 Oct. 13	r l	7 47 20 30	+ 0.4501 0.4382	6 6	+ 27 + 14	+ 0.4528 0.4396	+ 0.4462	12	2
39—43	1887, Jan. 28 Febr. 5	l r	5 34 2 53	+ 3.2287 3.2146	5 6	+ 40 + 33	+ 3.2327 3.2179	+ 3.2253	11	2
39—44	1887, Oct. 26 — 28	l r	18 50 21 57	+ 5.2414 5.2494	5 6	+ 36 + 30	+ 5.2450 5.2524	+ 5.2487	11	2
40—I	1888, Oct. 16 — 19	r l	18 29 19 2	— 2.4664 2.4700	4 5	— 27 + 9	— 2.4691 2.4691	— 2.4691	9	2
40—42	1887, März 4 Oct. 13	r l	7 58 20 40	+ 0.9472 0.9342	6 6	+ 28 0	+ 0.9500 0.9342	+ 0.9421	12	2
40—43	1887, März 4 Oct. 13	r l	7 52 20 49	+ 3.7360 3.7202	6 6	+ 23 — 1	+ 3.7383 3.7201	+ 3.7292	12	2
40—44	1887, März 4 Oct. 13 — 23 — 28 Novbr. 13	r l l r r	8 4 21 0 19 48 22 2 19 50	+ 5.7621 5.7507 5.7576 5.7224 5.7401	5 5 1 6 5	+ 50 — 1 0 — 2 — 4	+ 5.7671 5.7506 5.7576 ($\frac{1}{2}$) 5.7222 5.7397	+ 5.7463	22	4
41—I	1887, Jan. 26 — 27 April 6 Oct. 27	r l l r	4 0 4 12 6 39 7 37	— 0.1095 0.1089 0.1065 0.0974	5 5 6 5	+ 2 + 3 + 10 — 7	— 0.1093 0.1086 0.1055 0.0981	— 0.1054	21	4
41—44	1887, Febr. 25 April 21 — 29 Novbr. 16	r l l r	2 32 8 42 8 35 18 47	+ 8.1007 8.0802 8.0972 8.1238	6 6 8 5	+ 65 + 159 + 153 + 43	+ 8.1072 8.0961 8.1125 (2) 8.1281	+ 8.1113	25	5
41—45	1887, Jan. 31 Febr. 1 April 6 Oct. 27	l r l r	2 47 3 43 6 43 17 39	— 2.2106 2.2198 2.2149 2.2121	6 10 6 6	— 37 — 33 — 30 — 28	— 2.2143 2.2231 (2) 2.2179 2.2149	— 2.2187	28	6
41—46	1887, Jan. 31 Febr. 1	l r	2 59 3 55	— 3.5435 3.5418	5 6	— 26 — 15	— 3.5461 3.5433	— 3.5447	11	2
41—47	1887, Jan. 31 Febr. 1	l r	3 11 4 7	— 4.6486 4.6529	6 5	— 20 — 11	— 4.6506 4.6540	— 4.6523	11	2
41—52	1887, Oct. 23 — 26 — 28 Novbr. 13 — 16	l l r r r	18 32 18 4 17 32 20 55 19 12	— 10.5430 10.5414 10.5312 10.5396 10.5342	5 5 5 5 5	— 40 — 45 — 45 — 2 — 27	— 10.5470 10.5459 10.5357 10.5398 10.5369	— 10.5411	25	5
41—65	1887, Febr. 24 April 20 — 21 Oct. 28	r l l r	6 55 8 56 8 19 19 0	+ 6.6942 6.7139 6.6978 6.6930	8 5 5 5	— 37 + 8 — 17 + 2	+ 6.6905 (2) 6.7147 6.6961 6.6932	+ 6.6970	23	5
42—I	1888, Oct. 19 Novbr. 10	l r	19 20 18 12	— 3.4079 3.3903	5 5	+ 2 — 33	— 3.4077 3.3936	— 3.4007	10	2

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
42-43	1887, Febr. 8	r	^{h m} 3 50	^{rev} + 2.7742	5	— 14	^{rev} + 2.7728	+ 2.7799	10	2
		l	5 32	2.7885	5	— 16	2.7869			
42-44	1887, Oct. 26	l	19 0	+ 4.8057	6	— 3	+ 4.8054	+ 4.8058	12	2
	Novbr. 13	r	19 55	4.8064	6	— 3	4.8061			
42-75	1887, März 19	r	7 43	+ 1.7049	5	+ 25	+ 1.7074	+ 1.6847	11	2
	Oct. 23	l	21 23	1.6714	5	— 3	1.6711			
	— 26	l	18 27	1.6670	1	— 3	1.6667 ($\frac{1}{2}$)			
42-76	1887, März 19	r	7 50	— 0.2860	5	+ 4	— 0.2856	— 0.2874	10	2
	Oct. 23	l	21 13	0.2880	5	— 11	0.2891			
42-77	1887, März 19	r	7 58	— 2.0156	5	+ 1	— 2.0155	— 2.0143	11	2
	Oct. 23	l	21 18	2.0126	6	— 5	2.0131			
43-1	1888, Oct. 16	r	18 39	— 6.2181	5	— 40	— 6.2221	— 6.2058	18	4
	— 16	r	18 44	6.1959	5	— 39	6.1998			
	— 19	l	19 15	6.1931	8	— 25	6.1956			
43-44	1887, Jan. 28	l	5 55	+ 2.0199	5	— 2	+ 2.0197	+ 2.0257	11	2
	Febr. 5	r	3 20	2.0321	6	— 4	2.0317			
43-75	1887, Febr. 8	r	3 45	— 1.0802	5	+ 20	— 1.0782	— 1.0867	10	2
	— 8	l	5 27	1.0977	5	+ 26	1.0951			
43-76	1887, Febr. 8	r	3 55	— 3.0718	7	+ 13	— 3.0705	— 3.0776	12	2
	— 8	l	5 38	3.0859	5	+ 11	3.0848			
43-77	1887, Febr. 8	r	4 0	— 4.8116	5	+ 25	— 4.8091	— 4.8095	12	2
	— 8	l	5 44	4.8124	7	+ 25	4.8099			
44-1	1887, Febr. 25	r	2 17	— 8.1971	9	— 51	— 8.2022 (2)	— 8.2039	28	6
	März 4	r	3 2	8.2023	5	— 52	8.2075			
	April 21	l	7 24	8.1871	5	— 96	8.1967			
	— 29	l	8 50	8.1918	9	— 157	8.2075 (2)			
44-83	1887, Febr. 28	r	4 34	+ 7.8077	5	— 12	+ 7.8065	+ 7.8101	12	2
	April 22	l	8 55	7.8062	7	+ 75	7.8137			
44-88	1887, März 4	r	4 50	+ 8.9673	5	+ 16	+ 8.9689	+ 8.9692	10	2
	Novbr. 28	l	20 40	8.9670	5	+ 24	8.9694			
45-1	1887, Jan. 31	l	2 53	+ 2.1085	6	+ 43	+ 2.1128	+ 2.1099	29	6
	Febr. 1	r	3 49	2.1105	5	+ 42	2.1147			
	April 6	l	6 50	2.0977	7	+ 60	2.1037			
	— 20	l	7 45	2.1025	5	+ 68	2.1093			
	Oct. 13	l	19 46	2.0919	1	+ 23	2.0942 ($\frac{1}{2}$)			
	— 27	r	17 44	2.1144	5	+ 26	2.1170			
45-46	1887, Jan. 31	l	3 45	— 1.3445	6	— 24	— 1.3469	— 1.3300	33	7
	Febr. 1	r	4 53	1.3173	5	— 17	1.3190			
	— 4	r	2 50	1.3176	5	— 17	1.3193			
	— 11	l	4 40	1.3213	5	+ 4	1.3209			
	— 11	l	5 55	1.3368	6	— 25	1.3393			
	Oct. 28	r	20 2	1.3327	6	— 16	1.3343			
45-47	1887, Jan. 31	l	3 50	— 2.4571	6	— 19	— 2.4590	— 2.4531	11	2
	Febr. 1	r	4 49	2.4461	5	— 10	2.4471			
45-48	1887, Jan. 31	l	3 40	— 2.8883	5	— 8	— 2.8891	— 2.8844	10	2
	Febr. 1	r	4 37	2.8790	5	— 7	2.8797			
45-49	1887, Jan. 31	l	3 24	— 0.4638	6	— 21	— 0.4659	— 0.4658	12	2
	Febr. 1	r	4 19	0.4648	6	— 9	0.4657			

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
45-50	1887, Jan. 31 Febr. 1	l r	$h \ m$ 3 34 4 31	rev - 1.4450 1.4393	8 6	- 29 - 18	rev - 1.4479 1.4411	rev - 1.4445	14	3
45-52	1887, Jan. 31 Febr. 1 April 21 Oct. 28 1888, März 7 — 16 Dec. 14	l r l r l r r	4 0 5 1 8 34 17 52 4 10 4 48 20 47	- 8.3373 8.3299 8.3262 8.3322 8.3338 8.3344 8.3237	6 5 5 5 8 5 5	- 38 - 33 - 121 - 47 - 47 - 19 - 22	- 8.3411 8.3332 8.3383 8.3369 (2) 8.3385 8.3363 8.3259	- 8.3361	39	8
45-54	1888, Oct. 16 — 19	r l	20 23 19 47	- 8.3300 8.3313	6 5	- 50 - 23	- 8.3350 8.3336	- 8.3343	11	2
45-65	1887, Febr. 28 April 20 — 21 Oct. 28	r l l r	3 6 8 44 8 27 19 12	+ 8.9136 8.9062 8.9045 8.9116	5 5 5 6	- 29 + 59 + 43 + 14	+ 8.9107 8.9121 8.9088 8.9130	+ 8.9112	21	4
45-70	1887, Novbr. 19 Dec. 2	l r	20 25 22 10	- 6.8453 6.8426	5 7	- 14 - 14	- 6.8467 6.8440	- 6.8453	12	2
46-1	1887, Jan. 31 Febr. 1	l r	3 5 4 1	+ 3.4463 3.4502	5 6	+ 49 + 38	+ 3.4512 3.4540	+ 3.4526	11	2
46-47	1887, Jan. 31 Febr. 1 — 4 — 11 — 11 Oct. 28	l r r l l r	3 55 4 55 2 40 4 35 6 5 20 7	- 1.1325 1.1036 1.1234 1.1111 1.1215 1.1114	6 5 5 5 5 5	- 17 - 13 - 14 + 6 - 18 - 14	- 1.1342 1.1049 1.1248 1.1105 1.1233 1.1128	- 1.1184	31	6
47-1	1887, Jan. 31 Febr. 1	l r	3 16 4 13	+ 4.5521 4.5562	6 5	+ 43 + 32	+ 4.5564 4.5594	+ 4.5579	11	2
47-48	1887, März 19 Oct. 26	r l	8 46 21 24	- 0.4379 0.4264	5 5	- 18 - 12	- 0.4397 0.4276	- 0.4337	10	2
47-49	1887, März 19 Oct. 23 — 26	r l l	8 34 21 48 21 11	+ 1.9632 1.9902 1.9788	6 5 5	+ 14 + 5 + 3	+ 1.9646 1.9907 1.9791	+ 1.9781	16	3
47-51	1887, April 5 Oct. 26	r l	6 10 21 57	- 4.0457 4.0643	6 4	- 15 - 20	- 4.0472 4.0663	- 4.0568	10	2
48-1	1888, Oct. 16 — 19	r l	18 54 19 35	+ 4.9939 4.9895	6 5	+ 14 + 13	+ 4.9953 4.9908	+ 4.9931	11	2
48-49	1887, März 19 Oct. 26	r l	8 38 21 19	+ 2.3951 2.4005	4 6	+ 40 + 19	+ 2.3991 2.4024	+ 2.4008	10	2
48-50	1887, März 19 Oct. 23	r l	8 24 21 30	+ 1.4268 1.4572	4 5	+ 26 + 4	+ 1.4294 1.4576	+ 1.4435	9	2
48-51	1887, Febr. 17 April 4	l r	6 0 7 53	- 3.6268 3.6171	6 5	+ 16 - 7	- 3.6252 3.6178	- 3.6215	11	2
48-52	1887, Febr. 7 — 24	r l	4 27 3 45	- 5.4452 5.4486	6 10	- 12 + 32	- 5.4464 5.4454 (2)	- 5.4457	16	3
48-54	1888, Oct. 16 — 19	r l	20 28 19 40	- 5.4593 5.4514	5 7	- 36 - 3	- 5.4629 5.4517	- 5.4573	12	2
48-70	1887, Febr. 7 — 17	r l	4 13 5 54	- 3.9570 3.9592	5 6	- 36 - 43	- 3.9606 3.9635	- 3.9621	11	2

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
			^h ^m	^{rev}			^{rev}	^{rev}		
49-1	1887, Jan. 31	l	3 29	+ 2.5742	7	+ 42	+ 2.5784	+ 2.5768	13	3
	Febr. 1	r	4 25	2.5720	6	+ 32	2.5752			
49-49 ^a	1889, Febr. 13	l	2 42	+ 1.2310	7	+ 7	+ 1.2317	+ 1.2248	12	2
	— 13	r	2 49	1.2153	5	+ 25	1.2178			
49-50	1887, März 19	r	8 29	— 0.9958	4	— 17	— 0.9975	— 0.9715	14	3
	Oct. 23	l	21 38	0.9456	5	+ 1	0.9455			
	— 28	r	20 54	0.9712	5	— 3	0.9715			
49-70	1887, März 19	r	8 54	— 6.3669	6	— 147	— 6.3816	— 6.3810	15	3
	Novbr. 19	l	20 18	6.3769	9	— 38	6.3807 (2)			
49-95	1887, Oct. 19	l	19 51	+ 3.8603	5	+ 6	+ 3.8609	+ 3.8749	17	3
	Novbr. 10	r	18 27	3.8873	6	+ 4	3.8877			
	— 13	l	19 18	3.8760	6	+ 1	3.8761			
51-52	1887, Jan. 31	l	4 18	— 1.8459	5	+ 8	— 1.8451	— 1.8311	10	2
	Febr. 1	r	5 19	1.8183	5	+ 12	1.8171			
51-53	1887, April 5	r	6 1	— 2.2420	6	— 21	— 2.2441	— 2.2468	12	2
	Oct. 26	l	21 32	2.2472	6	— 22	2.2494			
51-54	1887, April 4	r	7 33	— 1.8437	7	— 9	— 1.8446	— 1.8340	14	3
	Oct. 26	l	21 45	1.8241	7	+ 7	1.8234			
51-59	1887, Oct. 26	l	18 42	— 2.8753	6	+ 4	— 2.8749	— 2.8770	11	2
	— 28	r	19 57	2.8796	5	+ 4	2.8792			
52-1	1887, Oct. 13	l	20 5	+ 10.4337	5	+ 50	+ 10.4387	+ 10.4362	27	5
	— 23	l	18 27	10.4297	6	+ 53	10.4350			
	— 28	r	17 38	10.4308	5	+ 55	10.4363			
	Novbr. 13	r	21 0	10.4284	5	+ 11	10.4295			
	— 16	r	19 17	10.4374	6	+ 39	10.4413			
52-53	1887, Jan. 31	l	4 11	— 0.3974	6	— 2	— 0.3976	— 0.4018	11	2
	Febr. 1	r	5 13	0.4048	5	— 12	0.4060			
52-55	1887, Jan. 31	l	4 32	— 3.2413	5	— 18	— 3.2431	— 3.2421	10	2
	Febr. 1	r	5 31	3.2386	5	— 24	3.2410			
52-55 ^a	1887, Oct. 26	l	22 0	— 2.7754	5	+ 9	— 2.7745	— 2.7740	10	2
	— 28	r	20 50	2.7740	5	+ 6	2.7734			
52-56	1887, Jan. 31	l	4 50	— 4.1369	5	— 31	— 4.1400	— 4.1438	23	5
	Febr. 4	r	2 45	4.1372	5	— 27	4.1399			
	April 4	r	8 33	4.1437	6	— 71	4.1508			
	Oct. 26	l	20 7	4.1416	7	— 27	4.1443			
52-57	1887, Jan. 8	r	2 47	— 4.7001	6	+ 15	— 4.6986	— 4.6970	74	15
	— 22	r	2 56	4.7110	5	— 21	4.7131			
	— 22	r	5 12	4.6995	5	+ 15	4.6980			
	— 25	l	3 37	4.6985	6	+ 25	4.6960			
	— 31	l	5 7	4.6997	5	+ 24	4.6973			
	Febr. 1	r	5 49	4.6946	5	+ 14	4.6932			
	— 17	l	7 24	4.6997	5	+ 7	4.6990			
	1888, März 8	l	5 9	4.7001	5	+ 31	4.6970			
	— 16	r	4 53	4.7023	6	+ 9	4.7014			
	Novbr. 13	l	19 58	4.6807	5	+ 13	4.6794			
	— 14	r	20 13	4.7005	6	— 18	4.7023			
	— 26	r	19 50	4.6936	5	— 8	4.6944			
	— 27	l	20 3	4.6943	5	+ 13	4.6930			
	Dec. 14	r	20 51	4.6945	5	— 14	4.6959			
52-58	1887, Jan. 31	l	5 15	— 4.8123	5	+ 20	— 4.8103	— 4.8233	10	2
	Febr. 1	r	5 55	4.8374	5	+ 12	4.8362			

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
52-59	1887, Jan. 31 Febr. 4	l r	$h \ m$ 5 30 3 0	rev - 1.0495 1.0322	5 5	+ 9 + 12	rev - 1.0486 1.0310	rev - 1.0398	10	2
52-60	1887, Jan. 31 Febr. 4	l r	5 35 3 5	+ 0.4789 0.4796	5 5	+ 30 + 19	+ 0.4819 0.4815	+ 0.4817	10	2
52-61	1887, Febr. 4 — 11 — 11 April 4	r l l r	2 55 4 46 4 57 8 51	- 2.9616 2.9661 2.9711 2.9647	5 5 5 6	- 17 - 26 - 20 - 57	- 2.9633 2.9687 2.9731 2.9704	- 2.9689	21	4
52-70	1887, Febr. 7 — 17	r l	4 5 5 47	+ 1.4874 1.4903	7 6	- 33 - 46	+ 1.4841 1.4857	+ 1.4849	13	3
52-96	1887, Oct. 26 — 28	l r	18 34 19 46	- 6.0367 6.0271	6 6	- 26 - 19	- 6.0393 6.0290	- 6.0342	12	2
52-97	1889, Febr. 13 — 13	r l	1 42 2 21	- 6.1229 6.1021	5 5	- 17 - 21	- 6.1246 6.1042	- 6.1144	10	2
53-54	1887, Jan. 31 Febr. 1	l r	4 25 5 25	+ 0.4089 0.4145	6 5	- 9 + 1	+ 0.4080 0.4146	+ 0.4113	11	2
53-57	1887, April 5 Oct. 26 1888, März 1	r l r	6 7 20 12 4 0	- 4.3035 4.2934 4.3052	6 5 6	- 16 - 26 - 23	- 4.3051 4.2960 4.3075	- 4.3029	17	3
53-59	1887, Oct. 26 — 28	l r	19 11 19 52	- 0.6418 0.6410	9 6	+ 15 + 9	- 0.6403 0.6401	- 0.6402	15	3
54-56	1887, Jan. 31 Febr. 1 April 4 Oct. 26	l r r l	4 59 5 43 8 43 20 2	- 4.1441 4.1589 4.1438 4.1550	5 6 4 8	- 19 - 25 - 61 - 26	- 4.1460 4.1614 4.1499 4.1576 (2)	- 4.1545	23	5
54-57	1889, Febr. 13 — 13	r l	2 3 2 27	- 4.6945 4.7135	5 6	+ 31 + 3	- 4.6914 4.7132	- 4.7023	11	2
54-61	1887, April 5 Oct. 26	r l	7 1 20 55	- 2.9773 2.9725	5 6	- 19 - 7	- 2.9792 2.9732	- 2.9762	11	2
55-55 ^a	1887, Oct. 26 — 28	l r	22 4 20 46	+ 0.4808 0.4988	5 5	+ 5 + 6	+ 0.4813 0.4994	+ 0.4904	10	2
55-56	1887, April 5 Oct. 26	r l	6 17 20 20	- 0.8844 0.8806	7 5	- 9 + 6	- 0.8853 0.8800	- 0.8827	12	2
55-57	1887, April 5 Oct. 26	r l	6 24 20 34	- 1.4438 1.4510	6 5	+ 1 - 4	- 1.4437 1.4514	- 1.4475	11	2
55-58	1887, April 5 Oct. 26	r l	6 30 20 39	- 1.5673 1.5772	7 5	+ 10 + 8	- 1.5663 1.5764	- 1.5713	12	2
55-71	1887, April 5 Novbr. 17	r l	7 13 19 39	- 8.0014 8.0078	7 5	- 29 - 22	- 8.0043 8.0100	- 8.0071	12	2
56-61	1887, April 5 Oct. 26	r l	6 51 20 47	+ 1.1734 1.1868	5 8	+ 12 + 17	+ 1.1746 1.1885 (2)	+ 1.1839	13	3
56-96	1887, Oct. 28 Novbr. 28	r l	20 17 20 55	- 1.8991 1.9036	7 5	+ 3 + 6	- 1.8988 1.9030	- 1.9009	12	2
56-97	1887, Oct. 28 Novbr. 28	r l	20 42 21 4	- 1.9982 1.9836	5 5	- 2 - 2	- 1.9984 1.9838	- 1.9911	10	2

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
56-98	1887, Oct. 28	r	^h 20 ^m 22	— 0.7192	5	+ 16	— 0.7176	— 0.7247	10	2
	Novbr. 28	l	21 30	0.7330	5	+ 13	0.7317			
57-58	1887, Jan. 31	l	5 23	— 0.1347	5	— 16	— 0.1363	— 0.1371	9	2
	Febr. 1	r	6 1	0.1365	4	— 14	0.1379			
57-59	1887, Jan. 31	l	6 15	+ 3.6746	7	+ 3	+ 3.6749	+ 3.6703	12	2
	Febr. 4	r	3 50	3.6666	5	— 10	3.6656			
57-60	1887, Jan. 31	l	6 0	+ 5.1753	5	+ 38	+ 5.1791	+ 5.1810	10	2
	Febr. 4	r	3 35	5.1800	5	+ 28	5.1828			
57-71	1887, Jan. 8	r	2 56	— 6.5709	7	— 13	— 6.5722	— 6.5673	92	18
	— 22	r	3 3	6.5649	6	— 2	6.5651			
	— 22	r	5 18	6.5641	5	— 17	6.5658			
	— 25	l	3 44	6.5615	6	— 15	6.5630			
	Febr. 7	r	4 35	6.5610	5	— 4	6.5614			
	— 8	l	5 50	6.5681	6	— 21	6.5702			
	— 11	l	4 29	6.5736	6	— 15	6.5751			
	— 17	l	7 32	6.5602	5	— 48	6.5650			
	1888, März 1	r	4 8	6.5613	6	— 31	6.5644			
	— 8	l	5 15	6.5609	6	+ 8	6.5601			
	— 16	r	4 58	6.5590	5	— 29	6.5619			
	Novbr. 13	l	20 3	6.5564	6	+ 7	6.5557			
	— 14	r	20 19	6.5681	7	— 36	6.5717			
	— 26	r	19 55	6.5838	6	— 21	6.5859			
	— 27	l	20 8	6.5701	5	+ 8	6.5693			
	Dec. 14	r	21 55	6.5673	5	— 32	6.5705			
57-72	1887, Febr. 11	l	4 10	— 4.5489	5	+ 46	— 4.5443	— 4.5406	15	3
	— 24	r	6 0	4.5388	5	+ 33	4.5355			
	Novbr. 13	r	19 5	4.5411	5	— 8	4.5419			
57-80	1887, Febr. 7	r	5 9	— 1.4265	2	+ 9	— 1.4256 ($\frac{1}{2}$)	— 1.4215	18	4
	— 8	r	3 20	1.4229	6	+ 9	1.4220			
	— 11	l	4 23	1.4251	5	+ 23	1.4228			
	— 24	l	3 15	1.4203	5	+ 25	1.4178			
57-96	1887, Oct. 28	r	20 12	— 1.3302	6	— 12	— 1.3314	— 1.3315	11	2
	Novbr. 19	l	20 10	1.3293	5	— 24	1.3317			
57-97	1887, Oct. 28	r	20 37	— 1.3930	5	— 13	— 1.3943	— 1.3945	10	2
	Novbr. 28	l	21 25	1.3924	5	— 22	1.3946			
58-78	1887, Novbr. 13	r	19 39	— 5.7035	5	+ 1	— 5.7034	— 5.6995	10	2
	— 28	l	21 14	5.6912	5	— 43	5.6955			
59-60	1887, Jan. 31	l	5 40	+ 1.5110	6	+ 14	+ 1.5124	+ 1.5133	11	2
	Febr. 4	r	3 10	1.5142	5	0	1.5142			
61-70	1887, März 19	r	9 0	+ 4.4514	5	+ 46	+ 4.4560	+ 4.4510	11	2
	Oct. 26	l	21 2	4.4448	6	+ 12	4.4460			
61-98	1887, Oct. 28	r	20 32	— 1.9186	5	+ 4	— 1.9182	— 1.9200	10	2
	Novbr. 28	l	20 48	1.9222	5	+ 4	1.9218			
62-63	1887, Jan. 8	r	1 36	+ 3.7856	5	— 6	+ 3.7850	+ 3.7756	28	6
	Febr. 5	r	4 44	3.7758	8	— 10	3.7748 (2)			
	— 11	l	6 34	3.7718	10	— 9	3.7709 (2)			
	— 12	l	3 50	3.7785	5	— 16	3.7769			
62-64	1887, Febr. 5	r	5 37	— 6.4806	7	— 19	— 6.4825	— 6.4760	12	2
	— 11	l	6 40	6.4677	5	— 17	6.4694			

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta\delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta\delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
62-65	1887, Febr. 5 — 11	r l	^{h m} 5 44 6 46	^{rev} - 5.3079 5.3147	6 6	+ 14 + 17	^{rev} - 5.3065 5.3130	^{rev} - 5.3098	12	2
62-66	1887, Febr. 5 — 11	r l	5 50 6 52	- 4.5632 4.5629	7 5	+ 24 + 28	- 4.5608 4.5601	- 4.5605	12	2
62-69	1887, Febr. 7 — 12 — 17 April 4	r l l r	2 45 5 19 4 11 8 13	- 7.1952 7.1891 7.1915 7.1869	5 3 5 6	- 35 - 43 - 41 - 93	- 7.1987 7.1934 7.1956 7.1962	- 7.1960	19	4
62-104	1887, Novbr. 17 — 29	l r	21 26 20 40	+ 2.6308 2.6209	6 6	- 11 - 3	+ 2.6297 2.6206	+ 2.6252	12	2
63-102	1888, Oct. 16 — 19	r l	19 51 20 46	- 0.8521 0.8513	5 5	+ 9 + 3	- 0.8512 0.8510	- 0.8511	10	2
63-104	1887, Novbr. 17 — 29	l r	21 21 20 46	- 1.1464 1.1368	5 6	- 19 - 17	- 1.1483 1.1385	- 1.1434	11	2
64-65	1887, Febr. 5 — 12	r l	6 4 4 15	+ 1.1543 1.1546	6 8	+ 59 + 61	+ 1.1602 1.1607	+ 1.1605	14	3
64-66	1887, Febr. 5 — 12 — 12 — 28 April 4	r l l r r	5 57 4 0 4 25 8 15 8 23	+ 1.9008 1.8942 1.8913 1.9090 1.9046	6 9 6 5 7	+ 27 + 26 + 27 + 47 + 51	+ 1.9035 1.8968 (2) 1.8940 1.9137 1.9097	+ 1.9024	33	7
64-68	1887, Febr. 5 — 12	r l	6 25 4 55	- 4.4295 4.4223	5 5	- 20 - 27	- 4.4315 4.4250	- 4.4283	10	2
64-69	1887, Febr. 7 — 17	r l	2 37 4 5	- 0.7299 0.7231	7 5	+ 5 - 3	- 0.7294 0.7234	- 0.7264	12	2
64-106	1888, Dec. 14 — 21	r l	21 10 22 20	- 0.5501 0.5507	5 5	- 19 + 24	- 0.5520 0.5483	- 0.5502	10	2
64-107	1888, Dec. 14 — 21	r l	21 15 22 25	- 1.8543 1.8484	5 5	+ 2 - 2	- 1.8541 1.8486	- 1.8514	10	2
65-1	1887, Febr. 24 April 20 — 21 Oct. 28	r l l r	7 10 8 50 8 11 19 6	- 6.8019 6.7993 6.7986 6.7953	7 6 7 6	+ 49 + 14 + 40 + 3	- 6.7970 6.7979 6.7946 6.7950	- 6.7961	26	5
65-66	1887, Febr. 5 — 12 — 24	r l r	6 11 4 45 5 40	+ 0.7498 0.7497 0.7485	9 5 5	- 24 - 29 - 26	+ 0.7474 (2) 0.7468 0.7459	+ 0.7469	19	4
65-67	1887, Novbr. 13 — 17	r l	20 20 20 41	- 0.7357 0.7354	5 5	+ 16 + 10	- 0.7341 0.7344	- 0.7343	10	2
65-67 ^a	1887, Novbr. 16 — 17	r l	20 37 20 45	- 1.7885 1.7766	4 5	+ 12 + 9	- 1.7873 1.7757	- 1.7815	9	2
65-68	1887, Febr. 7 — 12	r l	2 53 5 15	- 5.5820 5.5754	5 7	- 44 - 60	- 5.5864 5.5814	- 5.5839	12	2
65-95	1887, Febr. 28 Novbr. 17	r l	8 1 21 30	- 5.5102 5.5206	5 6	- 48 - 8	- 5.5150 5.5214	- 5.5182	11	2
65-99	1888, Oct. 16 — 19	r l	19 55 20 50	+ 1.5567 1.5573	5 5	- 15 + 19	+ 1.5552 1.5592	+ 1.5572	10	2
65-100	1887, Novbr. 17 Dec. 2	l r	20 57 22 0	+ 5.9046 5.9104	5 7	+ 4 + 6	+ 5.9050 5.9110	+ 5.9080	12	2

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
66-67	1887, Febr. 5 — 12 — 17 — 28	r l l r	^{h m} 6 18 4 35 3 46 8 9	^{rev} — 1.4881 1.4767 1.4844 1.4750	5 5 5 8	— 9 + 5 + 31 — 18	^{rev} — 1.4890 1.4762 1.4813 1.4768 (2)	^{rev} — 1.4800	23	5
66-67 ^a	1887, Febr. 17 — 28	l r	3 52 7 52	— 2.5486 2.5443	5 5	+ 29 — 14	— 2.5457 2.5457	— 2.5457	10	2
66-68	1887, Febr. 7 — 12	r l	3 1 5 5	— 6.3215 6.3231	6 7	— 56 — 68	— 6.3271 6.3299	— 6.3285	13	3
66-99	1887, Novbr. 17 Dec. 2	l r	20 53 21 50	+ 0.8072 0.8017	4 5	— 10 — 13	+ 0.8062 0.8004	+ 0.8033	9	2
66-100	1887, Novbr. 17 — 29 Dec. 2	l r r	20 49 20 55 21 55	+ 5.1490 5.1803 5.1645	5 6 6	+ 29 + 27 + 27	+ 5.1519 5.1830 5.1672	+ 5.1674	17	3
67-67 ^a	1888, Oct. 16 — 19	r l	19 59 20 56	— 1.0406 1.0571	6 5	— 7 — 9	— 1.0413 1.0580	— 1.0497	11	2
68-69	1887, Febr. 7 — 17	r l	2 30 3 59	— 3.7118 3.6974	5 5	+ 16 + 16	— 3.7102 3.6958	— 3.7030	10	2
68-70	1887, Febr. 7 — 17	r l	4 21 5 40	— 10.1786 10.1815	6 6	— 5 — 6	— 10.1791 10.1821	— 10.1806	12	2
71-72	1887, Febr. 7 — 8 — 11	r l l	4 44 5 55 3 12	+ 2.0065 2.0213 2.0181	6 2 5	+ 49 + 53 + 52	+ 2.0114 2.0266 ($\frac{1}{2}$) 2.0233	+ 2.0192	13	3
71-73	1887, Febr. 7 — 11 — 13	r l r	5 1 3 24 19 10	— 1.6474 1.6585 1.6585	5 6 5	+ 7 — 2 + 12	— 1.6467 1.6587 1.6573	— 1.6542	16	3
71-74	1887, Jan. 8 — 22 — 25 Febr. 7 — 11 — 17 1888, März 1 — 8 — 16 Novbr. 13 — 14 — 26 — 27 Dec. 14	r r l r l l r l r r l r l r	3 10 3 12 3 54 4 53 3 17 7 39 4 13 5 22 5 7 20 10 20 25 20 0 20 14 21 0	— 5.0079 4.9901 4.9980 4.9974 4.9959 4.9880 4.9938 4.9864 4.9905 4.9871 4.9908 4.9938 4.9849 4.9901	6 5 5 5 5 6 7 6 5 5 6 5 5 5	+ 32 + 42 + 43 + 47 + 52 + 28 + 45 + 46 + 50 — 18 — 19 — 9 — 15 — 10	— 5.0047 4.9859 4.9937 4.9927 4.9907 4.9852 4.9893 4.9818 4.9855 4.9889 4.9927 4.9947 4.9864 4.9911	— 4.9902	76	15
71-78	1887, Febr. 11 Novbr. 13	l r	4 3 19 15	+ 0.7417 0.7521	5 5	— 25 — 12	+ 0.7392 0.7509	+ 0.7451	10	2
71-79	1887, Febr. 11 Novbr. 13	l r	3 30 19 21	— 5.1683 5.1607	5 5	— 40 — 29	— 5.1723 5.1636	— 5.1680	10	2
71-80	1887, Febr. 11 — 24	l r	3 43 6 10	+ 5.1426 5.1387	6 5	+ 52 + 58	+ 5.1478 5.1445	+ 5.1462	11	2
72-74	1887, Febr. 11 — 24	l r	3 36 6 18	— 7.0027 7.0013	5 5	0 — 9	— 7.0027 7.0022	— 7.0025	10	2
72-80	1887, Febr. 11 — 24	l r	4 17 6 25	+ 3.1171 3.1176	5 8	— 2 + 3	+ 3.1169 3.1179 (2)	+ 3.1176	13	3

Beob. Differenz	Datum	Lage der Scharbe	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
73-78	1887, Febr. 11 Novbr. 13	l r	$h \ m$ 3 56 19 33	rev + 2.4008 2.4049	6 6	+ 22 + 11	rev + 2.4030 2.4060	rev + 2.4045	12	2
73-79	1887, Febr. 11 Novbr. 13	l r	3 50 19 27	- 3.5133 3.5075	5 5	- 18 - 4	- 3.5151 3.5079	- 3.5115	10	2
75-1	1888, Oct. 16 — 19	r l	18 49 19 25	- 5.1030 5.1127	6 5	- 24 - 19	- 5.1054 5.1146	- 5.1100	11	2
78-79	1887, Novbr. 13 — 28	r l	19 45 21 20	- 5.8955 5.8957	5 6	- 7 - 7	- 5.8962 5.8964	- 5.8963	11	2
81-84	1887, März 4 Novbr. 26	r l	3 39 21 56	+ 3.5005 3.5020	5 6	+ 11 + 5	+ 3.5016 3.5025	+ 3.5021	11	2
82-84	1887, März 4 Novbr. 26	r l	3 44 21 39	+ 3.4121 3.4193	5 6	+ 11 + 10	+ 3.4132 3.4203	+ 3.4168	11	2
83-84	1887, März 4 Novbr. 26	r l	3 40 21 46	+ 3.6589 3.6600	5 6	- 28 - 12	+ 3.6561 3.6588	+ 3.6575	11	2
83-85	1887, März 4 Novbr. 26	r l	3 54 21 12	+ 2.8715 2.8694	6 7	+ 6 - 1	+ 2.8721 2.8693	+ 2.8707	13	3
83-86	1887, März 4 Novbr. 26	r l	3 58 21 17	+ 1.6695 1.6594	6 5	+ 1 - 3	+ 1.6696 1.6591	+ 1.6644	11	2
83-87	1887, Febr. 28 Novbr. 26	r l	4 19 21 4	+ 1.9905 1.9982	5 5	+ 52 + 13	+ 1.9957 1.9995	+ 1.9976	10	2
83-88	1887, Febr. 28 Novbr. 26	r l	4 17 21 0	+ 1.1595 1.1760	6 5	+ 51 + 26	+ 1.1646 1.1786	+ 1.1716	11	2
83-89	1887, Febr. 28 Novbr. 26	r l	4 22 21 22	+ 2.9092 2.9102	5 5	+ 32 + 6	+ 2.9124 2.9108	+ 2.9116	10	2
83-90	1887, Febr. 28 Novbr. 26	r l	6 21 21 27	+ 0.3558 0.3628	6 5	+ 45 + 23	+ 0.3603 0.3651	+ 0.3627	11	2
83-91	1887, Febr. 28 Novbr. 26	r l	4 29 21 7	+ 4.3286 4.3328	5 5	+ 100 + 42	+ 4.3386 4.3370	+ 4.3378	10	2
83-92	1887, Febr. 28 Novbr. 26	r l	7 15 22 6	+ 6.4936 6.4910	5 5	+ 65 + 28	+ 6.5001 6.4938	+ 6.4970	10	2
83-93	1887, Febr. 28 Novbr. 26	r l	7 17 21 32	+ 2.1610 2.1548	5 5	+ 109 + 33	+ 2.1719 2.1581	+ 2.1650	10	2
84-85	1887, März 4 Novbr. 26	r l	3 47 22 1	- 0.7835 0.7916	5 6	+ 52 + 23	- 0.7783 0.7893	- 0.7838	11	2
84-92	1887, März 4 Novbr. 26	r l	3 49 21 51	+ 2.8351 2.8444	5 5	+ 49 + 5	+ 2.8400 2.8449	+ 2.8425	10	2
85-86	1887, März 4 Novbr. 26	r l	4 2 22 12	- 1.2082 1.2098	4 5	- 18 - 17	- 1.2100 1.2115	- 1.2108	9	2
85-88	1887, März 4 Novbr. 26	r l	4 12 22 16	- 1.7030 1.6995	4 6	+ 33 + 17	- 1.6997 1.6978	- 1.6987	10	2

Beob. Differenz	Datum	Lage der Schraube	Stunden- winkel	$\Delta \delta$ app.	Anzahl der Einstellgn.	Summe der Correc- tionen	$\Delta \delta$ 1890.0	Mittel	Summe der Einstellgn.	Gewicht
85—92	1887, März 4 Novbr. 26	r l	^{h m s} 4 7 22 41	^{rev} + 3.6231 3.6218	5 5	+ 11 + 4	^{rev} + 3.6242 3.6222	^{rev} + 3.6232	10	2
85—105	1888, März 1 — 8	r l	4 41 4 52	+ 6.7778 6.7781	6 4	— 2 — 23	+ 6.7776 6.7758	+ 6.7767	10	2
87—88	1887, März 4 Novbr. 28	r l	4 30 20 30	— 0.8229 0.8092	5 5	+ 4 + 10	— 0.8225 0.8082	— 0.8154	10	2
87—91	1887, März 4 Novbr. 28	r l	4 33 22 9	+ 2.3333 2.3365	4 6	+ 47 + 29	+ 2.3380 2.3394	+ 2.3387	10	2
87—92	1887, März 4 Novbr. 26	r l	4 45 22 36	+ 4.4960 4.4950	6 5	— 13 + 4	+ 4.4947 4.4954	+ 4.4950	11	2
87—93	1887, März 4 Novbr. 28	r l	4 37 22 15	+ 0.1665 0.1595	4 6	+ 50 + 21	+ 0.1715 0.1616	+ 0.1665	10	2
88—89	1887, März 4 Novbr. 28	r l	4 27 22 2	+ 1.7361 1.7384	5 5	— 11 — 14	+ 1.7350 1.7370	+ 1.7360	10	2
88—90	1887, März 4 Novbr. 28	r l	4 24 20 19	— 0.8230 0.8118	4 5	+ 14 + 12	— 0.8216 0.8106	— 0.8161	9	2
88—92	1887, März 4 Novbr. 26	r l	4 16 22 26	+ 5.3163 5.3190	5 5	+ 25 + 25	+ 5.3188 5.3215	+ 5.3202	10	2
89—92	1887, März 4 Novbr. 26	r l	4 20 22 31	+ 3.5747 3.5902	4 5	+ 3 — 3	+ 3.5750 3.5899	+ 3.5824	9	2
91—93	1887, März 4 Novbr. 28	r l	4 41 22 22	— 2.1795 2.1780	4 6	— 15 — 19	— 2.1810 2.1799	— 2.1804	10	2
99—100	1888, Oct. 16 — 19	r l	20 4 21 3	+ 4.3573 4.3535	5 5	+ 12 + 29	+ 4.3585 4.3564	+ 4.3575	10	2
100—101	1887, Novbr. 17 Dec. 2	l r	21 2 22 5	+ 1.8574 1.8591	4 5	— 7 — 9	+ 1.8567 1.8582	+ 1.8575	9	2
100—102	1887, Novbr. 17 1888, März 16	l r	21 7 5 12	+ 2.3258 2.3252	5 4	+ 16 + 23	+ 2.3274 2.3275	+ 2.3274	9	2
101—102	1887, Novbr. 17 1888, März 16	l r	21 12 5 17	+ 0.4600 0.4371	5 4	— 1 + 13	+ 0.4599 0.4384	+ 0.4492	9	2
101—103	1888, Oct. 16 — 19	r l	20 11 21 10	+ 1.7691 1.7717	6 8	— 16 + 1	+ 1.7675 1.7718 (2)	+ 1.7704	14	3
102—103	1887, Novbr. 17 1888, März 16	l r	21 17 5 22	+ 1.2994 1.3111	5 6	+ 21 + 10	+ 1.3015 1.3121	+ 1.3068	11	2

In den vorstehenden beiden Auszügen aus den Beobachtungsheften sind alle beobachteten Differenzen nur einmal aufgeführt, weshalb es schwer ist, über die Verbindungen der einzelnen Sterne unter einander einen Ueberblick zu gewinnen. Diesem Uebelstand begegnen die nachfolgenden Zusammenstellungen.

Uebersicht der Verbindungen in AR.

Es ist in Rectascension verbunden

1 mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ^a , 11, 12, 12 ^a , 13, 14, 14 ^a , 14 ^b , 15, 15 ^a , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 ^a , 23, 24, 24 ^a , 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32 ^a , 32 ^c , 37, 38, 38 ^a , 38 ^b , 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 ^a , 50, 52, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 75, 95	31 mit 27, 30	63 mit 1, 27, 62
2 " 1	32 " 1, 30	64 " 1, 27, 62, 65, 68, 106, 107
3 " 1	32 ^a " 1, 30	65 " 1, 27, 30, 34, 35, 62, 64, 66, 67, 67 ^a , 68, 69, 95, 99
4 " 1, 38	32 ^b " 30	66 " 1, 27, 62, 65, 67, 67 ^a , 99
5 " 1	32 ^c " 1, 30	67 " 62, 65, 66
6 " 1	33 " 34, 35, 83	67 ^a " 65, 66
7 " 1	34 " 30, 33, 36, 62, 65, 81, 82, 83, 84, 85, 91, 92, 94, 105	68 " 1, 62, 64, 65, 69
8 " 1, 38, 41	35 " 27, 30, 33, 36, 62, 65, 83	69 " 1, 27, 62, 65, 68
9 " 1, 41	36 " 34, 35	70 " 1, 52
10 " 1, 14, 41	37 " 1, 38	71 " 52, 57, 72, 73, 74, 78, 79, 80
10 ^a " 1, 14, 41	38 " 1, 4, 8, 14, 19, 20, 21, 37, 38 ^a , 38 ^b , 39, 40, 41, 42, 43, 75	72 " 52, 57, 71
11 " 1, 41	38 ^a " 1, 38	73 " 71
12 " 1, 41	38 ^b " 1, 38	74 " 52, 57, 71
12 ^a " 1, 41	39 " 1, 38, 40	75 " 1, 38, 41, 43, 76, 77
13 " 1, 14, 41	40 " 1, 38, 39, 44	76 " 75
14 " 1, 10, 10 ^a , 13, 14 ^a , 14 ^b , 22, 22 ^a , 23, 38, 41	41 " 1, 8, 9, 10, 10 ^a , 11, 12, 12 ^a , 13, 14, 14 ^a , 14 ^b , 15, 15 ^a , 16, 17, 18, 19, 22, 22 ^a , 23, 24, 24 ^a , 25, 27, 28, 29, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 49 ^a , 50, 52, 75	77 " 75
14 ^a " 1, 14, 41	42 " 1, 30, 38, 43, 44	78 " 71
14 ^b " 1, 14, 41	43 " 1, 30, 38, 42, 44, 75	79 " 71
14 ^c " —	44 " 1, 30, 40, 42, 43, 83	80 " 52, 57, 71
15 " 1, 41	45 " 1, 27, 41, 46, 47, 48, 49, 49 ^a , 50, 52, 54, 57	81 " 34, 83
15 ^a " 1, 41	46 " 1, 41, 45	82 " 34, 83
16 " 1, 41	47 " 1, 41, 45	83 " 30, 33, 34, 35, 44, 81, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 105
17 " 1, 41	48 " 1, 41, 45, 50, 52, 54	84 " 34, 83
18 " 1, 41	49 " 1, 41, 45, 49 ^a	85 " 34, 83, 86, 89
19 " 1, 19 ^a , 19 ^b , 38, 41, 52, 57	49 ^a " 1, 41, 45, 49	86 " 85
19 ^a " 19, 19 ^b	50 " 1, 41, 45, 48	87 " 88
19 ^b " 19, 19 ^a	51 " 52, 53	88 " 83, 87, 89, 90
20 " 1, 38	52 " 1, 19, 28, 29, 41, 45, 48, 51, 53, 54, 55, 55 ^a , 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 74, 80, 96, 97, 98	89 " 85, 88
21 " 1, 38	53 " 51, 52, 54, 55, 55 ^a , 56, 57, 61, 96	90 " 83, 88
22 " 1, 14, 41	54 " 45, 48, 52, 53, 56, 61, 96, 98, 98 ^a	91 " 34, 83, 93
22 ^a " 1, 14, 41	55 " 52, 53, 56	92 " 34, 83
23 " 1, 14, 41	55 ^a " 52, 53, 56	93 " 91
24 " 1, 41	56 " 52, 53, 54, 55, 55 ^a , 61, 96, 97, 98	94 " 34
24 ^a " 1, 41	57 " 19, 28, 29, 45, 52, 53, 58, 59, 60, 72, 74, 80	95 " 1, 65
25 " 1, 27, 30, 41	58 " 52, 57, 71	96 " 52, 53, 54, 56
26 " 1, 27, 30	59 " 52, 57	97 " 52, 56
27 " 1, 25, 26, 30, 31, 35, 41, 45, 62, 63, 64, 65, 66, 69	60 " 52, 57	98 " 52, 54, 56
28 " 1, 41, 52, 57	61 " 52, 53, 54, 56	98 ^a " 54
29 " 1, 41, 52, 57	62 " 1, 27, 34, 35, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 99, 100, 101, 102, 103, 104	99 " 62, 65, 66
30 " 1, 25, 26, 27, 31, 32, 32 ^a , 32 ^b , 32 ^c , 34, 35, 42, 43, 44, 65, 83		100 " 62
		101 " 62
		102 " 62
		103 " 62
		104 " 62
		105 " 34, 83
		106 " 64
		107 " 64

Uebersicht der Verbindungen in Declination.

In Declination ist verbunden:

1 mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ^a , 11, 12, 12 ^a , 13, 14, 14 ^a , 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 ^a , 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 65, 75	31 mit 27, 30, 35, 36	62 mit 34, 35, 63, 64, 65, 66, 69, 104
2 " 1, 4, 5, 6, 7	32 " 27, 30	63 " 34, 35, 62, 102, 104
3 " 1, 5, 6	32 ^a " 27, 30	64 " 62, 65, 66, 98, 69, 106, 107
4 " 1, 2, 5, 6, 7	32 ^b " 27, 30	65 " 1, 27, 30, 35, 36, 41, 45, 62, 64, 66, 67, 67 ^a , 68, 95, 99, 100
5 " 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	32 ^c " 27	66 " 35, 36, 62, 64, 65, 67, 67 ^a , 68, 99, 100
6 " 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 52	33 " 30, 34, 35	67 " 65, 66, 67 ^a
7 " 1, 2, 4, 5, 6	34 " 30, 33, 35, 62, 63, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 105	67 ^a " 65, 66, 67
8 " 1, 5, 6	35 " 27, 30, 31, 33, 34, 36, 44, 62, 63, 65, 66, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 94, 103	68 " 27, 64, 65, 66, 69, 70
9 " 1, 11, 19, 41	36 " 27, 30, 31, 35, 65, 66	69 " 62, 64, 68
10 " 1, 10 ^a , 11, 12, 41	37 " 1, 6, 19, 20, 21, 38, 39, 40	70 " 45, 48, 49, 52, 61, 68
10 ^a " 1, 10, 13, 41	38 " 1, 6, 19, 20, 21, 37, 38 ^a , 38 ^b , 39, 40, 41, 42, 44, 45, 52, 75, 76, 77	71 " 55, 57, 72, 73, 74, 78, 79, 80
11 " 1, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 41	38 ^a " 19, 38, 38 ^b	72 " 57, 71, 74, 80
12 " 1, 10, 12 ^a , 13, 14, 15, 19, 41	38 ^b " 19, 19 ^b , 38, 38 ^a	73 " 71, 78, 79
12 ^a " 1, 12, 41	39 " 1, 6, 37, 38, 40, 42, 43, 44	74 " 71, 72
13 " 1, 10 ^a , 12, 14, 41	40 " 1, 6, 37, 38, 39, 42, 43, 44	75 " 1, 38, 42, 43
14 " 1, 12, 13, 14 ^a , 15, 19, 41, 45	41 " 1, 6, 9, 10, 10 ^a , 11, 12, 12 ^a , 13, 14, 14 ^a , 14 ^b , 14 ^c , 15, 15 ^a , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 ^a , 23, 24, 24 ^a , 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 44, 45, 46, 47, 52, 65	76 " 38, 42, 43
14 ^a " 1, 14, 14 ^b , 41,	42 " 1, 6, 38, 39, 40, 43, 44, 75, 76, 77,	77 " 38, 42, 43
14 ^b " 14 ^a , 41	43 " 1, 6, 39, 40, 42, 44, 75, 76, 77,	78 " 58, 71, 73, 79
14 ^c " 41	44 " 1, 6, 27, 30, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 83, 88	79 " 71, 73, 78
15 " 1, 12, 14, 15 ^a , 16, 17, 19, 41	45 " 1, 6, 14, 19, 27, 28, 29, 38, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 65, 70	80 " 57, 71, 72
15 ^a " 15, 41	46 " 1, 41, 45, 47	81 " 34, 35, 84
16 " 1, 15, 18, 19, 28, 41	47 " 1, 41, 45, 46, 48, 49, 51	82 " 34, 35, 84
17 " 1, 15, 18, 19, 29, 41	48 " 1, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 70	83 " 30, 34, 35, 44, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
18 " 1, 11, 16, 17, 19, 41	49 " 1, 45, 47, 48, 49 ^a , 50, 70, 95	84 " 34, 35, 81, 82, 83, 85, 92
19 " 1, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ^a , 19 ^b , 20, 21, 28, 29, 37, 38, 38 ^a , 38 ^b , 41, 45, 52, 53, 57, 60	49 ^a " 49	85 " 34, 35, 83, 84, 86, 88, 92, 105
19 ^a " 19, 19 ^b	50 " 45, 48, 49	86 " 34, 35, 83, 85
19 ^b " 19, 19 ^a , 38 ^b	51 " 47, 48, 52, 53, 54, 59	87 " 34, 35, 83, 88, 91, 92, 93
20 " 1, 6, 11, 19, 21, 37, 38, 41	52 " 1, 6, 19, 28, 29, 38, 41, 45, 48, 51, 53, 55, 55 ^a , 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 96, 97	88 " 34, 35, 44, 83, 85, 87, 89, 90, 92
21 " 1, 6, 11, 19, 20, 37, 38, 41	53 " 19, 51, 52, 54, 57, 59	89 " 34, 83, 88, 92
22 " 1, 41	54 " 45, 48, 51, 53, 56, 57, 61	90 " 34, 83, 88
22 ^a " 1, 41	55 " 52, 55 ^a , 56, 57, 58, 71	91 " 34, 35, 83, 87, 93
23 " 1, 27, 41	55 ^a " 52, 55	92 " 83, 84, 85, 87, 88, 89
24 " 1, 25, 27, 41	56 " 52, 54, 55, 61, 96, 97, 98	93 " 83, 87, 91
24 ^a " 25, 27, 41	57 " 19, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 71, 72, 80, 96, 97	94 " 34, 35
25 " 1, 6, 24, 24 ^a , 26, 27, 30, 41	58 " 52, 55, 57, 78	95 " 49, 65
26 " 1, 25, 27, 30, 41	59 " 28, 51, 52, 53, 57, 60	96 " 52, 56, 57
27 " 1, 6, 23, 24, 24 ^a , 25, 26, 30, 31, 32, 32 ^a , 32 ^b , 32 ^c , 35, 36, 41, 44, 45, 65, 68	60 " 19, 29, 52, 57, 59	97 " 52, 56, 57
28 " 1, 16, 19, 29, 41, 45, 52, 59	61 " 52, 54, 56, 70, 98	98 " 56, 61
29 " 1, 17, 19, 28, 41, 45, 52, 60		98 ^a " —
30 " 1, 6, 25, 26, 27, 31, 32, 32 ^a , 32 ^b , 33, 34, 35, 36, 41, 44, 65, 83		99 " 65, 66, 100

Genauigkeit der Beobachtungen.

Um einen Begriff über die Genauigkeit der Messungen zu erhalten, habe ich zunächst den mittleren Fehler eines Fadenantritts, bzw. einer Schraubeneinstellung aus den Beobachtungen wie folgt berechnet:

Rectascensionsdifferenzen. Es wurden in der vorstehenden Zusammenstellung 50 AR-Differenzen, die an wenigstens 4 Abenden beobachtet sind, beliebig ausgewählt und aus den Abweichungen λ der einzelnen Abendmittel gegen das zugehörige Gesamtmittel unter Berücksichtigung der Gewichte g (= Anzahl der Fadenantritte) die Summen $[\lambda\lambda g]$ berechnet; für die zugehörige Anzahl der Abendmittel n findet sich dann der mittlere Fehler einer auf einem Fadenantritt beruhenden AR-Differenz aus

$$\mu_1^2 = \frac{[\lambda\lambda g]}{n-1}$$

Im Mittel aus 50 AR-Differenzen ergibt sich dann wesentlich genauer

$$\mu_1^2 = \frac{\sum_1^{50} [\lambda\lambda g]}{\sum_1^{50} (n-1)}$$

Dementsprechend fand ich

Diffz.	$[\lambda\lambda g]$	$(n-1)$	Diffz.	$[\lambda\lambda g]$	$(n-1)$
1—2	0.498464	9	30—32	0.243468	6
1—4	0.347899	9	33—34	0.125086	6
1—5	0.226850	8	34—36	0.562112	8
1—6	0.283323	10	34—82	0.270147	6
1—7	0.383239	7	35—36	0.376334	6
1—9	0.202947	6	38—38 ^a	0.137637	4
1—11	0.744786	7	38—42	0.367135	4
1—14	0.592919	11	41—47	0.122322	3
1—15	0.463251	8	45—52	0.292099	3
1—19	0.401365	10	52—53	0.937718	7
1—23	0.553310	8	52—54	0.599182	7
1—27	0.041384	5	52—56	0.213412	5
1—37	0.582680	8	52—60	0.079986	4
1—38	0.207607	10	53—54	0.076939	3
1—39	0.712500	10	57—59	0.373816	5
1—40	0.513463	8	57—60	0.474610	5
1—41	0.523901	11	62—64	0.501220	3
1—43	0.450666	6	62—104	0.205570	3
1—48	0.200898	9	64—106	0.256308	5
1—49	0.407066	6	65—66	0.158378	6
1—50	0.628134	6	66—67	0.261105	5
14—41	0.324727	4	75—76	0.170707	4
22—41	0.149914	4	83—88	0.179075	4
27—30	0.087172	5	85—86	0.459150	4
30—31	0.440524	9	91—93	1.146865	4
9.974989		194	8.590381		120
			9.974989		194
			18.56537 ⁰		314

Hieraus ergibt sich im Parallel des Sternhaufens der mittlere Fehler einer auf einem einfachen Fadenantritt beruhenden Differenz zu

$$\pm 0,243$$

somit der mittlere Fehler einer solchen Differenz, auf den Aequator bezogen, zu

$$\pm 0.134''$$

und endlich der mittlere Fehler eines einzelnen Fadenantritts, gleichfalls auf den Aequator bezogen, zu

$$\pm 0.094''$$

Declinationsdifferenzen. Das Verfahren war hier ganz dasselbe, wie bei den AR-Differenzen, nur trat insofern eine Vereinfachung ein, als hier alle Abendmittel gleiches Gewicht besitzen. Man findet also durch ein dem vorigen ganz analoges Verfahren:

Diffz.	$[\lambda\lambda_g]$	(n-1)	Diffz.	$[\lambda\lambda_g]$	(n-1)
1-2	0.00009367	3	24-27	0.00006566	3
1-6	13233	3	27-30	29058	15
1-19	63561	14	27-31	18114	4
1-27	78335	10	27-35	14902	4
1-30	05878	3	27-45	26911	6
1-38	05982	3	27-65	15673	3
1-41	07875	3	30-31	43443	3
1-44	08065	3	30-35	54473	12
1-45	36715	5	30-44	12910	3
1-52	07860	4	34-35	134310	15
1-65	00751	3	35-44	24144	3
6-19	33908	4	35-83	03718	3
6-27	13183	3	38-41	07567	4
6-30	11799	3	38-52	38962	4
6-44	27529	3	40-44	115319	4
6-45	03675	3	41-52	10634	4
6-52	30358	4	45-46	70889	5
15-16	15672	3	45-52	14830	6
19-19 ^a	19842	4	45-65	01006	3
19-19 ^b	03386	3	46-47	59063	5
19-20	25895	3	52-57	66348	13
19-38	11719	4	54-56	15063	3
19-52	53943	12	57-71	76247	15
19-57	31337	3	62-63	11278	3
22-41	51666	3	62-69	01425	3
0.00571534		109	0.00872853		146
			0.00571534		109
			0.01444387		255

Hienach findet sich der mittlere Fehler der Gewichtseinheit der Declinationsdifferenzen zu

$$\pm 0.187''$$

da aber der Gewichtseinheit 5 einfache Beobachtungen entsprechen, ist der mittlere Fehler einer einfach gemessenen Differenz

$$\pm 0.418''$$

und daher der mittlere Fehler der Einstellung auf den festen oder beweglichen Faden (wenn man ihn beidemale gleich gross annimmt)

$$\pm 0.295''$$

Aus der Berechnungsweise der obigen mittleren Fehler geht hervor, dass dieselben nicht nur die wirklichen Beobachtungsfehler (also die Ungenauigkeiten beim Registrieren der Fadenan-

tritte oder bei der Einstellung der Sterne auf den festen oder beweglichen Faden) zum Ausdruck bringen, sondern auch den Einfluss aller anderen, etwaigen Fehlerursachen, welche die einzelnen Abendmittel der gemessenen Differenzen mehr oder weniger entstehen. Dieser Umstand wäre bei der Beurtheilung der gefundenen Zahlenwerthe zu berücksichtigen.

Ausgleichung der Beobachtungen.

Da zwischen 125 Sternen des Sternhaufens im Ganzen 290 verschiedene AR-Differenzen und 421 Declinationsdifferenzen gemessen wurden, sind allgemein für die Koordinatenbestimmung dieser Sterne 165, bezw. 296 Differenzen überschüssig und es sind daher die Koordinaten durch Ausgleichungen nach der Methode der kleinsten Quadrate zu ermitteln. Diese Ausgleichung der Beobachtungen gestaltet sich nun im vorliegenden Fall für beide Koordinaten äusserst einfach. Es sei a der Stern, in Bezug auf welchen die Koordinaten der übrigen Sterne $b, c, d \dots r$ bestimmt werden sollen. Die gesuchten Coordinatendifferenzen dieser Sterne gegen a seien $x, u, t, v \dots z$, die beobachteten Differenzen endlich $\overline{bc}, \overline{bd}, \overline{be} \dots \overline{br}; \overline{cd}, \overline{ce} \dots \overline{cr}; \overline{de}, \overline{df} \dots \overline{dr}$; u. s. w. mit den Gewichten $p, p_1, p_2 \dots p_r$. Dann haben die beobachteten Differenzen Bedingungsgleichungen von der folgenden einfachen Form zu erfüllen:

$$\begin{array}{rcl} x & = & \cdot + \overline{ab} \quad \left| \begin{array}{l} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ p_4 \\ \vdots \\ p_r \end{array} \right. \\ x & = & u + \overline{bc} \\ x & = & t + \overline{bd} \\ x & = & v + \overline{be} \\ \vdots & & \vdots \\ x & = & z + \overline{br} \end{array}$$

woraus zur Bestimmung des wahrscheinlichsten Werthes von x sich die Normalgleichung ergibt

$$[p] x = \{ ab p_1 + (u + \overline{bc}) p_2 + (t + \overline{bd}) p_3 \dots + (z + \overline{br}) p_r \}$$

Analoge Normalgleichungen, wie vorstehend für den Stern b , ergeben sich für alle übrigen Sterne, sofern dieselben nur mit mehr als einem andern Stern verbunden sind und es lassen sich diese Normalgleichungen mit grossem Vortheil nach einem von Herrn Professor L. von Seidel angegebenen und mehrfach angewendeten Verfahren auflösen. *)

Dasselbe besteht im Wesentlichen darin, für die Unbekannten $x, u, t, v \dots z$ in die Normalgleichungen Näherungswerthe einzusetzen und diese letzteren durch mehrmalige Wiederholung der Rechnung so lange zu verbessern, bis sämtliche Normalgleichungen erfüllt sind. Es bietet nun ferner, wie Herr Prof. von Seidel a. a. O. zeigte, keinerlei Schwierigkeiten, die mittleren Fehler der auf die oben beschriebene Weise aus den Normalgleichungen berechneten Unbekannten zu bestimmen. Allein die Arbeit, welche eine derartige strenge Fehlerberechnung verursacht, ist doch, besonders wenn die Anzahl der Unbekannten sehr gross ist, auch hier ausserordentlich mühsam. Aus diesem Grunde zog ich es vor, von der strengen Berechnung der mittleren Fehler der ausgeglichenen Differenzen Umgang zu nehmen und mich mit Näherungswerthen derselben zu begnügen, welche sich in einfacher Weise wie folgt ergaben. Sind $x_0, u_0, t_0 \dots z_0$ die durch die Ausgleichung gefundenen Werthe der Differenzen $\overline{ab}, \overline{ac} \dots \overline{ar}$, so werden durch Einsetzung derselben in die Beobachtungsgleichungen noch Fehler $\lambda_1, \lambda_2 \dots \lambda_r$ übrig bleiben. Wären nun die Werthe $u_0, t_0 \dots z_0$ nicht durch Ausgleichung gefunden, sondern anderweitig unter sich und von x unabhängig bestimmt, so würde sich bekanntlich der mittlere Fehler der Gewichtseinheit für x_0 aus

$$\mu_1 = \frac{V[p\lambda\lambda]}{n-1}$$

*) Vgl. hierüber dessen Abhandlungen: »Resultate photometrischer Untersuchungen« (Abhdlgn. der K. Bayer. Akad. der Wissenschaften, Bd. IX, 1862) und »Ueber ein Verfahren, die Gleichungen, auf welche die Methode der kleinsten Quadrate führt, sowie lineare Gleichungen überhaupt, durch successive Annäherung aufzulösen.« (Abhdlgn. d. K. Ak. d. Wissenschaften, Bd. XI, 1874).

finden, wenn n die Anzahl der Beobachtungs- (Fehler-) Gleichungen vorstellt. Es wurden nun die mittleren Fehler der ausgeglichenen Differenzen $x_0, u_0 \dots z_0$ in der Weise berechnet, dass die Werthe der letzteren als von einander unabhängig bestimmte Grössen betrachtet und in die Beobachtungsgleichungen eingesetzt wurden (letzteres musste zur schliesslichen Controlle der Ausgleichung ohnedies geschehen.) Aus den übrig bleibenden Fehlern λ wurde dann nach der obigen Formel für alle Differenzen $x_0, u_0 \dots z_0$ der mittlere Fehler der Gewichtseinheit, sowie jener der ausgeglichenen Differenzen selbst bestimmt.

Da die oben gemachte Annahme, dass die Werthe $x_0, u_0 \dots z_0$ unabhängig von einander bestimmt seien, nicht zutrifft, durfte ich a priori nicht erwarten, die wirklichen Werthe der mittleren Fehler zu erhalten. Indessen mussten diese, auf so einfache Weise berechneten mittleren Fehler immerhin einen Begriff über die Genauigkeit der Beobachtungs- und Ausgleichungsergebnisse geben. Und da die aus der Zusammenfassung aller einzelnen Werthe von μ_1 berechneten mittleren Fehler der Gewichtseinheit, wie sich weiter unten zeigen wird, in beiden Coordinaten von den auf S. 63 und 64 hiefür berechneten Werthen nicht wesentlich abweichen, kann man wohl auch mit einiger Berechtigung annehmen, dass die aus den mittleren Fehlern der Gewichtseinheit nach Massgabe des jedesmaligen Gewichtes berechneten mittleren Fehler der ausgeglichenen Differenzen aller Sterne gegen den Hauptstern 1 den wirklich stattfindenden Werthen dieser Fehler annähernd entsprechen werden.

Dem Vorstehenden gemäss erfolgte für die beiden Coordinatendifferenzen eines jeden Sternes die Berechnung der in den nachfolgenden Tabellen angegebenen Summen $[\lambda \lambda p]$. Durch Addition dieser letzteren und der gleichfalls für jede Differenz notirten Zahlen $(n-1)$ fand sich der mittlere Fehler der Gewichtseinheit μ_1 und hieraus mit Rücksicht auf die gleichfalls angegebenen Gesamtgewichte $[p]$, mit denen die einzelnen Differenzen aus der Ausgleichung hervorgingen, die mittleren Fehler μ dieser letzteren. Diejenigen Sterne, welche nur an einen der übrigen angeschlossen sind, konnten naturgemäss zur $\Sigma[\lambda \lambda p]$ keinen Beitrag liefern. Es wurden ferner in den nachfolgenden Tabellen nicht nur die Werthe der ausgeglichenen Rectascensions-, bezw. Declinationsdifferenzen zusammengestellt, sondern zur Eintragung in die am Schluss sich befindenden beiden Karten auch noch die Werthe von $15 \Delta \alpha \cos \delta$ und jene von $\Delta \delta$ im Gradmass.

Der Stern 14° liegt mit 14^a fast genau auf demselben Stundenkreis und die Declinationsdifferenz beider beträgt noch nicht $5''$, ausserdem sind beide Sterne sehr lichtschwach und nur selten waren sie bei ganz schwach beleuchtetem Gesichtsfeld noch getrennt sichtbar. Aus allen diesen Gründen gelang es mir nicht, den genannten Stern in Rectascension mit einem ihm benachbarten zu verbinden. Ebenso erging es mit dem Sterne 98^a , der ebenfalls sehr lichtschwach ist und deshalb auch nur sehr selten bei beleuchtetem Gesichtsfeld wahrgenommen werden konnte, wodurch eine Einmessung desselben in Declination vereitelt wurde.

Ausgegliche Rectascensionsdifferenzen.

Stern	$[\lambda \lambda p]$	$n-1$	$[p]$	$\Delta \alpha$	μ	$15 \Delta \alpha \cos \delta$
1	0.891118	60	1055	0.000	± 0.004	0 0.0
2	—	0	15	+ 1.960	—	+ 0 16.2
3	—	0	14	+ 4.319	—	+ 0 35.6
4	0.036177	1	23	+ 9.031	0.036	+ 1 14.5
5	—	0	14	+ 4.669	—	+ 0 38.5
6	—	0	14	+ 5.974	—	+ 0 49.3
7	—	0	17	+ 5.835	—	+ 0 48.2
8	0.018894	2	24	+ 13.229	0.020	+ 1 49.2
9	0.016696	1	41	— 1.294	0.020	— 0 10.7
10	0.060457	2	21	— 4.239	0.038	— 0 35.0

Stern	$[\lambda\lambda p]$	$n-1$	$[p]$	$\Delta\alpha$	μ	$15 \Delta\alpha \cos \delta$
10 ^a	0.041947	2	25	— 5.738	± 0.029	— 0 47.3
11	0.000263	1	23	— 4.284	0.003	— 0 35.3
12	0.048131	1	19	— 5.519	0.050	— 0 45.5
12 ^a	0.005376	1	7	— 5.696	0.028	— 0 47.0
13	0.003816	2	24	— 6.738	0.009	— 0 55.6
14	0.062579	8	57	— 10.511	0.012	— 1 26.7
14 ^a	0.026125	2	31	— 13.145	0.021	— 1 48.5
14 ^b	0.020611	2	23	— 13.729	0.021	— 1 53.3
14 ^c	—	0	0	— 13.1	0.000	— 1 48
15	0.000434	1	34	— 8.766	0.004	— 1 12.3
15 ^a	—	0	5	— 7.054	—	— 0 58.2
16	0.048866	1	26	— 10.116	0.043	— 1 23.4
17	0.007512	1	18	— 5.543	0.020	— 0 45.7
18	0.000027	1	33	— 3.646	0.001	— 0 30.1
19	0.004542	6	74	+ 9.131	0.008	+ 1 15.3
19 ^a	0.002273	1	7	+ 11.719	0.018	+ 1 36.6
19 ^b	0.002653	1	8	+ 23.818	0.018	+ 3 16.4
20	0.005828	1	32	+ 2.370	0.013	+ 0 19.5
21	0.011795	1	35	+ 2.077	0.018	+ 0 17.1
22	0.014997	2	33	— 9.896	0.015	— 1 21.7
22 ^a	0.092779	1	29	— 7.453	0.057	— 1 1.5
23	0.021727	1	23	— 14.776	0.031	— 2 1.9
24	0.156100	1	24	— 11.296	0.081	— 1 33.2
24 ^a	0.026808	1	27	— 14.519	0.031	— 1 59.8
25	0.014274	2	36	— 14.578	0.014	— 2 0.4
26	0.245765	2	25	— 14.244	0.070	— 1 57.6
27	0.163686	13	132	— 23.648	0.010	— 3 15.2
28	0.018037	3	25	— 7.929	0.016	— 1 5.4
29	0.032371	3	28	— 3.025	0.020	— 0 24.9
30	0.382007	14	184	— 15.922	0.012	— 2 11.5
31	0.019242	1	37	— 21.097	0.023	— 2 54.2
32	0.011788	1	28	— 3.694	0.021	— 0 30.5
32 ^a	0.056067	1	24	— 5.931	0.048	— 0 49.0
32 ^b	—	0	9	— 0.489	—	— 0 4.0
32 ^c	0.000667	1	19	— 2.422	0.006	— 0 20.0
33	0.098516	2	26	— 24.942	0.043	— 3 26.1
34	0.159399	12	167	— 40.170	0.009	— 5 32.0
35	0.151511	6	56	— 40.462	0.021	— 5 34.3
36	0.001440	1	45	— 43.530	0.006	— 5 59.6
37	0.008073	1	33	+ 18.023	0.016	+ 2 28.7
38	0.204584	15	131	+ 22.644	0.010	+ 3 6.8
38 ^a	0.001887	1	23	+ 24.095	0.009	+ 3 18.8
38 ^b	0.004900	1	21	+ 24.310	0.015	+ 3 20.5
39	0.123368	2	47	+ 21.457	0.037	+ 2 57.1
40	0.129477	3	29	+ 24.142	0.038	+ 3 19.3

Stern	$[\lambda\lambda p]$	$n-1$	$[p]$	$\Delta\alpha$	μ	15 $\Delta\alpha \cos \delta$
41	0.455591	34	271	— 16.517	+ 0.007	— 2 16.3
42	0.076693	4	36	+ 42.999	0.023	+ 5 54.9
43	0.075582	6	45	+ 35.390	0.017	+ 4 52.5
44	0.105045	5	45	+ 22.055	0.048	+ 3 2.1
45	0.225965	11	84	— 34.283	0.016	— 4 42.8
46	0.004172	2	27	— 37.416	0.009	— 5 8.6
47	0.012161	2	29	— 39.232	0.014	— 5 23.6
48	0.074206	5	53	— 48.951	0.017	— 6 43.7
49	0.025297	3	23	— 46.353	0.019	— 6 22.5
49 ^a	0.039597	3	16	— 44.267	0.029	— 6 5.2
50	0.011235	3	38	— 51.985	0.010	— 7 8.8
51	0.005504	1	16	— 35.876	0.018	— 4 55.8
52	0.326522	25	280	— 36.294	0.007	— 4 59.2
53	0.152604	8	78	— 31.744	0.016	— 4 21.7
54	0.173658	7	58	— 47.223	0.021	— 6 29.3
55	0.002768	2	28	— 30.485	0.007	— 4 11.2
55 ^a	0.056526	2	18	— 30.667	0.038	— 4 12.7
56	0.100130	8	37	— 45.000	0.018	— 6 10.8
57	0.239880	11	86	— 16.506	0.016	— 2 16.0
58	0.009545	2	20	— 18.765	0.015	— 2 34.6
59	0.029814	1	15	— 15.556	0.044	— 2 8.2
60	0.028260	1	15	— 10.836	0.043	— 1 29.3
61	0.015154	3	23	— 53.643	0.011	— 7 22.1
62	0.283912	11	94	— 130.515	0.017	— 17 55.5
63	0.004974	2	31	— 135.623	0.013	— 18 40.7
64	0.031603	4	42	— 122.391	0.014	— 16 50.4
65	0.194256	13	161	— 73.364	0.009	— 10 5.7
66	0.063232	5	88	— 87.906	0.012	— 12 5.9
67	0.016802	2	31	— 83.729	0.016	— 11 31.3
67 ^a	0.005727	1	24	— 79.943	0.015	— 10 59.9
68	0.018391	2	31	— 125.067	0.012	— 17 12.1
69	0.102159	4	33	— 138.114	0.028	— 19 2.8
70	0.002310	1	21	— 84.570	0.010	— 11 37.3
71	0.013496	4	28	— 17.068	0.011	— 2 20.6
72	0.025392	3	20	+ 33.369	0.021	+ 4 34.8
73	—	0	10	— 24.601	—	— 3 22.6
74	0.000981	2	15	+ 49.905	0.006	+ 6 50.8
75	0.031501	3	28	+ 70.523	0.033	+ 9 42.2
76	—	0	14	+ 66.877	—	+ 9 12.0
77	—	0	9	+ 60.852	—	+ 8 22.2
78	—	0	8	— 22.882	—	— 3 8.4
79	—	0	10	— 30.903	—	— 4 14.4
80	0.033920	2	20	+ 12.285	0.029	+ 1 41.2
81	0.020108	1	23	— 14.659	0.030	— 2 1.1
82	0.069459	1	27	— 8.185	0.051	— 1 7.6

Stern	$[\lambda\lambda p]$	$n-1$	$[p]$	$\Delta\alpha$	μ	$15 \Delta\alpha \cos \delta$
83	0.197908	13	100	+ 6.756	± 0.012	+ 0 55.8
84	0.003851	1	19	- 17.412	0.014	- 2 23.9
85	0.029750	2	18	+ 19.768	0.029	+ 2 43.5
86	—	0	12	+ 21.474	—	+ 2 57.5
87	—	0	4	+ 54.180	—	+ 7 27.8
88	0.003962	2	24	+ 43.087	0.009	+ 5 56.1
89	0.008501	1	6	+ 40.780	0.038	+ 5 37.1
90	0.019030	1	7	+ 40.718	0.052	+ 5 36.5
91	0.022399	1	18	+ 84.226	0.035	+ 11 36.3
92	0.007131	1	14	+ 38.499	0.023	+ 5 18.3
93	—	0	16	+ 89.390	—	+ 12 18.8
94	—	0	11	- 52.197	—	- 7 11.5
95	0.004680	1	13	- 66.505	0.019	- 9 8.8
96	0.010410	3	18	- 36.830	0.024	- 5 3.4
97	0.067270	1	15	- 31.947	0.067	- 4 23.2
98	0.035594	2	20	- 49.297	0.030	- 6 46.2
98 ^a	—	0	5	- 51.765	—	- 7 6.6
99	0.000545	1	17	- 77.944	0.006	- 10 43.6
100	—	0	13	- 85.816	—	- 11 48.9
101	—	0	11	- 83.625	—	- 11 30.9
102	—	0	10	- 96.074	—	- 13 13.8
103	—	0	9	- 89.674	—	- 12 21.0
104	—	0	10	- 149.200	—	- 20 32.8
105	0.001768	1	16	+ 1.451	0.010	+ 0 12.0
106	—	0	16	- 102.319	—	- 14 4.7
107	—	0	14	- 97.281	—	- 13 23.1
7.032521		431				

Aus der obigen Summe aller $[\lambda\lambda p]$ findet sich also im Mittel aus 101 einzelnen Werthen der mittlere Fehler der Gewichtseinheit für die Rectascensionsdifferenzen zu

$$\pm 0.128$$

und zwar gilt dieser Werth für den Parallel des Sternhaufens; auf den Aequator reducirt ergibt sich daraus der Werth dieses mittleren Fehlers zu

$$\pm 0.070$$

Da der Gewichtseinheit 5 einfache Beobachtungen entsprechen, berechnet sich weiterhin der mittlere Fehler einer auf einem Faden beruhenden AR-Differenz zu

$$\pm 0.176$$

und demnach endlich der mittlere Fehler eines einfachen Fadenantritts zu

$$\pm 0.125$$

Ausgeglichene Declinationsdifferenzen.

Stern	$[\lambda\lambda p]$	$n-1$	$[p]$	$(\Delta\delta)^{\text{rev}}$	$(\Delta\delta)''$	μ
1	0.00344036	48	156	— 0.0000	— 0 0.00	$\pm$ 0.02
2	014426	4	16	— 1.3626	— 0 33.82	0.04
3	011560	2	7	— 1.4256	— 0 35.38	0.07
4	036177	4	13	— 0.9420	— 0 23.38	0.07
5	029900	6	18	— 0.0425	— 0 1.05	0.05
6	0.00201669	22	72	— 0.6936	— 0 17.21	0.03
7	019206	4	14	— 1.1972	— 0 29.71	0.05
8	017453	2	7	— 1.4904	— 0 36.99	0.09
9	005032	3	8	+ 0.5236	+ 0 12.99	0.04
10	047638	4	10	+ 0.5890	+ 0 14.62	0.09
10 ^a	0.00004525	3	9	+ 0.1403	+ 0 3.48	0.03
11	053874	8	16	+ 1.4602	+ 0 36.24	0.05
12	042492	7	16	+ 1.3739	+ 0 34.10	0.05
12 ^a	020418	2	6	+ 1.7154	+ 0 42.57	0.10
13	044581	4	11	+ 0.3869	+ 0 9.60	0.08
14	0.00072940	7	16	+ 0.5457	+ 0 13.54	0.06
14 ^a	004479	3	9	+ 0.9570	+ 0 23.75	0.03
14 ^b	002704	1	4	+ 1.3028	+ 0 32.33	0.06
14 ^c	—	0	2	+ 1.1103	+ 0 27.56	—
15	041984	7	17	+ 2.3372	+ 0 58.01	0.05
15 ^a	0.00005618	1	2	+ 2.6007	+ 1 4.54	0.13
16	012510	5	14	+ 3.2591	+ 1 20.89	0.03
17	041898	5	13	+ 3.1635	+ 1 18.51	0.06
18	044059	5	13	+ 2.2052	+ 0 54.73	0.06
19	122300	25	101	+ 4.9284	+ 2 2.31	0.02
19 ^a	0.00000572	1	7	+ 6.9524	+ 2 52.55	0.02
19 ^b	003906	2	8	+ 8.0088	+ 3 18.76	0.04
20	028500	7	18	+ 2.2934	+ 0 56.92	0.04
21	040664	7	18	+ 1.7900	+ 0 44.42	0.04
22	003468	1	6	— 1.0945	— 0 27.16	0.06
22 ^a	0.00014703	1	6	— 1.0258	— 0 25.46	0.12
23	012426	2	6	— 2.0199	— 0 50.13	0.08
24	028452	3	10	— 3.3663	— 1 23.55	0.08
24 ^a	073030	2	6	— 3.2734	— 1 21.24	0.19
25	025016	7	21	— 5.6111	— 2 19.26	0.03
26	0.00006837	4	13	— 6.2841	— 2 35.96	0.03
27	147319	18	92	— 5.1089	— 2 6.79	0.02
28	134752	7	16	+ 6.5635	+ 2 42.89	0.09
29	074400	7	16	+ 6.2602	+ 2 35.37	0.06
30	117305	16	81	— 9.9548	— 4 7.06	0.02
31	0.00051608	3	14	— 9.1923	— 3 48.14	0.09
32	000030	1	5	— 8.9036	— 3 40.97	0.01
32 ^a	017162	1	4	— 8.2588	— 3 24.97	0.16
32 ^b	002916	1	4	— 6.7040	— 2 46.38	0.07
32 ^c	—	0	2	— 6.6366	— 2 44.71	—

Stern	$[\lambda\lambda p]$	$n-1$	$[p]$	$(\Delta\delta)^{\text{rev}}$	$(\Delta\delta)''$	μ
33	0.00014528	2	10	- 14.8829	+ 6 9.37	$\pm$ 0.07
34	072866	17	55	- 18.3272	+ 7 34.85	0.02
35	060238	21	93	- 14.0902	- 5 40.69	0.01
36	033838	5	12	- 12.4072	- 5 7.92	0.06
37	033438	7	16	+ 0.9488	- 0 23.55	0.04
38	0.00118648	17	61	+ 0.4773	+ 0 11.85	0.03
38 ^a	005887	2	7	+ 2.8488	+ 1 10.70	0.05
38 ^b	012152	3	8	+ 4.1511	+ 1 43.02	0.06
39	034392	7	16	- 2.9620	- 1 13.51	0.04
40	084116	7	20	- 2.4649	- 1 1.17	0.06
41	0.00244240	37	110	- 0.1056	- 0 2.62	0.02
42	059446	9	20	- 3.4040	- 1 24.48	0.05
43	017098	8	20	- 6.1912	- 2 33.65	0.07
44	118989	12	49	- 8.2093	- 3 23.74	0.03
45	103547	17	71	+ 2.1071	+ 0 52.29	0.02
46	0.00042695	3	17	+ 3.4391	+ 1 25.35	0.07
47	039136	6	19	+ 4.5551	+ 1 53.05	0.05
48	076004	8	19	+ 4.9882	+ 2 3.80	0.06
49	038254	6	19	+ 2.5784	+ 1 3.99	0.04
49 ^a	—	0	2	+ 1.3536	+ 0 33.59	—
50	0.00005925	2	8	+ 3.5493	+ 1 28.09	0.05
51	053521	5	13	+ 8.6035	+ 3 33.52	0.07
52	121537	21	94	+ 10.4400	+ 4 19.10	0.02
53	036627	5	13	+ 10.8408	+ 4 29.05	0.06
54	071065	6	18	+ 10.4342	+ 4 18.96	0.06
55	0.00045836	5	12	+ 13.6945	+ 5 39.87	0.07
55 ^a	009802	1	4	+ 13.2088	+ 5 27.82	0.12
56	138589	6	21	+ 14.5827	+ 6 1.92	0.08
57	138998	12	61	+ 15.1397	+ 6 15.74	0.03
58	022956	3	8	+ 15.2674	+ 6 18.91	0.08
59	0.00037528	5	13	+ 11.4754	+ 4 44.80	0.06
60	006104	4	10	+ 9.9578	+ 4 7.13	0.03
61	039625	4	13	+ 13.4043	+ 5 32.67	0.07
62	018080	7	22	- 12.1135	- 5 0.64	0.03
63	007219	4	15	- 15.8888	- 6 34.33	0.03
64	0.00018516	4	16	- 5.6439	- 2 20.07	0.04
65	083483	15	50	- 6.8007	- 2 48.78	0.03
66	033562	9	32	- 7.5484	- 3 7.34	0.03
67	004825	2	9	- 6.0666	- 2 30.56	0.04
67 ^a	031946	2	6	- 5.0129	- 2 4.41	0.13
68	0.00016669	5	13	- 1.2194	- 0 30.26	0.04
69	003602	2	8	4.9186	- 2 2.07	0.04
70	019405	5	14	+ 8.9554	+ 3 42.26	0.04
71	020657	7	47	+ 21.7054	+ 8 58.69	0.02
72	023297	3	11	+ 19.6839	+ 8 8.52	0.07

Stern	$[\lambda \lambda p]$	$n-1$	$[p]$	$(\Delta \delta)^{\text{rev}}$	$(\Delta \delta)''$	μ
73	0.00019936	1	7	+ 23.3615	+ 9 39.79	$\pm$ 0.08
74	014644	2	17	+ 26.6945	+ 11 2.51	0.07
75	072959	3	9	- 5.0974	- 2 6.51	0.13
76	001092	2	6	- 3.1147	- 1 17.30	0.02
77	013702	2	6	- 1.3832	- 0 34.33	0.08
78	0.00029318	3	8	+ 20.9642	+ 8 40.29	0.09
79	021522	2	6	+ 26.8690	+ 11 6.84	0.10
80	007186	2	9	+ 16.5623	+ 6 51.05	0.05
81	013082	2	7	- 16.1655	- 6 41.20	0.08
82	002854	2	8	- 16.2576	- 6 43.48	0.03
83	0.00021841	13	31	- 16.0145	- 6 37.45	0.02
84	024182	6	16	- 19.6727	- 8 8.24	0.04
85	020193	7	17	- 18.8864	- 7 48.73	0.03
86	003140	3	8	- 17.6779	- 7 18.73	0.03
87	033088	6	14	- 18.0113	- 7 27.01	0.05
88	0.00036286	8	19	- 17.1882	- 7 6.58	0.04
89	001116	3	8	- 18.9257	- 7 49.70	0.02
90	017162	2	6	- 16.3711	- 6 46.30	0.09
91	016940	4	10	- 20.3556	- 8 25.19	0.05
92	009838	5	12	- 22.5099	- 9 18.65	0.03
93	0.00000938	2	6	- 18.1775	- 7 31.13	0.02
94	012770	1	4	- 20.1530	- 8 20.16	0.14
95	023186	1	5	- 1.2908	- 0 32.04	0.17
96	016742	2	6	+ 16.4761	+ 6 48.91	0.09
97	156838	2	6	+ 16.5539	+ 6 50.84	0.28
98	0.00035594	2	4	+ 15.3159	+ 6 20.11	0.15
98 ^a	—	0	0	—	+ 6 2	—
99	003852	2	5	- 8.3548	- 3 27.35	0.05
100	019819	4	10	- 12.7136	- 5 15.53	0.05
101	027495	2	7	- 14.5780	- 6 1.80	0.11
102	0.00024228	3	8	- 15.0365	- 6 13.18	0.08
103	003717	2	7	- 16.3469	- 6 45.70	0.04
104	004490	1	4	- 14.7420	- 6 5.87	0.08
105	013448	1	4	- 25.6549	- 10 36.71	0.14
106	—	0	2	- 5.0937	- 2 6.42	—
107	—	0	2	- 4.7925	- 1 58.94	—
	0.04966629	714				

Der mittlere Fehler der Gewichtseinheit bei den Declinationsdifferenzen findet sich hienach, im Mittel aus 120 einzelnen Werthen, zu

$$\pm 0.00834^{\text{rev}} = \pm 0.207''$$

Da der Gewichtseinheit wiederum 5 einzelne Messungen entsprechen, erhält man hieraus den mittleren Fehler einer einfachen Declinationsdifferenz zu

$$\pm 0.519''$$

und endlich jenen einer einmaligen Schraubeneinstellung zu

$$\pm 0.367''$$

Eine Vergleichung der hier abgeleiteten Fehlerbeträge mit den aus den directen Beobachtungen (S. 63 und 64) bestimmten zeigt, dass diese letzteren, wie es im Vornherein zu erwarten war, durchaus etwas kleiner ausfallen, als die eben gefundenen, in welchen auch noch die Widersprüche mit zum Ausdruck kommen, die durch die nicht vollständige Erfüllung der Bedingungs- (richtiger Beobachtungs-) Gleichungen hervorgerufen werden.

Grössenschätzungen.

Während der Messung der Differenzen habe ich mich mit Grössenschätzungen nicht weiter aufgehalten, ich stellte solche vielmehr erst nach Abschluss der eigentlichen Beobachtungen an drei klaren Abenden an, nämlich 1889, März 13 und März 18 mit dem grossen und März 23 mit dem kleinen (5 zölligen) Steinheil'schen Refractor der hiesigen Sternwarte und zwar an beiden Instrumenten mit 120facher Vergrösserung und bei unbeleuchtetem Gesichtsfeld. Ich muss hier noch vorausschicken, dass ich im Schätzen von absoluten Sterngrössen nur sehr wenig Uebung besitze; aus diesem Grunde hielt ich es für das beste, von den mit der Argelander'schen Grössenscala gewiss sehr gut übereinstimmenden Grössenschätzungen des Herrn Prof. Krüger auszugehen. Für die ganz hellen Sterne (also hellere als 8. Gr.) wurden dieselben sogar unverändert herüber genommen, weil mir hiefür Vergleichungsobjekte fehlten. Zur Vergleichung habe ich übrigens die Krüger'schen Grössenangaben, mit einem * versehen, in die nachfolgende Tabelle ebenfalls mit aufgenommen.

Stern	Beob. Grösse	Mittel	Stern	Beob. Grösse	Mittel	Stern	Beob. Grösse	Mittel	Stern	Beob. Grösse	Mittel
1	6.5*; 6.5	6.5	24	11.5; 11.5	11.5	49 ^a	11.5	11.5	78	10.2; 11.5	10.8
2	9.5*; 9.5	9.5	24 ^a	12.0; 12.2	12.1	50	9.8; 10.0	9.9	79	9.7; 9.9	9.8
3	11.0; 10.5; 10.2 . . .	10.6	25	9.3*; 9.5; 9.3 . . .	9.4	51	9.6; 10.0	9.8	80	9.8	9.8
4	9.5*; 10.0; 9.8; 9.8; 9.7	9.8	26	9.8; 9.7; 9.8	9.8	52	8.1*; 8.1	8.1	81	10.2; 10.2	10.2
5	9.6*; 9.5	9.5	27	9.1*; 9.2	9.2	53	9.1*; 9.2; 9.2	9.2	82	10.0; 10.0	10.0
6	9.0*; 9.0	9.0	28	10.5; 9.7; 10.2 . . .	10.1	54	9.5*; 9.5; 9.5; 9.3 . .	9.4	83	9.4*; 9.5; 9.4 . . .	9.4
7	9.1*; 9.1	9.1	29	10.2; 9.6; 9.8	9.9	55 ^a	9.8; 9.8	9.8	84	9.8; 10.0	9.9
8	12.0; 11.5	11.8	30	8.6*; 8.6	8.6	55 ^a	10.3	10.3	85	9.5* 9.7; 9.5 . . .	9.6
9	11.0	11.0	31	10.0; 9.5; 9.8	9.8	56	9.5; 9.5	9.5	86	10.2; 10.2	10.2
10	11.0	11.0	32	9.8; 9.6; 9.8	9.7	57	9.1*; 9.2; 9.2	9.2	87	10.8; 10.5	10.7
10 ^a	11.2	11.2	32 ^a	10.5; 10.2	10.3	58	9.5; 9.8	9.7	88	10.4; 10.0	10.2
11	9.5*; 9.5; 9.5	9.5	32 ^b	11.0	11.0	59	9.7; 10.0	9.8	89	11.0; 10.5	10.8
12	9.5*; 9.5; 9.5	9.5	32 ^c	11.5	11.5	60	9.8; 10.0	9.9	90	10.8; 10.3	10.6
12 ^a	12.0	12.0	33	9.8; 10.2; 10.1 . . .	10.0	61	10.0; 10.3	10.2	91	7.9*; 7.5; 7.5; 7.8 .	7.6
13	11.0	11.0	34	8.4*; 8.2	8.2	62	6.6*; 6.6	6.6	92	9.5*; 9.5; 9.4 . . .	9.5
14	9.5*; 9.5; 9.5	9.5	35	9.0*; 8.8	8.8	63	7.1*; 7.1	7.1	93	9.8; 10.2	10.0
14 ^a	10.7	10.7	36	9.7; 10.0	9.8	64	9.7; 9.8	9.8	94	10.8	10.8
14 ^b	11.5	11.5	37	10.5; 10.0; 10.0; 10.0	10.1	65	8.7* 8.7; 8.7	8.7	95	10.4; 10.2	10.3
14 ^c	11.7	11.7	38 ^a	9.0*; 9.5; 9.2; 9.2 . .	9.3	66	9.4*; 9.3; 9.4	9.4	96	10.5; 10.0	10.3
15	10.0; 9.7; 9.7	9.8	38 ^b	11.0; 10.2; 10.4 . . .	10.5	67	10.4; 10.0	10.2	97	11.0; 10.2	10.6
15 ^a	12.5	12.5	38 ^b	11.0; 10.3; 10.4 . . .	10.6	67 ^a	11.0; 10.5	10.8	98	10.5; 10.4	10.5
16	10.0; 9.6; 9.7	9.8	39	9.5*; 10.0; 9.7; 9.8; 9.6	9.8	68	8.9*; 8.8; 8.9	8.9	98 ^a	12.0	12.0
17	10.2; 9.5; 9.7	9.8	40	10.5; 10.0; 9.8	10.1	69	10.0	10.0	99	11.1; 10.4	10.8
18	10.5; 10.0; 10.0 . . .	10.1	41	9.0*; 9.0; 9.2	9.1	70	8.6*; 9.0	9.0	100	10.5; 10.2	10.4
19	6.5*; 6.5	6.5	42	10.3; 10.0; 10.0; 10.0; 9.8	10.0	71	8.5*; 8.8	8.8	101	10.7; 10.2	10.5
19 ^a	9.8; 9.8; 9.8	9.8	43	9.1*; 9.5; 9.3; 9.2; 9.0	9.2	72	9.5*; 9.5	9.5	102	10.5; 10.5	10.5
19 ^b	10.8; 10.0; 10.2 . . .	10.3	44	9.0*; 9.5; 9.0; 9.0; 9.1	9.1	73	9.8; 10.0	9.9	103	11.0; 11.0	11.0
20	10.0; 9.8	9.9	45	9.4*; 9.0; 9.0	9.0	74	7.2*; 8.2; 7.2	7.7	104	9.8; 10.5	10.1
21	10.7; 10.5	10.6	46	9.6; 10.0	9.8	75	8.2*; 8.2; 8.2; 8.8 . .	8.4	105	9.5*; 9.7; 9.5 . . .	9.6
22	11.5; 11.7; 9.8 (½) . .	11.2	47	9.5; 9.7	9.6	76	10.5; 10.0; 10.0; 10.0	10.1	106	11.0	11.0
22 ^a	12.5; 12.0; 10.2 (½) . .	11.8	48	9.2*; 9.2; 9.2	9.2	77	10.5; 10.0; 9.8; 9.8 .	10.0	107	11.0	11.0
23	10.0; 10.5; 10.0 . . .	10.2	49	10.0; 10.2;	10.1						

Declination.

Autorität	Beob. Decl.			Epoche		Anzahl der Beob.	Präcession	Systemat. Verbessg.	Decl. 1890.0	Gew.	Aus- gegl.
				des Cat.	der Beob.						
1. Bradley (Auwers)	55	59	12.1	1755	1753.0	1	+ 38 23.79	0.00	56 37 35.89	1.0	37.04
2. Piazzì . . .	56	12	6.0	1800	1804.9	5	25 29.59	+ 0.51	36.10	1.5	36.38
3. Groombridge .	14	59.0		1810	1811.0	6	22 38.38	+ 0.49	37.87	1.0	36.30
4. Taylor . . .	22	4.51		1835	1837.0	3	15 31.68	+ 0.52	36.71	1.0	35.97
5. Johnson . . .	24	54.2		1845	1842.2	4	12 41.55	+ 0.18	35.93	3.0	35.90
6. Robinson . . .	23	25.39		1840	1852.9	3	14 6.57	- 0.37	(31.59)	0	35.76
7. Main . . .	29	8.3		1860	1858.2	4	8 26.96	+ 0.25	35.51	4.5	35.70
8. Pulkowa VI .	27	44.4		1855	1863.0	4	9 51.75	0.00	36.15	9.0	35.64
9. Bonn VI . . .	27	43.88		1855	1863.4	12	9 51.75	- 0.06	35.57	8.0	35.63
10. Brüssel . . .	30	33.2		1865	1864.2	5	7 2.26	(0)	35.46	6.0	35.63
11. Yarnall . . .	29	9.2		1860	1866.9	2	8 26.96	+ 0.10	36.26	4.0	35.59
12. Krüger, Zonen.	33	21.7		1875	1870.1	3	4 13.11	0.00	34.81	4.0	35.54
13. Becker . . .	33	22.1		1875	1877.8	4	4 13.11	0.00	35.21	12.0	35.45

Da die nach ihrer Beobachtungsepoche geordneten Declinationen eine schwache Eigenbewegung vermuthen liessen, habe ich dieselben unter Annahme einer solchen ausgeglichen und erhalten

$$\delta 1890.0 = 56^{\circ} 37' 35''.29 \pm 0''.16$$

$$\text{Jährl. E. B.} = - 0''.0128 \pm 0''.0069$$

Es sind demnach die Positionen des Hauptsternes 1 für die Epoche 1890.0

$$\alpha = 2^{\text{h}} 11^{\text{m}} 21''.121$$

$$\delta = 56^{\circ} 37' 35''.29$$

Unter Benützung der eben erhaltenen absoluten Positionen des Nullpunktes der sämtlichen Differenzen, sowie der ausgeglichenen Werthe dieser letzteren (S. 66 bis 72) ergab sich das nachfolgende Sternverzeichniss, zu dem vielleicht noch zu bemerken wäre, dass die Präcessionen (nach Struve) und deren hundertjährige Aenderungen unter Benutzung kleiner Hilfstafeln berechnet wurden und dass für alle Sterne die Coefficienten für die von der dritten Potenz der Zeit abhängigen Glieder + 0.029 und - 0.348 sind.

Verzeichniss der Positionen von 126 Sternen des Sternhaufens 38h Persei für 1890.0

Nr.	Grösse	AR 1890.0	Präcession 1890	Var. Saec.	δ 1890.0	Präcession 1890	Var. Saec.
		^h ^m ^s	^s	^s	[°] ['] ^{''}	^{''}	^{''}
104	10.1	2 8 51.921	+ 4.1503	+ 0.0723	56 31 29.42	+ 16.966	- 0.330
69	10.0	2 9 3.007	4.1545	0.0726	56 35 33.22	16.957	0.331
63	7.1	2 9 5.498	4.1517	0.0723	56 31 0.96	16.955	0.330
62	6.6	2 9 10.606	4.1534	0.0724	56 32 34.65	16.951	0.331
68	8.9	2 9 16.054	4.1561	0.0726	56 37 5.03	16.947	0.331
64	9.8	2 9 18.730	+ 4.1562	+ 0.0725	56 35 15.22	+ 16.945	- 0.331
106	11.0	2 9 38.802	4.1589	0.0726	56 35 28.87	16.930	0.332
107	11.0	2 9 43.840	4.1596	0.0726	56 35 36.35	16.925	0.332
102	10.5	2 9 45.047	4.1568	0.0723	56 31 22.11	16.924	0.332
103	11.0	2 9 51.447	4.1573	0.0723	56 30 49.59	16.919	0.332

Nr.	Grösse	AR 1890.0	Präcession 1890	Var. Saec.	δ 1890.0	Präcession 1890.0	Var. Saec.
		^h ^m ^s	^s	^s	^o ['] ["]	["]	["]
66	9.4	2 9 53.215	+4.1600	+0.0725	56 34 27.95	+16.918	-0.333
100	10.4	2 9 55.305	4.1588	0.0724	56 32 19.76	16.916	0.333
70	9.0	2 9 56.551	4.1651	0.0729	56 41 17.55	16.915	0.334
67	10.2	2 9 57.392	4.1609	0.0726	56 35 4.73	16.915	0.333
101	10.5	2 9 57.496	4.1585	0.0723	56 31 33.49	16.914	0.333
67 ^a	10.8	2 10 1.178	+4.1617	+0.0726	56 35 30.88	+16.912	-0.333
99	10.8	2 10 3.177	4.1610	0.0725	56 34 7.94	16.911	0.333
65	8.7	2 10 7.757	4.1620	0.0726	56 34 46.51	16.906	0.333
95	10.3	2 10 14.616	4.1644	0.0727	56 37 3.25	16.901	0.334
61	10.2	2 10 27.478	4.1703	0.0730	56 43 7.96	16.891	0.336
94	10.8	2 10 28.924	+4.1608	+0.0722	56 29 15.13	+16.890	-0.334
50	9.9	2 10 29.136	4.1676	0.0728	56 39 3.38	16.890	0.336
98 ^a	12.0	2 10 29.356	4.1713	0.0731	56 43 37.	16.890	0.336
98	10.5	2 10 31.824	4.1713	0.0731	56 43 55.40	16.888	0.336
48	9.2	2 10 32.170	4.1684	0.0728	56 39 39.09	16.888	0.336
54	9.4	2 10 33.898	+4.1702	+0.0730	56 41 54.25	+16.886	-0.336
49	10.1	2 10 34.768	4.1680	0.0728	56 38 39.28	16.885	0.336
56	9.5	2 10 36.121	4.1717	0.0731	56 43 37.21	16.884	0.336
49 ^a	11.5	2 10 36.854	4.1680	0.0728	56 38 8.88	16.884	0.335
36	9.8	2 10 37.591	4.1641	0.0725	56 32 27.37	16.883	0.335
35	8.8	2 10 40.659	+4.1640	+0.0724	56 31 45.60	+16.881	-0.335
34	8.2	2 10 40.951	4.1628	0.0723	56 30 0.44	16.880	0.335
47	9.6	2 10 41.889	4.1695	0.0728	56 39 28.34	16.880	0.336
46	9.8	2 10 43.705	4.1694	0.0728	56 39 0.64	16.878	0.336
96	10.3	2 10 44.291	4.1732	0.0731	56 44 24.20	16.878	0.336
52	8.1	2 10 44.827	+4.1716	+0.0730	56 41 54.39	+16.877	-0.336
51	9.8	2 10 45.245	4.1711	0.0730	56 41 8.81	16.877	0.336
45	9.0	2 10 46.838	4.1694	0.0728	56 38 27.58	16.876	0.335
97	10.6	2 10 49.174	4.1739	0.0731	56 44 26.13	16.874	0.336
53	9.2	2 10 49.377	4.1722	0.0730	56 42 4.34	16.874	0.336
79	9.8	2 10 50.218	+4.1753	+0.0732	56 48 42.13	+16.873	-0.337
55 ^a	10.3	2 10 50.454	4.1731	0.0731	56 43 3.11	16.873	0.337
55	9.8	2 10 50.636	4.1732	0.0731	56 43 15.16	16.872	0.337
33	10.0	2 10 56.179	4.1657	0.0724	56 31 25.92	16.868	0.336
73	9.9	2 10 56.520	4.1768	0.0733	56 47 15.08	16.868	0.337
27	9.2	2 10 57.473	+4.1685	+0.0726	56 35 28.50	+16.867	-0.336
78	10.8	2 10 58.239	4.1763	0.0732	56 46 15.58	16.866	0.337
31	9.8	2 11 0.024	4.1678	0.0725	56 33 47.15	16.865	0.336
58	9.7	2 11 2.356	4.1751	0.0731	56 43 54.20	16.864	0.337
84	9.9	2 11 3.709	4.1653	0.0722	56 29 27.05	16.862	0.336
71	8.8	2 11 4.053	+4.1772	+0.0733	56 46 33.98	+16.862	-0.337
41	9.1	2 11 4.604	4.1710	0.0727	56 37 32.67	16.862	0.336
57	9.2	2 11 4.615	4.1754	0.0731	56 43 51.03	16.862	0.337
30	8.6	2 11 5.199	4.1682	0.0725	56 33 28.23	16.861	0.336
59	9.8	2 11 5.565	4.1744	0.0730	56 42 20.09	16.861	0.337
23	10.2	2 11 6.345	+4.1706	+0.0727	56 36 45.16	+16.860	-0.336
81	10.2	2 11 6.462	4.1666	0.0724	56 30 54.09	16.860	0.336
25	9.4	2 11 6.543	4.1696	0.0726	56 35 16.03	16.860	0.336
24 ^a	12.1	2 11 6.602	4.1703	0.0727	56 36 14.05	16.860	0.336
26	9.8	2 11 6.877	4.1695	0.0726	56 34 59.33	16.860	0.336

Nr.	Grösse	AR 1890.0	Präcession 1890	Var. Saec.	Decl. 1890.0	Präcession 1890	Var. Saec.
		^h ^m ^s	^s	^s	[°] ['] ["]	["]	["]
14 ^b	11.5	2 11 7.392	+ 4.1718	+ 0.0728	56 38 7.62	+ 16.859	— 0.336
14 ^c	11.7	2 11 7.9	4.1717	0.0728	56 38 2.85	16.859	0.336
14 ^a	10.7	2 11 7.976	4.1717	0.0728	56 37 59.04	16.859	0.336
24	11.5	2 11 9.825	4.1707	0.0727	56 36 11.74	16.858	0.336
60	9.9	2 11 10.285	4.1746	0.0730	56 41 42.42	16.857	0.337
14	9.5	2 11 10.610	+ 4.1719	+ 0.0728	56 37 48.83	+ 16.857	— 0.337
16	9.8	2 11 11.005	4.1727	0.0728	56 38 56.18	16.857	0.337
22	11.2	2 11 11.225	4.1715	0.0727	56 37 8.13	16.856	0.337
15	9.8	2 11 12.355	4.1726	0.0728	56 38 33.30	16.856	0.337
82	10.0	2 11 12.936	4.1674	0.0724	56 30 51.81	16.855	0.337
28	10.1	2 11 13.192	+ 4.1740	+ 0.0729	56 40 18.18	+ 16.855	— 0.337
22 ^a	11.8	2 11 13.668	4.1718	0.0727	56 37 9.83	16.854	0.337
15 ^a	12.5	2 11 14.067	4.1729	0.0728	56 38 39.83	16.854	0.337
13	11.0	2 11 14.383	4.1723	0.0728	56 37 44.89	16.854	0.337
32 ^a	10.3	2 11 15.190	4.1699	0.0725	56 34 10.32	16.853	0.337
10 ^a	11.2	2 11 15.383	+ 4.1724	+ 0.0728	56 37 38.77	+ 16.853	— 0.337
12 ^a	12.0	2 11 15.425	4.1729	0.0728	56 38 17.86	16.853	0.337
17	9.8	2 11 15.578	4.1733	0.0728	56 38 53.80	16.853	0.337
12	9.5	2 11 15.602	4.1728	0.0728	56 38 9.39	16.853	0.337
11	9.5	2 11 16.837	4.1723	0.0727	56 38 11.53	16.852	0.337
10	11.0	2 11 16.882	+ 4.1727	+ 0.0728	56 37 49.91	+ 16.852	— 0.337
32	9.7	2 11 17.427	4.1700	0.0725	56 33 54.32	16.852	0.337
18	10.1	2 11 17.475	4.1732	0.0728	56 38 30.02	16.851	0.337
29	9.9	2 11 18.096	4.1745	0.0729	56 40 10.66	16.851	0.337
32 ^c	11.5	2 11 18.699	4.1704	0.0725	56 34 50.58	16.851	0.337
9	11.0	2 11 19.827	+ 4.1731	+ 0.0728	56 37 48.28	+ 16.850	— 0.337
32 ^b	11.0	2 11 20.632	4.1711	0.0726	56 34 48.91	16.849	0.337
1	6.5	2 11 21.121	4.1731	0.0728	56 37 35.29	16.849	0.337
105	9.6	2 11 22.572	4.1659	0.0721	56 26 58.58	16.848	0.336
2	9.5	2 11 23.081	4.1729	0.0727	56 37 1.47	16.847	0.337
21	10.6	2 11 23.198	+ 4.1738	+ 0.0728	56 38 19.71	+ 16.847	— 0.337
20	9.9	2 11 23.491	4.1740	0.0728	56 38 32.21	16.847	0.337
3	10.6	2 11 25.440	4.1732	0.0727	56 36 59.91	16.845	0.337
5	9.5	2 11 25.790	4.1736	0.0728	56 37 34.24	16.845	0.337
7	9.1	2 11 26.956	4.1734	0.0727	56 37 5.58	16.844	0.337
6	9.0	2 11 27.095	+ 4.1736	+ 0.0727	56 37 18.08	+ 16.844	— 0.337
83	9.4	2 11 27.877	4.1692	0.0724	56 30 57.84	16.843	0.337
4	9.8	2 11 30.152	4.1739	0.0727	56 37 11.91	16.842	0.337
19	6.5	2 11 30.252	4.1756	0.0729	56 39 37.60	16.841	0.338
19 ^a	9.8	2 11 32.840	4.1765	0.0729	56 40 27.84	16.839	0.338
80	9.8	2 11 33.406	+ 4.1794	+ 0.0731	56 44 26.34	+ 16.839	— 0.338
8	11.8	2 11 34.350	4.1743	0.0727	56 36 58.30	16.838	0.338
37	10.1	2 11 39.144	4.1756	0.0728	56 37 58.84	16.835	0.338
85	9.6	2 11 40.889	4.1701	0.0723	56 29 46.56	16.833	0.337
39	9.8	2 11 42.578	4.1749	0.0727	56 36 21.78	16.832	0.338
86	10.2	2 11 42.595	+ 4.1706	+ 0.0723	56 30 16.56	+ 16.832	— 0.338
44	9.1	2 11 43.176	4.1734	0.0725	56 34 11.55	16.831	0.338
38	9.3	2 11 43.765	4.1760	0.0728	56 37 47.14	16.831	0.338
19 ^b	10.3	2 11 44.939	4.1783	0.0730	56 40 54.05	16.830	0.338
38 ^a	10.5	2 11 45.216	4.1769	0.0728	56 38 45.99	16.830	0.338

Nr.	Grösse	AR 1890.0	Präcession 1890	Var. Saec.	δ 1890.0	Präcession 1890.0	Var. Saec.
		^h ^m ^s	^s	^s	^o ['] ["]	["]	["]
40	10.1	2 11 45.263	+ 4.1753	+ 0.0727	56 36 34.12	+ 16.830	- 0.338
38 ^b	10.6	2 11 45.431	4.1773	0.0728	56 39 18.31	16.830	0.338
72	9.5	2 11 54.490	4.1829	0.0732	56 45 43.81	16.822	0.340
43	9.2	2 11 56.511	4.1757	0.0726	56 35 1.64	16.821	0.339
92	9.5	2 11 59.620	4.1713	0.0722	56 28 16.64	16.818	0.338
90	10.6	2 12 1.839	+ 4.1734	+ 0.0724	56 30 48.99	+ 16.817	- 0.339
89	10.8	2 12 1.901	4.1727	0.0723	56 29 45.59	16.816	0.339
42	10.0	2 12 4.120	4.1772	0.0727	56 36 10.81	16.816	0.339
88	10.2	2 12 4.208	4.1734	0.0723	56 30 28.71	16.816	0.339
74	7.7	2 12 11.026	4.1870	0.0734	56 48 37.80	16.809	0.340
87	10.7	2 12 15.301	+ 4.1746	+ 0.0723	56 30 8.28	+ 16.808	- 0.340
77	10.0	2 12 21.973	4.1802	0.0727	56 37 0.96	16.801	0.340
76	10.1	2 12 27.998	4.1805	0.0727	56 36 17.99	16.796	0.340
75	8.4	2 12 31.644	4.1803	0.0726	56 35 28.78	16.793	0.341
91	7.6	2 12 45.347	4.1776	0.0723	56 29 10.10	16.782	0.340
93	10.0	2 12 50.511	4.1788	0.0723	56 30 4.16	16.777	0.341

Vergleichungen.

Zur Vergleichung der beobachteten Differenzen boten sich, wie schon früher bemerkt wurde, ausser den von Herrn Prof. Krüger ausgeführten Beobachtungen des gleichen Sternhaufens am Bonner Heliometer noch diejenigen Lamont's am hiesigen Refractor und endlich Meridianbeobachtungen mehrerer hellen Sterne des Sternhaufens auf verschiedenen Sternwarten.

1. Vergleichung mit Krüger.

Herr Prof. Krüger hat aus den von ihm gemessenen Distanzen und Positionswinkeln die Coordinaten des am Schluss seiner Abhandlung mitgetheilten Verzeichnisses von 43 Sternen für das mittlere Aequinoctium 1855.0 berechnet; die mittlere Epoche seiner Beobachtungen dagegen ist etwa 1862.0. Ich habe deshalb, da Herr Krüger die Bessel'sche Präcessionsconstante benutzte, die für 1855.0 gegebenen Positionen desselben zunächst mit der Bessel'schen Präcession auf 1860.0 und hierauf mit der gegenwärtig wohl mehr gebräuchlichen Struve'schen Präcessionsconstanten auf das mittlere Aequinoctium 1890.0 reducirt. Bei zwei Sternen des Krüger'schen Verzeichnisses habe ich noch zwei Druck- oder Schreibfehler aufgefunden; nach S. 21, bezw. S. 19 der Krüger'schen Abhandlung sind dies folgende:

bei Stern Nr. 20, Declination: statt $56^{\circ} 21' 43''.52$ muss stehen $56^{\circ} 21' 53''.52$

» » » 6, Rectascension: » 32 8 0.23 » » 32 7 59.83

Ich habe dann aus dem, in obenerwähnter Weise auf 1890.0 reducirten Krüger'schen Verzeichniss die Differenzen der Positionen gegen den auch dort mit Nr. 1 bezeichneten hellsten Stern berechnet und erhielt damit folgende Vergleichungen, denen ich zur besseren Uebersicht noch die genäherten Distanzen und Positionswinkel der einzelnen Sterne gegen den Hauptstern 1 beige-fügt habe.

Nr.		Distz.	Pos. W.	Rectascensionsdifferenzen			Declinationsdifferenzen		
O.	K.			Krüger	Oertel	K-O	Krüger	Oertel	K-O
		"	°	m s	m s	s	"	"	"
63	19	1188	70.6	- 2 15.649	- 2 15.623	- 0.026	- 6 33.94	- 6 34.33	+ 0.39
62	18	1119	74.4	- 2 10.489	- 2 10.515	+ 0.026	- 5 0.42	- 5 0.64	+ 0.22
68	34	1033	88.3	- 2 4.968	- 2 5.067	+ 0.099	- 0 30.22	- 0 30.26	+ 0.04
66	29	750	75.5	- 1 27.871	- 1 27.906	+ 0.035	- 3 7.00	- 3 7.34	+ 0.34
70	30	732	107.7	- 1 24.442	- 1 24.570	+ 0.128	+ 3 42.18	+ 3 42.26	- 0.08
65	28	629	74.4	- 1 13.375	- 1 13.364	- 0.011	- 2 48.38	- 2 48.78	+ 0.40
48	27	432	107.1	- 0 48.827	- 0 48.951	+ 0.124	+ 2 4.09	+ 2 3.80	+ 0.29
54	42	468	123.6	- 0 47.062	- 0 47.223	+ 0.161	+ 4 19.36	+ 4 18.96	+ 0.40
35	20	484	43.7	- 0 40.488	- 0 40.462	- 0.026	- 5 49.06	- 5 49.69	+ 0.63
34	5	563	36.1	- 0 40.249	- 0 40.170	- 0.079	- 7 34.47	- 7 34.85	+ 0.38
52	4	396	130.9	- 0 36.170	- 0 36.294	+ 0.124	+ 4 19.05	+ 4 19.10	- 0.05
45	14	288	100.5	- 0 34.237	- 0 34.283	+ 0.046	+ 0 52.41	+ 0 52.29	+ 0.12
53	15	375	135.8	- 0 31.601	- 0 31.744	+ 0.143	+ 4 29.14	+ 4 29.05	+ 0.09
27	6	233	57.0	- 0 23.626	- 0 23.648	+ 0.022	- 2 6.63	- 2 6.79	+ 0.16
71	24	557	165.4	- 0 16.972	- 0 17.068	+ 0.096	+ 8 58.57	+ 8 58.69	- 0.12
57	25	400	160.1	- 0 16.355	- 0 16.506	+ 0.151	+ 6 15.74	+ 6 15.74	0.00
41	9	136	88.9	- 0 16.460	- 0 16.517	+ 0.057	- 0 2.41	- 0 2.62	+ 0.21
30	13	280	28.0	- 0 15.933	- 0 15.922	- 0.011	- 4 6.88	- 4 7.06	+ 0.18
25	23	184	40.8	- 0 14.585	- 0 14.578	- 0.007	- 2 18.86	- 2 19.26	+ 0.40
14	8	88	98.9	- 0 10.477	- 0 10.511	+ 0.034	+ 0 13.59	+ 0 13.54	+ 0.05
12	17	57	126.8	- 0 5.456	- 0 5.519	+ 0.063	+ 0 34.24	+ 0 34.10	+ 0.14
11	16	52	135.7	- 0 4.224	- 0 4.284	+ 0.060	+ 0 36.39	+ 0 36.24	+ 0.15
105	46	637	358.9	+ 0 1.358	+ 0 1.451	- 0.093	- 10 36.19	- 10 36.71	+ 0.52
2	10	38	334.5	+ 0 1.992	+ 0 1.960	+ 0.032	- 0 33.56	- 0 33.82	+ 0.26
5	3	39	271.6	+ 0 4.714	+ 0 4.669	+ 0.045	- 0 0.70	- 0 1.05	+ 0.35
7	d	57	301.7	+ 0 5.821	+ 0 5.835	- 0.014	- 0 29.52	- 0 29.71	+ 0.19
6	d	52	289.3	+ 0 5.937	+ 0 5.974	- 0.037	- 0 16.82	- 0 17.21	+ 0.39
83	22	401	352.0	+ 0 6.682	+ 0 6.756	- 0.074	- 6 37.10	- 6 37.45	+ 0.35
4	36	78	287.4	+ 0 9.129	+ 0 9.031	+ 0.098	- 0 23.14	- 0 23.38	+ 0.24
19	2	144	211.6	+ 0 9.213	+ 0 9.131	+ 0.082	+ 2 2.46	+ 2 2.31	+ 0.15
85	43	496	340.8	+ 0 19.597	+ 0 19.768	- 0.171	- 7 48.04	- 7 48.73	+ 0.69
39	37	192	247.5	+ 0 21.533	+ 0 21.457	+ 0.076	- 1 13.25	- 1 13.51	+ 0.26
44	11	273	318.2	+ 0 22.041	+ 0 22.055	- 0.014	- 3 23.33	- 3 23.74	+ 0.41
38	7	187	266.4	+ 0 22.674	+ 0 22.644	+ 0.030	+ 0 12.14	+ 0 11.85	+ 0.29
72	35	561	209.4	+ 0 33.522	+ 0 33.369	+ 0.153	+ 8 8.70	+ 8 8.52	+ 0.18
43	21	330	287.7	+ 0 35.323	+ 0 35.390	- 0.067	- 2 33.32	- 2 33.65	+ 0.33
92	44	643	330.3	+ 0 38.413	+ 0 38.499	- 0.086	- 9 18.32	- 9 18.65	+ 0.33
74	12	780	211.8	+ 0 50.092	+ 0 49.905	+ 0.187	+ 11 2.66	+ 11 2.51	+ 0.15
75	26	596	282.3	+ 1 10.459	+ 1 10.523	- 0.064	- 2 6.19	- 2 6.51	+ 0.32
91	31	860	306.0	+ 1 24.082	+ 1 24.226	- 0.144	- 8 24.61	- 8 25.19	+ 0.58

Von den 40 Differenzen (*K-O*) sind in AR. 24 positiv, 16 negativ; in Decl. 36 positiv, 3 negativ, 1 null. Würde man schlechthin aus allen Differenzen in jeder der beiden Coordinaten das Mittel nehmen, so wäre

$$d\alpha = + 0.0288 \pm 0.0139$$

oder im Bogen grössten Kreises

$$d\alpha = + 0.24 \pm 0.12$$

und ferner

$$d\delta = + 0.26 \pm 0.03$$

und es würde, wenn man als alleinige Ursache dieser Differenzen etwa eine kleine relative Eigenbewegung des Nullpunktes annehmen würde, diese letztere in einem Positionswinkel von $42^{\circ}42.5$ (v. Nord über West gez.) stattfinden und in Distanz in etwa 26 Jahren 0.35 , pro Jahr also 0.013 betragen.

Die schlechte Uebereinstimmung der Unterschiede in den AR-Differenzen veranlasste mich jedoch zu einer strengen Ausgleichung aller Unterschiede unter Annahme einer bestimmten Form der Fehlergleichungen umsomehr, als diese Unterschiede besonders in AR. für die meisten Sterne mit ihrer Distanz vom Hauptstern zu wachsen schienen und die Wirkung der Positionswinkel auf das Vorzeichen dieser Unterschiede aus der obigen Zusammenstellung nicht ohne weiters ersichtlich ist. Indem ich zunächst die Unterschiede in beiden Coordinaten getrennt untersuchte, gab ich den Fehlergleichungen folgende Form

1) in AR:

$$\Delta\alpha \cos \delta = x + D \sin p \cdot y + D \cos p \cdot z$$

2) in Decl.:

$$\Delta\delta = x' + D \cos p \cdot y - D \sin p \cdot z$$

wo D die Distanz, p den Positionswinkel des betreffenden Sternes gegen den Hauptstern 1 bedeutet und ferner entspricht

x, x' der relativen Eigenbewegung des letzteren in AR, bzw. in Decl.

y einem etwaigen Fehler in den Distanzen

z einer Drehung des ganzen Sternhaufens.

Da $D \sin p = (\alpha' - \alpha) \cos \delta$ und $D \cos p = \delta' - \delta$ ist, kann man den obigen Fehlergleichungen auch die Form geben

$$\Delta\alpha \cos \delta = x + (\alpha' - \alpha) \cos \delta \cdot y + (\delta' - \delta) z$$

$$\Delta\delta = x' + (\delta' - \delta) y - (\alpha' - \alpha) \cos \delta \cdot z$$

und es sind alsdann die Coefficienten von y und z in beiden Gleichungen schon bekannt (vgl. die Zusammenstellungen auf S. 66 bis 72).

Um nicht zu grosse Zahlen zu erhalten, dividirte ich in beiden Systemen die Coefficienten von y und z mit 100, indem ich nunmehr unter y und z den Fehler der Distanz und den Betrag der Drehung für je 100 Secunden Distanz verstand. Damit erhielt ich die nachstehenden Fehlergleichungen:

	In AR.	In Decl.
Stern		
63	$x - 11.2 \ y - 3.9 \ z = - 0.21$	$x' - 3.9 \ y + 11.2 \ z = + 0.39$
62	$x - 10.8 \ y - 3.0 \ z = + 0.21$	$x' - 3.0 \ y + 10.8 \ z = + 0.22$
68	$x - 10.3 \ y - 0.3 \ z = + 0.82$	$x' - 0.3 \ y + 10.3 \ z = + 0.04$
66	$x - 7.3 \ y - 1.9 \ z = + 0.29$	$x' - 1.9 \ y + 7.3 \ z = + 0.34$
70	$x - 7.0 \ y + 2.2 \ z = + 1.06$	$x' + 2.2 \ y + 7.0 \ z = - 0.08$
65	$x - 6.1 \ y - 1.7 \ z = - 0.09$	$x' - 1.7 \ y + 6.1 \ z = + 0.40$
48	$x - 4.0 \ y + 1.2 \ z = + 1.02$	$x' + 1.2 \ y + 4.0 \ z = + 0.29$
54	$x - 3.9 \ y + 2.6 \ z = + 1.33$	$x' + 2.6 \ y + 3.9 \ z = + 0.40$
35	$x - 3.3 \ y - 3.5 \ z = - 0.21$	$x' - 3.5 \ y + 3.3 \ z = + 0.63$
34	$x - 3.3 \ y - 4.5 \ z = - 0.65$	$x' - 4.5 \ y + 3.3 \ z = + 0.38$
52	$x - 3.0 \ y + 2.6 \ z = + 1.02$	$x' + 2.6 \ y + 3.0 \ z = - 0.05$
45	$x - 2.8 \ y + 0.5 \ z = + 0.38$	$x' + 0.5 \ y + 2.8 \ z = + 0.12$
53	$x - 2.6 \ y + 2.7 \ z = + 1.18$	$x' + 2.7 \ y + 2.6 \ z = + 0.09$
27	$x - 2.0 \ y - 1.3 \ z = + 0.18$	$x' - 1.3 \ y + 2.0 \ z = + 0.16$
71	$x - 1.4 \ y + 5.4 \ z = + 0.79$	$x' + 5.4 \ y + 1.4 \ z = - 0.12$
57	$x - 1.4 \ y + 3.2 \ z = + 1.24$	$x' + 3.2 \ y + 1.4 \ z = 0.00$
41	$x - 1.4 \ y - 0.0 \ z = + 0.47$	$x' - 0.0 \ y + 1.4 \ z = + 0.21$
30	$x - 1.3 \ y - 2.5 \ z = - 0.09$	$x' - 2.5 \ y + 1.3 \ z = + 0.18$
25	$x - 1.2 \ y - 1.4 \ z = - 0.06$	$x' - 1.4 \ y + 1.2 \ z = + 0.40$
14	$x - 0.9 \ y + 0.1 \ z = + 0.28$	$x' + 0.1 \ y + 0.9 \ z = + 0.05$
12	$x - 0.5 \ y + 0.3 \ z = + 0.52$	$x' + 0.3 \ y + 0.5 \ z = + 0.14$

	In AR.	In Decl.
Stern		
11	$x - 0.4 y + 0.4 z = + 0.50$	$x' + 0.4 y + 0.4 z = + 0.15$
105	$x + 0.1 y - 6.4 z = - 0.77$	$x' - 6.4 y - 0.1 z = + 0.52$
2	$x + 0.2 y - 0.3 z = + 0.26$	$x' - 0.3 y - 0.2 z = + 0.26$
5	$x + 0.4 y - 0.0 z = + 0.37$	$x' - 0.0 y - 0.4 z = + 0.35$
7	$x + 0.5 y - 0.3 z = - 0.12$	$x' - 0.3 y - 0.5 z = + 0.19$
6	$x + 0.5 y - 0.2 z = - 0.31$	$x' - 0.2 y - 0.5 z = + 0.39$
83	$x + 0.6 y - 4.0 z = - 0.61$	$x' - 4.0 y - 0.6 z = + 0.35$
4	$x + 0.8 y - 0.2 z = + 0.81$	$x' - 0.2 y - 0.8 z = + 0.24$
19	$x + 0.8 y + 1.2 z = + 0.68$	$x' + 1.2 y - 0.8 z = + 0.15$
85	$x + 1.6 y - 4.7 z = - 1.41$	$x' - 4.7 y - 1.6 z = + 0.69$
39	$x + 1.8 y - 0.7 z = + 0.66$	$x' - 0.7 y - 1.8 z = + 0.26$
44	$x + 1.8 y - 2.0 z = - 0.12$	$x' - 2.0 y - 1.8 z = + 0.41$
38	$x + 1.9 y + 0.1 z = + 0.25$	$x' + 0.1 y - 1.9 z = + 0.29$
72	$x + 2.7 y + 4.9 z = + 1.26$	$x' + 4.9 y - 2.7 z = + 0.18$
43	$x + 2.9 y - 1.2 z = - 0.55$	$x' - 1.2 y - 2.9 z = + 0.33$
92	$x + 3.2 y - 5.6 z = - 0.71$	$x' - 5.6 y - 3.2 z = + 0.33$
74	$x + 4.1 y + 6.6 z = + 1.54$	$x' + 6.6 y - 4.1 z = + 0.15$
75	$x + 5.8 y - 1.3 z = - 0.53$	$x' - 1.3 y - 5.8 z = + 0.32$
91	$x + 7.0 y - 5.1 z = - 1.19$	$x' - 5.1 y - 7.0 z = + 0.58$

Aus den vorstehenden Fehlergleichungen ergaben sich zunächst in Rectascension die Normalgleichungen

$$\begin{aligned}
 + 40.00 x - 49.40 y - 22.00 z &= + 9.49 \\
 - 49.40 x + 718.88 y + 39.25 z &= - 40.94 \\
 - 22.00 x + 39.25 y + 353.52 z &= + 67.18
 \end{aligned}$$

deren Auflösung die gesuchten Unbekannten und deren mittlere Fehler wie folgt lieferte

$$\begin{aligned}
 x &= + 0.2951 \pm 0.0542 \\
 y &= - 0.0484 \pm 0.0113 \\
 z &= + 0.2138 \pm 0.0157
 \end{aligned}$$

Es wäre sonach in der Zeit von 25 Jahren, um welche im Mittel die neuen Beobachtungen von denen des Herrn Prof. Krüger abstehen werden, aus den AR-Differenzen

- a) Die Verschiebung (relative Eigenbewegung) des Nullpunktes in AR + 0.30
- b) Der Fehler für 100" Distanz - 0.0484
- c) Der Fehler der Positionswinkel, i. e. die Drehung des Sternhaufens + 7.35

In Declination fanden sich weiter folgende Normalgleichungen

$$\begin{aligned}
 + 40.00 x' - 22.00 y + 49.40 z &= + 10.33 \\
 - 22.00 x' + 353.52 y - 39.25 z &= - 20.61 \\
 + 49.40 x' - 39.25 y + 718.88 z &= + 6.35
 \end{aligned}$$

und durch deren Auflösung

$$\begin{aligned}
 x' &= + 0.2471 \pm 0.0212 \\
 y &= - 0.0441 \pm 0.0068 \\
 z &= - 0.0106 \pm 0.0049
 \end{aligned}$$

Somit aus den Declinationsdifferenzen:

- a) die relative Eigenbewegung des Nullpunktes in Declination + 0.25
- b) der Fehler für 100" Distanz - 0.0441
- c) die Drehung des Sternhaufens - 0.36

Die Ausgleichung der Unterschiede in AR. und Decl. für sich lieferte also die relative Eigenbewegung des Nullpunktes nicht wesentlich verschieden von den durch einfaches Mittelziehen

erhaltenen Werthen (S. 79); den Fehler der Distanzen in sehr guter Uebereinstimmung zu etwa $- 0''.046$ pro 100" Distanz; den Betrag der Drehung des Sternhaufens in beiden Fällen dagegen sehr verschieden, freilich auch nicht sehr sicher.

Da die Unbekannten y und z in beiden Gleichungssystemen die nämlichen sind, empfahl es sich noch, die sämtlichen 80 Fehlergleichungen zusammen zu fassen, neue Normalgleichungen aufzustellen und aus denselben die Werthe der vier Unbekannten gemeinsam und endgiltig abzuleiten. Diese neuen Normalgleichungen liessen sich aus den vorigen direct anschreiben, sie lauten:

$$\begin{array}{rclcl} + 40.00 x & & - & 49.40 y & - & 22.00 z & = & + & 9.49 \\ & + & 40.00 x' & - & 22.00 y & + & 49.40 z & = & + 10.33 \\ - 49.40 x & - & 22.00 x' & + & 1072.40 y & & & = & - 61.55 \\ - 22.00 x & + & 49.40 x' & & & + & 1072.40 z & = & + 73.53 \end{array}$$

und ihre Auflösung gibt

$$\begin{array}{l} x = + 0''.2190 \pm 0''.073 \\ x' = + 0.1524 \pm 0.073 \\ y = - 0.0442 \pm 0.014 \\ z = + 0.0660 \pm 0.014 \end{array}$$

Hält man diese letzteren Resultate fest, so liefert die Vergleichung der hiesigen neuen Messungen mit denen des Herrn Prof. Krüger folgende, nicht uninteressante Ergebnisse:

1) Der Hauptstern 1 besitzt gegen den ganzen Sternhaufen eine relative Eigenbewegung, welche nach Grösse und Richtung wie folgt gegeben ist

$$\begin{array}{ll} \text{Eigenbewegung in 25 Jahren (1887.5 - 1862.5)} & \Delta d = + 0''.267 \\ \text{also rund für 1 Jahr} & \Delta d = + 0.011 \\ \text{und zwar im Positionswinkel} & p = 55^\circ 2 \end{array}$$

Ich möchte hier daran erinnern, dass bei Ableitung der absoluten Positionen des Hauptsternes in Declination (S. 75) eine schwache, nach Süden gerichtete Eigenbewegung desselben aus den Meridianbeobachtungen hervorging. Es müsste also der ganze Sternhaufen eine stärkere, nach Süden gerichtete absolute Eigenbewegung haben, damit die relative E. B. des Nullpunktes eine nördliche werden kann. Ob dies wirklich der Fall ist, können nur die Vergleichen ausreihend vieler Meridianbeobachtungen von anderen Sternen des Sternhaufens zeigen.

2) Der von Herrn Prof. Krüger benützte Schraubenwerth des Bonner Heliometers lieferte etwas zu grosse Distanzen, seine Correction beträgt für 100" Distanz $- 0''.044$. Diese Thatsache dürfte aus den vorstehenden Vergleichen unwiderlegbar hervorgehen, indem sowohl die Rectascensionsdifferenzen, welche ich nur mit der Uhr beobachtete, als auch die Declinationsdifferenzen je für sich und auch zusammengekommen völlig übereinstimmende Werthe von y liefern. Diese letztere Uebereinstimmung glaube ich auch als ein günstiges Zeichen für die Richtigkeit des von mir bestimmten und benutzten Schraubenwerthes des hiesigen Refractormikrometers betrachten zu dürfen.

3) Eine bemerkenswerthe Drehung des ganzen Sternhaufens scheint nicht stattzufinden; jedenfalls ist dieselbe nur sehr gering, da sie nach unseren Ausgleichungen für 100" Distanz in 25 Jahren erst den Betrag von $+ 2''.27$, pro Jahr also höchstens den von $+ 0''.09$ erreicht.

2. Vergleichen mit von Lamont.

Es wurde schon Eingangs erwähnt, dass v. Lamont in der Hauptsache nur Positionswinkel gemessen hat. Einige wenige Schraubenmessungen und die einzige mit der Uhr gemessene AR-Differenz, welche sich auf S. 316 des XVII. Bandes der „Annalen der Münchener Sternwarte“ abgedruckt finden, möchte ich vorweg erledigen. Zunächst ergaben sich noch durch Vergleichung der Lamont'schen Originalaufschreibungen mit S. 316 des eben erwähnten Bandes folgende Verbesserungen zu demselben:

Zeile 12 v. unten sind die Buchstaben x und y mit einander zu vertauschen

" 9 " " statt Nr. 3 ist zu lesen Nr. 7

" 8 " " bei Nr. 2 statt $+1''26^{\delta}$ ist zu lesen $+1''26.5^{\delta}$
und entsprechend statt $+17''28$ ist zu lesen $+17''34$

Nach diesen Vorausschickungen gehe ich zur Vergleichung der, mit Ausnahme der Differenz 1—41, welche auf 10 einfachen Fadendurchgängen beruht, nur durch je eine einzige Schraubeneinstellung gemessenen Coordinaten v. Lamont's über. Ich habe dieselben mit Hilfe der Ausdrücke

$$\Delta\alpha \cos \delta = + 0.3650 \frac{(\alpha' - \alpha)''}{100} + 0.5024 \frac{(\delta' - \delta)''}{100}$$

$$\Delta\delta = - 0.2773 \frac{(\alpha' - \alpha)''}{100}$$

auf das mittlere Aequinoctium 1890.0 reducirt und erhielt

a. von Lamont—Oertel.

Nr.		Distz.	Pos.W.	Rectascensionsdifferenzen			Declinationsdifferenzen		
O.	v. L.			v. Lamont	Oertel	v. L.—O.	v. Lamont	Oertel	v. L.—O.
41	41	136	88.9	— 136.09	— 136.29	+ 0.20	—	—	—
19	19	144	211.6	+ 77.13	+ 75.31	+ 1.82	+ 125.36	+ 122.31	+ 3.05
4	10	78	287.4	—	—	—	— 22.01	— 23.38	+ 1.37
6	6	52	289.3	+ 50.41	+ 49.30	+ 1.11	— 15.77	— 17.21	+ 1.44
7	7	57	301.7	—	—	—	— 28.51	— 29.71	+ 1.20
2	2	38	334.5	+ 17.24	+ 16.17	+ 1.07	— 31.58	— 33.82	+ 2.24
20	25	60	199.0	+ 19.88	+ 19.55	+ 0.33	+ 56.43	+ 56.92	— 0.49
18	57	62	151.2	— 27.72	— 30.08	+ 2.36	+ 56.56	+ 54.73	+ 1.83
12 ^a	54	63	132.2	— 44.56	— 46.99	+ 2.43	+ 43.30	+ 42.57	+ 0.73
13	34	56	99.8	— 53.63	— 55.60	+ 1.97	+ 11.53	+ 9.60	+ 1.93
22 ^a	38	67	67.5	— 80.62	— 81.67	+ 1.05	— 25.83	— 27.16	+ 1.33
16	50	116	134.1	— 82.14	— 83.45	+ 1.31	+ 81.25	+ 80.89	+ 0.36
14	47	88	98.9	— 86.47	— 86.73	+ 0.26	+ 15.32	+ 13.54	+ 1.78

Im Mittel aus 11, bezw. 12 gemeinschaftlichen Differenzen folgt sonach aus der obigen Vergleichung

$$\text{in AR. } v. L.—O. = + 1''.265$$

$$\text{„ Decl. } v. L.—O. = + 1''.398$$

und es würde hieraus sich eine relative Eigenbewegung des Nullpunktes ergeben, welche im Positionswinkel $42^{\circ}8$ erfolgte und in 52 Jahren den Betrag von $1''.885$, pro Jahr also rund $0''.036$ erreichen würde, d. i. über dreimal soviel, als S. 81 die Vergleichungen mit Herrn Krüger lieferten. Bei der grossen Ungenauigkeit, welche den Lamont'schen Coordinaten anhaftet (die ja mit einer einzigen Ausnahme sämtlich nur auf einer einzigen Schraubeneinstellung beruhen), wird man auf diese Disharmonie nicht viel Gewicht legen dürfen. Immerhin muss die Erscheinung, dass nahezu alle Differenzen das gleiche Vorzeichen haben, als eine auffallende, durch das Obige nicht ausreichend erklärbare bezeichnet werden; auch ein falscher Schraubenwerth bei v. Lamont könnte hievon nicht die Ursache sein.

Als Herr Prof. Krüger seine Beobachtungen des Sternhaufens 38 h Persei veröffentlichte, waren jene v. Lamont's noch nicht gedruckt, also Vergleichungen nicht möglich. Es dürfte deshalb von Interesse sein, für die wenigen Sterne, welche beide Beobachter gemeinschaftlich haben, die entsprechenden Vergleichungen, zunächst für die Coordinatendifferenzen, hier einzuschalten. Ich

habe diese Vergleichen für das mittlere Aequinoctium 1860.0 angestellt; indem ich die v. Lamont'schen Differenzen nach Massgabe der folgenden Quantitäten verbesserte

$$\Delta\alpha \cos \delta = + 0.1600 \frac{(\alpha' - \alpha)''}{100} + 0.2180 \frac{(\delta' - \delta)''}{100}$$

$$\Delta\delta = - 0.1206 \frac{(\alpha' - \alpha)''}{100}$$

erhielt ich

b. von Lamont—Krüger.

Nr.		Distz.	Pos. W.	Rectascensionsdifferenzen			Declinationsdifferenzen		
K.	v. L.			v. Lamont	Krüger	v. L.—K.	v. Lamont	Krüger	v. L.—K.
9	41	136	88.9	— 135.79	— 135.83	+ 0.04	—	—	—
2	19	144	211.6	+ 76.62	+ 75.60	+ 1.02	+ 125.48	+ 122.67	+ 2.81
36	10	78	287.4	—	—	—	— 21.89	— 22.93	+ 1.04
d	6	52	289.3	+ 50.36	+ 49.03	+ 1.33	— 15.69	— 16.67	+ 0.98
d	7	57	301.7	—	—	—	— 28.44	— 29.37	+ 0.93
10	2	38	334.5	+ 17.30	+ 16.53	+ 0.77	— 31.55	— 33.50	+ 1.95
8	47	88	98.9	— 86.34	— 86.49	+ 0.25	+ 15.18	+ 13.35	+ 1.83

Es folgen hieraus die Mittelwerthe

$$\text{in AR: } v. L. - K. = + 0.682$$

$$\text{in Decl.: } v. L. - K. = + 1.590$$

wonach eine relative Eigenbewegung des Hauptsternes im Positionswinkel $23^{\circ}13'$ und für 26 Jahre im Betrag von 1.730 , also pro Jahr von 0.067 stattfinden würde. Man wird diesem Resultat noch weniger Zutrauen schenken dürfen, als dem vorigen, weil die Anzahl der gemeinschaftlichen Differenzen hier auf 5, bezw. 6 herabsinkt. Dagegen fällt auch hier wieder auf, dass alle Differenzen $v. L. - K.$ positives Vorzeichen besitzen und es lässt sich also die Annahme, dass die v. Lamont'schen Schraubenmessungen durch constante Fehler entstellt seien, nicht zurückweisen. Ich unterliess es, hierüber nähere Untersuchungen anzustellen, weil mir dieselben völlig aussichtslos erschienen. Da v. Lamont alle Messungen an einem Abend ausführte, könnte recht wohl eine fehlerhafte Coincidenzbestimmung des festen und des messenden Fadens Schuld sein; auch könnten starke fortschreitende Fehler der Schraube die Messungen im obigen Sinne entstellt haben. Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, dass einem Beobachter vom Range v. Lamont's die letzteren entgangen wären.

Ich gehe nun dazu über, v. Lamont's gemessene Positionswinkel mit den aus meinen Beobachtungen berechneten zu vergleichen. Vor allem habe ich das auf S. 317 bis 323 des XVII. Bandes der Annalen der Münchener Sternwarte gedruckte Verzeichniss der v. Lamont'schen Positionswinkel an der Hand der Originalaufschreibungen näher untersucht und fand hiebei, dass dieses Verzeichniss nachfolgender Verbesserungen und Ergänzungen bedarf:

Seite 319, erste	Reihe, Zeile 22 v. unten	'statt	$45^{\circ} 59'$	muss stehen	$45^{\circ} 57'$
» 319, »	» 1 »	»	$42-58, 76^{\circ} 44'$	»	$52-58, 76^{\circ} 14'$
» 319, zweite	» 23 »	»	$58-46$	»	$38-46$
» 319, »	» 9 »	»	$93^{\circ} 38'$	»	$93^{\circ} 58'$
» 319, »	» 1 »	» nach $141^{\circ} 4'$	ist noch einzuschalten:	$141^{\circ} 7'$	
» 320, erste	» 8 »	oben: Im Original ist bemerkt	»Gewiss unrichtig! Vielleicht $10-12, \alpha$		
» 321, »	» 13 »	unten: statt	$101^{\circ} 5'$	muss stehen	$101^{\circ} 25'$

Seite 321, erste Reihe, Zeile	II	v. unten nach 108° 7' ist noch einzuschalten	108° 4'
» 321, zweite » »	10	» oben statt 66—58 muss stehen	66—68
» 322, erste » »	17	» » » 103° » »	143°
» 322, » » »	18 u. 19	» » » 102° » »	142
» 322, zweite » »	7	» » » 117° 28' » »	117° 26'
» 323, erste » »	7	» » » 66° 17' » »	66° 57'

Eine nicht unbedeutende Anzahl von Positionswinkelmessungen aus den Jahren 1841 und 1842, welche hauptsächlich für die nachfolgenden Vergleichen von Wichtigkeit sind, konnten im v. Lamont'schen Beobachtungsverzeichniss nicht abgedruckt werden, weil, wie v. Lamont am Schluss der Einleitung zu den Refractorbeobachtungen, S. 290 des XVII. Bandes der Annalen bemerkte, die beiden Refractorhefte von October 1839 bis Ende August 1842 verlegt worden waren. Diese zwei Hefte sind nunmehr wieder aufgefunden worden, sie enthalten die nachfolgenden Positionswinkelbeobachtungen unseres Objectes:

1841, März 26... 1—19.. 32° 25' — 1° 0'	1841, März 26... 6—10.. 102° 55' — 1° 0'	1842, April 21... 1—2.. 334° 27' — 46' 8
32 10	7—10.. 78 3	1—3.. 318 47
5—19.. 16 55	77 3	316 35
6—19.. 11 25	77 25	314 35
11 42	1—2.. 337 22	1—5.. 276 4
7—19.. 10 55	336 15	272 34
10—19.. 0 5	April 15.. 4—5.. 5 55	272 25
0 15	1842, April 20.. 1—2.. 334 30—46' 8	276 2
6—7.. 0 0	334 42	1—6.. 293 39
3 35	2—7.. 267 28	288 47
2 30	April 21.. 1—2.. 335 28	288 55
10—19.. 329 28	334 47	1—7.. 304 32
1—5.. 91 40	334 10	303 29
91 10	333 12	302 6
1—6.. 109 48	331 42	302 27
109 55	334 42	303 42

Die Positionswinkel v. Lamont's habe ich zunächst wegen des von ihm für jeden Abend mitgetheilten Indexfehlers des Positionskreises verbessert und dann mit Hilfe des nachfolgenden Täfelchens auf das mittlere Aequinoctium 1890.0 reducirt:

Beob. Zeit bei v. L.	Δp	Beob. Zeit bei v. L.	Δp
1836.0	+ 17.5	1839.5	+ 16.4
36.5	17.3	40.0	16.2
37.0	17.2	40.5	16.0
37.5	17.0	41.0	15.9
38.0	16.9	41.5	15.7
38.5	16.7	42.0	15.6
39.0	16.5	42.5	15.4

Weitere Verbesserungen, insbesondere eine solche wegen Refraction habe ich aus den von v. Lamont selbst angegebenen Gründen (Annalen, Bd. XVII, S. 290), wie schon früher, so auch hier nicht angebracht. Um nicht alle einzelnen Beobachtungen v. Lamont's anführen zu müssen, habe ich dieselben, soweit sie sich auf die gleichen Positionswinkel bezogen, zu Mitteln vereinigt.

In der nachfolgenden Zusammenstellung sind nun die Positionswinkel der mit v. Lamont gemeinschaftlichen Sterne, gegen den Hauptstern 1 und unter sich, enthalten: zunächst die beiderseitige Bezeichnung des verbundenen Sternpaares; dann, aus meinen Beobachtungen berechnet, die genäherte Distanz desselben; hierauf die von v. Lamont beobachteten und die aus meinen Messungen berechneten Positionswinkel; weiter die Anzahl der Beobachtungen (n) und die mittleren Fehler (μ)

der v. Lamont'schen Werthe, letztere aus den einzelnen Beobachtungen direct berechnet. Diese mittleren Fehler sind, gleichwie die ihnen unmittelbar folgenden Differenzen ($v. L.-O.$) zunächst in Bogenminuten und dann durch Multiplication mit $D \sin i'$ in Secunden des grössten Kreises ausgedrückt.

a. v. Lamont—Oertel.

Verbindung		Distanz	Positionswinkel		n	Mittl. Fehler μ		$v. L.-O.$	
Oertel	v. Lamont		v. Lamont	Oertel		in Min.	in Sec.	in Min.	in Sec.
1—2	1—2	37.5	154 4.5	154 26.3	14	+ 20.4	+ 0.22	— 21.8	— 0.24
1—3	1—3	50.2	135 21.2	134 47.4	3	36.9	0.53	+ 33.8	+ 0.50
1—4	1—10	78.1	106 50.3	107 25.0	2	17.0	0.38	— 34.7	— 0.79
1—5	1—5	38.5	92 6.4	91 34.1	11	31.8	0.36	+ 32.3	+ 0.36
1—6	1—6	52.2	109 26.0	109 14.9	7	38.3	0.59	+ 11.1	+ 0.17
1—7	1—7	56.6	122 24.6	121 40.6	7	24.2	0.40	+ 44.0	+ 0.72
1—9	1—30	16.8	141 41.2	140 35.6	5	28.3	0.14	+ 65.6	+ 0.32
1—10	1—32	37.9	113 11.7	112 40.9	2	2.5	0.03	+ 30.8	+ 0.34
1—10 ^a	1—33	47.5	94 28.2	94 12.4	2	9.0	0.12	+ 15.8	+ 0.22
1—11	1—56	50.6	136 13.5	135 43.0	3	13.9	0.20	+ 30.5	+ 0.45
1—12	1—55	56.9	126 59.3	126 49.6	2	0.0	0.00	+ 9.7	+ 0.16
1—12 ^a	1—54	63.4	133 7.3	132 10.5	1	—	—	+ 56.8	+ 1.05
1—13	1—34	56.4	99 15.7	99 48.0	2	4.5	0.07	— 32.3	— 0.53
1—14	1—47	87.8	98 42.2	98 52.5	4	12.9	0.32	— 10.3	— 0.26
1—14 ^a	1—45	111.0	102 3.3	102 21.1	1	—	—	— 17.8	— 0.58
1—15	1—52	92.7	128 44.6	128 44.0	3	8.9	0.24	+ 0.6	+ 0.02
1—15 ^a	1—53	86.9	137 22.2	137 57.6	1	—	—	— 35.4	— 0.90
1—16	1—50	116.2	133 47.3	134 6.4	3	5.0	0.18	— 19.1	— 0.65
1—17	1—59	91.1	149 54.6	149 47.1	3	8.9	0.24	+ 7.5	+ 0.20
1—18	1—57	62.4	151 42.3	151 12.4	3	17.1	0.31	+ 29.9	+ 0.54
1—19	1—19	143.6	31 44.4	31 37.3	28	3.1	0.13	+ 7.1	+ 0.30
1—20	1—25	60.2	198 29.2	198 57.5	1	—	—	— 28.3	— 0.49
1—21	1—27	46.7	201 55.3	201 5.6	2	12.0	0.16	+ 49.7	+ 0.68
1—22	1—38	86.1	71 35.3	71 36.1	1	—	—	— 0.8	— 0.02
1—22 ^a	1—37	66.6	66 52.3	67 30.8	1	—	—	— 38.5	— 0.75
1—24	1—69	125.2	48 1.0	48 8.3	3	9.0	0.32	— 7.3	— 0.26
1—24 ^a	1—68	144.8	55 27.8	55 52.0	3	5.2	0.22	— 24.2	— 1.02
1—25	1—70	184.1	40 53.1	40 50.0	1	—	—	+ 3.1	+ 0.17
1—26	1—71	195.3	37 7.1	37 1.0	1	—	—	+ 6.1	+ 0.35
1—27	1—66	232.8	57 6.1	56 59.7	1	—	—	+ 6.4	+ 0.44
1—30	1—73	279.9	28 6.1	28 1.5	1	—	—	+ 4.6	+ 0.36
1—31	1—72	287.1	37 14.1	37 22.0	1	—	—	— 7.9	— 0.66
1—37	1—13	150.6	81 14.4	81 0.1	5	3.7	0.17	+ 14.3	+ 0.63
1—38	1—12	187.2	86 22.2	86 22.3	4	2.0	0.11	— 0.1	0.00
1—41	1—41	136.3	88 55.6	88 53.9	5	5.7	0.23	+ 1.7	+ 0.07
2—3	2—3	15.5	94 59.7	95 45.6	4	34.5	0.16	— 45.9	— 0.21
2—5	2—5	39.7	34 18.7	34 18.1	2	8.5	0.10	+ 0.6	+ 0.01
2—6	2—6	37.1	62 54.2	63 22.2	3	13.8	0.15	— 28.0	— 0.30
2—7	2—7	32.2	84 29.7	82 40.6	4	40.7	0.38	+ 109.1	+ 1.03
3—5	3—5	32.8	185 3.2	184 48.6	1	—	—	+ 14.6	+ 0.14
3—6	3—6	22.7	36 55.2	36 56.0	1	—	—	— 0.8	— 0.00
3—7	3—7	13.7	66 53.3	65 37.3	1	—	—	+ 76.0	+ 0.30
4—5	10—5	42.4	121 30.2	121 48.8	3	22.9	0.28	— 18.6	— 0.23
4—6	10—6	26.0	103 20.5	103 44.6	2	69.0	0.52	— 24.1	— 0.18
4—7	10—7	27.1	76 49.8	76 30.3	6	8.7	0.07	+ 19.5	+ 0.15

Verbindung		Distanz	Positionswinkel		n	Mittl. Fehler μ		v. L.—O.	
Oertel	v. Lamont		v. Lamont	Oertel		in Min.	in Sec.	in Min.	in Sec.
4—8	10—83	37.2	111 47.6	111 26.8	5	± 21.0	± 0.23	+ 20.8	+ 0.23
4—19	10—19	145.5	179 11.9	179 40.5	3	14.3	0.60	— 28.6	— 1.21
4—37	10—13	87.8	57 38.1	57 41.2	3	7.0	0.18	— 3.1	— 0.08
5—6	5—6	20.5	148 57.5	146 19.2	4	31.8	0.19	+ 158.3	+ 0.96
5—19	5—19	128.8	15 50.9	16 36.5	1	—	—	— 45.6	— 1.70
5—21	5—27	52.3	155 51.2	154 48.7	1	—	—	+ 62.5	+ 0.95
6—7	6—7	12.6	3 26.3	5 14.6	8	31.2	0.11	— 108.3	— 0.40
6—19	6—19	141.9	10 49.3	10 34.3	2	8.5	0.35	+ 15.0	+ 0.62
7—19	7—19	154.4	10 10.9	10 8.4	1	—	—	+ 2.5	+ 0.11
7—44	7—80	219.6	142 25.8	142 24.9	7	3.8	0.24	+ 0.9	+ 0.07
8—39	83—82	77.1	117 40.9	118 16.7	4	25.8	0.58	— 35.8	— 0.80
9—10	30—32	24.4	93 30.2	93 50.3	2	23.0	0.16	— 20.1	— 0.14
9—10 ^a	30—33	37.9	75 2.2	75 27.6	1	—	—	— 25.4	— 0.28
9—21	30—27	42.0	40 49.2	41 30.2	2	44.0	0.54	— 41.0	— 0.50
10—10 ^a	32—33	16.6	50 14.2	47 59.4	1	—	—	+ 134.8	+ 0.65
10—11	32—56	23.2	179 19.2	179 1.0	5	27.0	0.18	+ 18.2	+ 0.12
10—12	32—55	22.2	154 18.7	151 32.3	2	3.5	0.02	+ 166.4	+ 1.08
10—13	32—34	21.2	77 6.2	76 19.0	4	34.8	0.21	+ 47.2	+ 0.29
10 ^a —12	33—55	30.7	185 15.2	183 22.6	1	—	—	+ 112.6	+ 1.01
10 ^a —13	33—34	10.3	127 47.0	126 33.9	4	42.5	0.13	+ 73.1	+ 0.21
10 ^a —14	33—47	40.7	105 13.2	104 19.8	1	—	—	+ 53.4	+ 0.63
10 ^a —22 ^a	33—37	32.2	25 39.2	26 3.5	2	4.0	0.04	— 24.3	— 0.23
11—12	56—55	10.4	78 10.2	78 8.2	3	16.8	0.05	+ 2.0	+ 0.01
11—12 ^a	56—54	13.3	120 26.2	118 31.3	5	10.3	0.04	+ 114.9	+ 0.44
11—15	56—52	42.9	119 52.3	120 29.6	1	—	—	— 37.3	— 0.47
11—16	56—50	65.6	132 31.2	132 52.1	2	21.0	0.40	— 20.9	— 0.40
11—17	56—59	43.5	166 33.7	166 11.9	2	8.5	0.11	+ 21.8	+ 0.27
11—18	56—57	19.2	17 17.2	15 53.2	3	23.3	0.13	+ 84.0	+ 0.47
12—13	55—34	26.5	23 0.2	22 19.0	1	—	—	+ 41.2	+ 0.32
12—14	55—47	46.0	63 30.2	63 28.2	3	20.5	0.28	+ 2.0	+ 0.03
12—15	55—52	35.9	132 45.6	131 45.4	5	25.1	0.26	+ 60.2	+ 0.63
12—15 ^a	55—53	33.0	155 33.7	157 24.9	2	54.5	0.52	— 111.2	— 1.07
12—18	55—57	25.8	36 51.2	36 49.8	2	74.0	0.56	+ 1.4	+ 0.01
12 ^a —18	54—57	20.8	56 11.2	54 16.7	1	—	—	+ 114.5	+ 0.70
13—14	34—47	31.4	97 10.7	97 12.8	2	51.5	0.48	— 2.1	— 0.00
13—15	34—52	51.2	160 12.2	160 56.2	1	—	—	— 44.0	— 0.66
14—14 ^a	47—45	24.0	116 14.7	115 9.9	2	137.5	0.95	+ 64.8	+ 0.46
14—14 ^b	47—43	32.6	124 49.7	125 17.3	2	22.5	0.21	— 27.6	— 0.26
14—15	47—52	46.7	18 19.2	17 56.2	1	—	—	+ 23.0	+ 0.31
14—22	47—38	41.0	173 50.2	172 53.7	2	8.0	0.09	+ 56.5	+ 0.67
14—22 ^a	47—37	46.5	147 2.2	147 5.8	1	—	—	— 3.6	— 0.05
14 ^a —41 ^b	47—41	52.2	72 16.2	71 56.4	1	—	—	+ 19.8	+ 0.30
14 ^a —14 ^b	45—43	9.8	149 41.2	150 41.1	2	104.0	0.30	— 59.9	— 0.17
14 ^a —41	45—41	38.3	46 51.5	46 32.0	3	41.7	0.46	+ 19.5	+ 0.22
14 ^b —41	43—41	41.8	31 39.5	33 21.0	3	22.2	0.27	— 101.5	— 1.23
15—15 ^a	52—53	15.6	63 52.8	65 10.9	5	69.8	0.32	— 78.1	— 0.36
15—16	52—50	25.4	153 4.2	154 3.1	1	—	—	— 58.9	— 0.44
15—17	52—59	33.6	52 43.0	52 21.6	5	13.2	0.13	+ 21.4	+ 0.21
15—18	52—57	42.4	94 8.3	94 26.5	2	17.0	0.21	— 18.2	— 0.22
15—28	52—62	105.1	184 15.2	183 45.9	1	—	—	+ 29.3	+ 0.89

Verbindung		Distanz	Positionswinkel		n	Mittl. Fehler μ		v. L.—O.	
Oertel	v. Lamont		v. Lamont	Oertel		in Min.	in Sec.	in Min.	in Sec.
15—29	52—61	108.2	206 22.2	205 55.6	1	—	—	+ 26.6	+ 0.83
15 ^a —16	53—50	30.1	123 12.2	122 55.3	1	—	—	+ 16.9	+ 0.15
15 ^a —18	53—57	29.8	107 26.6	109 14.3	5	+ 15.2	+ 0.13	— 107.7	— 0.93
16—17	50—59	37.8	94 42.2	93 36.6	1	—	—	+ 65.6	+ 0.72
16—28	50—62	84.0	193 33.5	192 24.1	3	9.8	0.24	+ 69.4	+ 1.70
16—29	50—61	94.7	218 43.2	218 7.7	1	—	—	+ 35.5	+ 0.98
17—18	59—57	28.5	145 48.5	146 39.5	6	22.7	0.19	— 51.0	— 0.42
17—28	59—62	86.6	167 57.2	166 52.6	1	—	—	+ 64.6	+ 1.62
17—29	59—61	79.6	195 27.2	195 6.9	1	—	—	+ 20.3	+ 0.47
18—20	57—25	49.7	87 10.3	87 28.4	1	—	—	— 18.1	— 0.26
18—21	57—27	48.3	101 37.2	102 19.2	2	40.0	0.56	— 42.0	— 0.59
19—20	19—25	86.3	220 51.3	220 42.8	1	—	—	+ 8.5	+ 0.22
19—29	19—61	105.5	108 32.9	108 15.6	3	5.2	0.16	+ 17.3	+ 0.53
19—37	19—13	123.0	143 16.6	143 24.2	5	6.1	0.21	— 7.6	— 0.27
19—38	19—12	156.9	134 41.2	134 44.7	4	1.5	0.06	— 3.5	— 0.16
20—21	25—27	10.1	188 49.7	190 56.6	2	21.5	0.06	— 126.9	— 0.37
22—22 ^a	38—37	20.2	84 53.2	85 10.8	1	—	—	— 17.6	— 0.10
22—24	38—69	57.6	191 53.7	191 34.9	2	16.5	0.28	+ 18.8	+ 0.32
22—41	38—41	57.7	114 39.3	115 11.3	1	—	—	— 32.0	— 0.54
24—25	69—70	62.0	25 38.2	25 56.6	1	—	—	— 18.4	— 0.33
24—27	69—66	110.8	67 0.7	67 1.7	2	6.5	0.21	— 1.0	— 0.03
24 ^a —25	68—70	58.0	1 18.5	359 31.1	4	20.5	0.35	+ 107.4	+ 1.81
24 ^a —27	68—66	88.1	59 19.7	58 51.4	2	2.5	0.06	+ 28.3	+ 0.72
25—26	70—71	16.9	168 51.2	170 37.2	3	22.0	0.11	— 106.0	— 0.52
25—27	70—66	75.9	99 31.0	99 27.1	4	16.1	0.36	+ 3.9	+ 0.08
25—41	70—41	137.6	353 24.2	353 19.1	1	—	—	+ 5.1	+ 0.21
26—32	71—75	108.7	127 48.2	126 42.9	1	—	—	+ 65.3	+ 2.07
26—32 ^a	71—74	84.4	126 7.2	125 30.6	1	—	—	+ 36.6	+ 0.90
26—32 ^b	71—77	114.1	95 52.2	95 14.4	1	—	—	+ 37.8	+ 1.26
26—32 ^c	71—76	98.1	94 40.2	95 7.2	1	—	—	— 27.0	— 0.78
26—41	71—41	154.5	352 54.2	353 1.4	1	—	—	— 7.2	— 0.33
27—41	66—41	137.4	25 11.2	25 21.9	3	6.6	0.26	— 10.7	— 0.43
28—29	62—61	41.1	101 15.5	100 32.4	3	32.2	0.38	+ 43.1	+ 0.51
30—32	73—75	104.4	75 38.2	75 31.6	1	—	—	+ 6.6	+ 0.20
30—32 ^a	73—74	92.7	63 24.2	62 59.6	1	—	—	+ 24.6	+ 0.67
30—41	73—41	244.5	359 6.2	358 50.9	1	—	—	+ 15.3	+ 1.10
31—41	72—41	228.7	9 42.2	9 31.2	1	—	—	+ 11.0	+ 0.73
32—44	75—80	213.5	85 22.2	85 22.2	1	—	—	0.0	0.00
37—38	13—12	39.9	107 43.6	107 3.6	7	29.8	0.35	+ 40.0	+ 0.46
37—39	13—82	101.1	164 21.5	163 44.5	3	1.4	0.04	+ 37.0	+ 1.09
38—40	12—81	74.0	171 20.9	170 23.4	3	7.5	0.16	+ 57.5	+ 1.24
38—44	12—80	215.7	1 29.9	1 17.5	3	9.0	0.56	+ 12.4	+ 0.78
39—40	82—81	25.4	60 52.8	60 55.8	3	15.5	0.11	— 3.0	— 0.02
39—44	82—80	130.3	358 1.1	357 48.8	3	8.5	0.33	+ 12.3	+ 0.47

Zieht man aus den 139 Differenzen (v. L.—O.), von denen 82 positiv, 46 negativ und 1 null sind, mit Rücksicht auf die Beobachtungszahlen das Mittel, so kommt:

$$\Delta p (v. L.—O.) = + 0''.157 \pm 0''.046$$

Der mittlere Fehler einer Differenz vom Gewichte 1, also einer auf einer einmaligen Messung v. Lamont's beruhenden Differenz beträgt ± 0.91 ; aus den von v. Lamont öfter als einmal beobachteten Positionswinkeln würde sich (durch Zusammenziehen der obigen 86 Werthe von μ mit Rücksicht auf die zugehörigen Werthe von n) der mittlere Fehler einer einfachen v. Lamont'schen Positionswinkelmessung dagegen nur zu ± 0.58 ergeben.

Dem obigen Werthe von Δp entsprechend, ergibt sich für eine Distanz von 100" in rund 50 Jahren eine Drehung des Sternhaufens um $+ 5.40$, d. i. pro Jahr rund um $+ 0.11$.

Es scheint sonach der durch Ausgleichung der Coordinatendifferenzen ($Kr. - O.$) S. 82 erhaltene Betrag für die Drehung des Sternhaufens reell zu sein.

Der Vollständigkeit halber habe ich auch für jene Sterne, welche v. Lamont und Krüger gemeinschaftlich haben, die Lamont'schen Positionswinkel auf die Epoche 1855.0 reducirt, die denselben entsprechenden Winkel aus den Krüger'schen Positionen für 1855.0 berechnet und in der gleichen Weise, wie oben, alles zusammengestellt. Ich erhielt so

b. von Lamont—Krüger.

Verbindung		Distanz	Positionswinkel		n	Mittl. Fehler μ		$v. L. - K.$	
$K.$	$v. L.$		$v. Lamont$	$Krüger$		Min.	Sec.	Min.	Sec.
1—2	1—19	143.6	31 33.0	31 37.2	28	± 3.1	± 0.13	— 4.2	— 0.17
1—3	1—5	38.5	91 55.0	90 49.5	11	31.8	0.36	+ 65.5	+ 0.73
1— d_1	1—7	56.6	122 13.2	121 22.6	7	24.2	0.40	+ 50.6	+ 0.82
1— d_2	1—6	52.2	109 14.6	108 45.4	7	38.3	0.59	+ 29.2	+ 0.44
1—6	1—66	232.8	56 54.7	56 49.2	1	—	—	+ 5.5	+ 0.37
1—7	1—12	187.2	86 10.8	86 5.7	4	2.0	0.11	+ 5.1	+ 0.28
1—8	1—47	87.8	98 30.8	98 44.9	4	12.9	0.32	— 14.1	— 0.36
1—9	1—41	136.3	88 44.2	88 47.4	5	5.7	0.23	— 3.2	— 0.12
1—10	1—2	37.5	153 53.1	153 42.8	14	20.4	0.22	+ 10.3	+ 0.11
1—13	1—73	279.9	27 54.7	27 52.5	1	—	—	+ 2.2	+ 0.17
1—16	1—56	50.6	136 2.1	136 3.0	3	13.9	0.20	— 0.9	— 0.02
1—17	1—55	56.9	126 47.9	127 3.5	2	0.0	0.00	— 15.6	— 0.26
1—23	1—70	184.1	40 41.7	40 44.8	1	—	—	— 3.1	— 0.17
1—36	1—10	78.1	106 38.9	106 53.7	2	17.0	0.49	— 14.8	— 0.34
2— d_1	19—7	154.4	9 59.5	10 13.9	1	—	—	— 14.4	— 0.65
2— d_2	19—6	141.9	10 37.9	10 46.9	2	8.5	0.35	— 9.0	— 0.37
2—7	19—12	156.9	134 29.8	134 37.0	4	1.5	0.06	— 7.2	— 0.33
3— d_2	5—6	20.5	148 46.1	147 47.8	4	31.8	0.19	+ 58.3	+ 0.35
3—10	5—2	39.7	34 7.3	34 10.8	2	8.5	0.10	— 3.5	— 0.04
3—36	5—10	42.4	121 18.8	121 28.1	3	22.9	0.28	— 9.3	— 0.11
$d_1 - d_2$	7—6	12.6	3 14.9	4 4.9	8	31.2	0.11	— 50.0	— 0.18
$d_1 - 10$	7—2	32.2	84 18.3	82 32.1	4	40.7	0.38	+ 106.2	+ 0.99
$d_1 - 36$	7—10	27.1	76 38.4	76 41.8	6	8.7	0.07	— 3.4	— 0.03
$d_2 - 10$	6—2	37.1	62 42.8	62 36.4	3	13.8	0.15	+ 6.4	+ 0.07
$d_2 - 36$	6—10	26.0	103 9.1	103 20.1	2	69.0	0.52	— 11.0	— 0.08
6—9	66—41	137.4	24 59.8	25 16.8	3	6.6	0.26	— 17.0	— 0.69
6—23	66—70	75.9	99 19.6	99 7.1	4	16.1	0.36	+ 12.5	+ 0.27
8—9	47—41	52.2	72 4.8	71 50.3	1	—	—	+ 14.5	+ 0.22
8—17	47—55	46.0	63 18.8	63 18.0	3	20.5	0.28	+ 0.8	+ 0.01
9—13	41—73	244.5	178 54.8	178 47.5	1	—	—	+ 7.3	+ 0.51
9—23	41—70	137.6	173 12.8	173 20.5	1	—	—	— 7.7	— 0.30
16—17	56—55	10.4	77 58.8	77 54.8	3	16.8	0.05	+ 4.0	+ 0.01

Die Distanzen und mittleren Fehler μ habe ich aus dem vorigen Tableau unverändert herübergenommen, weil es hiebei auf die äusserste Genauigkeit nicht ankommt. Die v. Lamont'schen Positionswinkel für das mittlere Aequinoctium 1855.0 ergeben sich aus jenen für 1890.0 durch Subtraction von 11.4.

Zieht man wieder aus den in der letzten Spalte enthaltenen Differenzen ($v. L. - K.$) das Mittel mit Rücksicht auf die v. Lamont'schen Beobachtungszahlen, so kommt hier

$$\Delta p (v. L. - K.) = + 0.083 \pm 0.069$$

sonach für eine Distanz von 100" die Drehung des Sternhaufens in 25 Jahren zu $+ 2.84$, also auch hieraus pro Jahr $= + 0.11$.

Die aus den Vergleichen ($K. - O.$) und ($v. L. - O.$) hervorgehenden Beträge dieser letzteren Grösse finden also durch das aus der Vergleichung ($v. L. - K.$) erwachsende Resultat eine sehr gute Bestätigung.

3. Vergleichen mit Meridianbeobachtungen.

Ausser dem Hauptstern 1 sind noch mehrere andere hellere Sterne des Sternhaufens an verschiedenen Sternwarten und zwar meistens gleichzeitig mit 1 im Meridian beobachtet worden. Man könnte aus diesen Beobachtungen für jeden der beteiligten Sterne dessen absolute Positionen für 1890.0 ableiten und im Zusammenhalt mit den auf S. 74 und 75 ermittelten absoluten Positionen des Sternes 1 die Coordinatendifferenzen der einzelnen Sterne gegen diesen letzteren berechnen. Ich habe es aber der Kürze der Rechnung halber vorgezogen, diese Differenzen gleich für die Epoche der Beobachtung zu bilden und dieselben auf 1890.0 zu reduciren. Aus demselben Grunde enthält die nachfolgende Zusammenstellung die schon auf das mittlere Aequinoctium 1890.0 reducirten Differenzen, von den Beobachtungszahlen n beziehen sich die in erster Reihe stehenden stets auf den Stern 1. Unter die abgeleiteten Mittelwerthe habe ich noch zur leichteren Vergleichung die von Herrn Prof. Krüger und von mir gefundenen Werthe der betreffenden Differenzen gesetzt.

1—63.

	$(\alpha' - \alpha)$ 1890.0	Mittl. Ep.	n	p		$(\delta' - \delta)$ 1890.0	Mittl. Ep.	n	p
Piazzini	$- 2^m 15.453$	1803.4	5.5	1.5		$- 6' 33.69$	1803.4	5.5	1.5
Groombridge	$2 15.515$	12.3	6.5	1.5		$6 36.30$	12.3	6.5	1.5
Taylor	$2 15.568$	36.5	1.3	1.0		$6 36.64$	36.5	3.2	2.0
Johnson	$2 15.567$	47.2	5.4	1.0		$6 32.97$	45.4	4.2	2.0
Brüssel	$2 15.853$	64.4	2.3	2.0		$6 33.31$	67.3	5.2	3.0
Pulkowa XII	$2 15.736$	65.9	7.1	4.0		—	—	—	—
Krüger, Zonen	$2 15.730$	70.1	3.2	4.0		$6 32.96$	70.1	3.2	3.0
Mittel: $- 2^m 15.690$				15.0		$- 6' 34.31$			13.0
Krüger: $- 2 15.649$						$- 6 33.94$			
Oertel: $- 2 15.623$						$- 6 34.33$			

1—62.

	$(\alpha' - \alpha)$ 1890.0	Mittl. Ep.	n	p		$(\delta' - \delta)$ 1890.0	Mittl. Ep.	n	p
Piazzini	$- 2^m 10.505$	1803.4	5.5	1.5		$- 5' 1.84$	1803.4	5.5	1.5
Groombridge	$2 10.515$	12.4	6.6	1.5		$4 59.81$	12.4	6.6	1.5
Taylor	$2 10.546$	36.5	1.5	1.0		$5 1.73$	36.5	3.4	1.0
Johnson	$2 10.713$	46.6	5.3	1.0		$5 1.85$	44.4	4.3	1.0
Brüssel	$2 10.620$	64.6	2.3	2.0		$5 0.22$	67.3	5.2	2.0
Pulkowa XII	$2 10.578$	66.0	7.11	8.0		—	—	—	—
Krüger Zonen	$2 10.504$	70.1	3.2	4.0		$5 0.37$	70.1	3.2	4.0
Mittel: $- 2^m 10.562$				19.0		$- 5' 0.72$			11.0
Krüger: $- 2 10.489$						$- 5 0.42$			
Oertel: $- 2 10.515$						$- 5 0.64$			

1—65

	$(\alpha' - \alpha)$ 1890.0	Mittl. Ep.	n	p		$(\delta' - \delta)$ 1890.0	Mittl. Ep.	n	p
Brüssel	— 1 ^m 13.445	1864.4	2.3	3.0		— 2' 46.73	1868.3	5.2	2.0
Pulkowa XII	1 13.358	66.0	7.9	12.0		—	—	—	—
Krüger, Zonen . . .	1 12.925	75.0	3.2	2.0		2 47.79	75.3	3.2	2.0
Mittel: — 1 ^m 13.358				17.0		— 2' 47.26			4.0
Krüger: — 1 13.375						— 2 48.38			
Oertel: — 1 13.364						— 2 48.78			

1—52

Johnson	— 0 ^m 36.189	1846.4	5.3	1.0		+ 4' 19.87	1842.9	4.3	1.0
Brüssel	0 36.208	65.6	2.3	2.0		4 18.84	65.1	5.2	2.0
Pulkowa XII.	0 36.002	65.9	7.1	2.0		—	—	—	—
Krüger, Zonen . . .	0 35.962	74.6	2.3	2.0		4 19.03	74.6	3.2	2.0
Mittel: — 0 ^m 36.076				7.0		+ 4' 19.12			5.0
Krüger: — 0 36.170						+ 4 19.05			
Oertel: — 0 36.294						+ 4 19.10			

1—19

Piazzini	+ 0 ^m 9.327	1804.9	5.5	1.5		+ 2' 2.96	1804.9	5.5	1.5
Groombridge	0 9.393	12.1	6.6	1.5		2 3.73	12.1	6.6	2.0
Taylor	0 8.829	35.5	3.1	0		—	—	—	—
Johnson	0 9.013	47.2	3.5	0		2 2.38	42.2	4.4	3.0
Robinson	0 9.237	53.9	2.2	2.0		2 4.45	52.9	3.3	1.0
Brüssel	0 9.215	63.2	2.2	4.0		2 2.01	63.8	5.5	6.0
Bonn VI	0 9.209	63.3	12.12	8.0		2 2.10	63.3	12.12	8.0
Yarnall	0 9.225	65.3	2.2	4.0		2 1.99	66.9	2.2	4.0
Pulkowa XII	0 9.206	65.9	3.7	6.0		—	—	—	—
Krüger, Zonen . . .	0 9.199	70.1	3.3	3.0		2 2.66	70.1	3.3	2.0
Mittel: + 0 ^m 9.147 ± 0.007				30.0		+ 2' 2.38			27.5
E.B. = — 0.0026 ± 0.0004									
{ Krüger: + 0 ^m 9.213						+ 2 2.46			
{ mit E.B.: + 0 9.136									
Oertel: + 0 9.131						+ 2 2.31			

Aus dieser Zusammenstellung geht zunächst hervor, dass bei den Meridianbeobachtungen, obwohl dieselben unter sich im Allgemeinen keine sehr gute Uebereinstimmung zeigen, die Mittelwerthe der Differenzen doch leidlich gut mit den ausserhalb des Meridianes ausgeführten Beobachtungen harmonieren. In den AR-Differenzen 1—63 scheint auf den ersten Blick eine relative Eigenbewegung in dem Sinne ausgesprochen zu sein, dass diese Differenz im Lauf der Zeit vergrössert wird. Da aber die Annahme einer solchen Eigenbewegung in den Beobachtungen des Herrn Prof. Krüger sowohl, als noch mehr in den meinigen so beträchtliche Fehler bedingen würde, wie sie unmöglich zugegeben werden können, habe ich hier von der Ableitung einer relativen Eigenbewegung Abstand genommen und einfach das Mittel nach Massgabe der Gewichte berechnet. Anders verhielt es sich mit der AR-Differenz 1—19. Hier schien mir schon aus dem Grunde eine relative Eigenbewegung vorzuliegen, weil die Bonner Beobachtungen im Meridian sowohl, als auch am Heliometer, diese Differenz um etwa 0.1 grösser ergaben, als die hiesigen Refractorbeobachtungen, welche gerade für diese Differenz sehr zahlreich und sicher sind. Ich habe deshalb, indem ich die beiden stark abweichenden Werthe von Taylor und Johnson ausschloss, diese Differenzen unter Annahme einer relativen Eigenbewegung ausgeglichen und erhalten

$$\Delta \alpha \text{ 1890.0} = + 9.147 \pm 0.007$$

$$\text{Eigenbewegung in AR.} = - 0.0026 \pm 0.0004$$

Der Stern 19 scheint demnach ebenso, wie der Hauptstern 1, blos optisch zu unserem Sternhaufen zugehörig zu sein. Dem entspricht die auch an andern Objecten mehrfach gemachte Er-

fahrung, dass einzelne hellere Sterne in Sternanhäufungen nicht zu den letzteren wirklich (physisch) gehören. In unserem Falle würden die hellen Sterne 1 und 19 (beide 6.5^m) zunächst als Doppelsternpaar Interesse bieten.

Die weitere Vergleichung der aus den Meridianbeobachtungen abgeleiteten Differenzen ist im Nachstehenden enthalten:

Differenz	$(\alpha - \alpha_1) 1890.0$			$M-K$	$M-O$	$(\delta - \delta_1) 1890.0$			$M-K$	$M-O$
	<i>Merid. Beob.</i>	<i>Krüger</i>	<i>Oertel</i>			<i>Merid. Beob.</i>	<i>Krüger</i>	<i>Oertel</i>		
1-63	-2 ^m 15 ^s .690	-2 ^m 15 ^s .649	-2 ^m 15 ^s .623	-0.041	-0.067	-6' 34".31	-6' 33".94	-6' 34".33	-0.37	+0.02
1-62	-2 10.562	-2 10.489	-2 10.515	-0.073	-0.047	-5 0.72	-5 0.42	-5 0.64	-0.30	-0.08
1-65	-1 13.358	-1 13.375	-1 13.364	+0.017	+0.006	-2 47.26	-2 48.38	-2 48.78	+1.12	+1.52
1-52	-0 36.076	-0 36.170	-0 36.294	+0.094	+0.218	+4 19.12	+4 19.05	+4 19.10	+0.07	+0.02
1-19	+0 9.147	+0 9.136	+0 9.131	+0.011	+0.016	+2 2.38	+2 2.46	+2 2.31	-0.08	+0.07

Die mittlere Epoche der Meridianbeobachtungen ist fast durchgehends von 1860 nicht sehr weit entfernt, es müssten also, wenn die verglichenen Sterne dem Sternhaufen angehören sollen, die Differenzen ($M-K$) im Mittel in beiden Coordinaten gleich Null sein, die Differenzen ($M-O$) dagegen sollten mit Rücksicht auf die auf Seite 75 abgeleitete relative Eigenbewegung des Hauptsterne 1 in AR. und Decl. sämtlich positiv sein. Keine dieser Voraussetzungen trifft vollständig zu, doch zeigen die Declinationsdifferenzen wenigstens annähernd ein entsprechendes Verhalten und was die Rectascensionsdifferenzen anlangt, so sind hier ohne Zweifel die Meridianbestimmungen zur Zeit noch nicht zahlreich und sicher genug, um über die Frage, ob die Differenzen ($M-K$) und ($M-O$) in AR. durch Fehler in den Meridianbeobachtungen oder durch relative Eigenbewegung der verglichenen Sterne entsteht werden, endgiltig Aufschluss geben zu können. Eine relative Eigenbewegung des einen oder andern der zuletzt verglichenen helleren Sterne des Sternhaufens könnte übrigens recht wohl vorhanden sein, doch sind, wie gesagt, die gegenwärtig vorliegenden Meridianbeobachtungen derselben bei weitem nicht ausreichend, um mit Sicherheit hierüber entscheiden zu können. Es wäre also eine gelegentliche Beobachtung der helleren Sterne unseres Sternhaufens an einigen Sternwarten mit guten Meridiankreisen recht erwünscht, wenn man sich nicht etwa darauf vertrösten will, durch photographische Aufnahmen des Sternhaufens über das Verhalten dieser Sterne innerhalb desselben Aufschluss zu erhalten.

Berichtigungen:

Seite 7 Zeile 8 v. oben: lies S. 4 statt S. 3.

„ 7 „ 14 „ unten: im Nenner lies $15 \sin^2 (N+\delta)$ statt $15 \sin^2 (N-\delta)$

„ 9 Gleichung für $\Delta\delta$ in der Mitte, zweites Glied: im Nenner lies 10 statt 100.

„ 14 Zeile 3 von unten: lies Einzeleinstellungen statt Einzelneistellungen.

